

IV

поколение фторхинолонов
в борьбе с инфекцией

ВЕЛЛОЦИН

ТЕПЕРЬ

АКСА-МОКСИН®

Моксифлоксацин 400мг/100мл

Преимущество:

Широкий спектр действия

Эффективен против грамположительных, грамотрицательных и атипичных бактерий (*Mycoplasma*, *Chlamydia*, *Legionella*).

Глубокое проникновение в ткани

Обеспечивает высокую концентрацию в дыхательных путях, коже, пазухах и других очагах инфекции.

Удобный приём

Достаточно 1 раз в сутки, внутривенного введения.

Безопасен при аллергии на пенициллин

Отличная альтернатива бета-лактамым антибиотикам при их непереносимости.



Показания к применению



**Острый
бактериальный
синусит**



**Хронический
бронхит**



**Инфекция
мочевыводящих
путей (ИМП)**



**Инфекции
кожи и мягких
тканей**



**Внебольничная
пневмония**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ АКСА-МОКСИН

Критерий	Моксифлоксацин	Амоксициллин	Азитромицин	Цефтриаксон
Класс антибиотика	Фторхинолон (4-е поколение)	Пенициллин	Макролид	Цефалоспориин (3-е поколение)
Спектр действия	Широкий, включая атипиков	Грамположительные + часть Грам-	Грамположительные + атипики	Широкий, но без атипиков
Атипичные возбудители	✓ Эффективен	✗ Неэффективен	✓ Эффективен	✗ Неэффективен
Резистентность пневмококка	Низкая ▼ (активен против R)	▲ Высокая	▲ Высокая	▲ Высокая
Форма выпуска	Таблетки, в/в	Таблетки, суспензия	Таблетки, суспензия	Только в/в, в/м
Частота приёма	1 раз в сутки	2–3 раза в сутки	1 раз в сутки	1–2 раза в сутки
Применение при аллергии на пенициллин	✓ Да	✗ Нет	✓ Да	✗ Часто перекрёстная аллергия
Проникновение в ткани	Отличное (лёгкие, пазухи, кожа)	Умеренное	Хорошее	Хорошее

Состав :

Раствор для инфузий 400 мг/100 мл, активное вещество - моксифлоксацина гидрохлорид 436.0 мг (эквивалентно моксифлоксацину 400.0 мг),
всп.вещества: натрия хлорид, 0.5 М кислота хлороводородная, 0.05 М раствор натрия гидроксида, вода для инъекций.

Фармакотерапевтическая группа: Код АТХ J01MA14

Противомикробные препараты – производные хинолона. Фторхинолоны. Моксифлоксацин.

Способ применения и дозы

Инфекции	Суточная доза	Длительность применения
Острые бактериальные синуситы	400 мг	10 дней
Острые бактериальные бронхиты и их обострение	400 мг	5 дней
Пневмония	400 мг	7-14 дней
Неосложненные инфекции кожи и ее структур	400 мг	7 дней

****Коррекция дозы не требуется у пожилых людей и у пациентов с низким весом.**

****Противопоказан детям и подросткам, т.к. эффективность и безопасность моксифлоксацина в данной категории не установлены.**

Способ введения

Только для внутривенного использования!

Инфузия должна проводиться в течение 60 минут (см. инструкцию внутри коробки).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищённом от света месте.

Беречь от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.