

АКСАГИЛ[®] (AXAGYL)

Метронидазол Injection USP 0.5% в/в, 100 мл

Инфекции внутренних органов:

- Заболевания желчевыводящих путей, кишечника, абсцесс печени, перитонит, аппендицит

Инфекции половых органов у женщин и мужчин:

- Вагинит, уретрит, трихомониаз

Болезни, вызванные гельминтами и амёбами:

- Амёбиаз, лямблиоз

Инфекции кожи и мягких тканей:

- Раны, абсцессы, воспаления на коже

Инфекции полости рта и зубов:

- Гингивит, стоматит, пародонтит



(AXAGYL)

АКСАГИЛ

Основное назначение:
борьба с протозойными
инфекциями, вызванными
паразитами, такими как
трихомонады, амёбы
и лямблии.



Состав: на 100 мл (метронидазол 500 мг)

Способ применения и дозы

Показание	Возрастная группа	Начальная доза	Поддерживающая доза	Примечания
Инфекции, вызванные анаэробами	Взрослые и дети >12	1,5–2 г в сутки (300–400 мл раствора)	0,5 г (100 мл) каждые 12 часов (2–3 раза в день)	—
—	Дети до 12 лет	7,5 мг/кг каждые 8 часов в течение 3 суток	Каждые 12 часов в той же дозе	—
Послеоперационные осложнения	Взрослые и дети >12	0,5–1 г за день операции (прекратить за 1–2 часа до операции)	1,5 г на следующий день (по 0,5 г каждые 8 часов)	—
—	Дети до 12 лет	7,5 мг/кг за день операции	7,5 мг/кг на следующий день	Схема введения идентична для взрослых.
При терминальной почечной недостаточности	Взрослые и дети >12	Не более 1 г в сутки	2 раза в сутки	Для больных с хронической почечной недостаточностью или печеночной недостаточностью.
При гемодиализе	Взрослые и дети >12	По необходимости, возможно дополнительное введение	—	Метронидазол и его метаболиты хорошо выводятся при гемодиализе, период полувыведения уменьшается.
У пожилых пациентов	Пожилые	Установить индивидуально	—	Необходим контроль концентрации метронидазола в сыворотке крови.
Продолжительность лечения	Все возрастные группы	Тяжелая инфекция: 5–7 дней Неосложненная инфекция: 3–5 дней	Не превышать 10 дней	При необходимости курс может быть продлён только по очень строгим показаниям. Избегать повторной терапии метронидазолом по возможности.

Важные напоминания:

– Употребление алкоголя строго запрещено!

Совместный приём с алкоголем может вызвать тяжёлые реакции (головная боль, боли в животе, рвота, учащённое сердцебиение).

– Следует соблюдать осторожность при управлении транспортом (возможны сонливость и головокружение).

– Во время приёма возможно окрашивание мочи в тёмно-жёлтый/коричневый цвет — это неопасно.

Способ введения

Только для внутривенного использования!

Инфузия должна проводиться в течение 60 минут (см. инструкцию внутри коробки).

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°, в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Эксклюзивный дистрибьютер:

ИП ООО «WELL MED PHARM» Республика Узбекистан, 100057,
г.Ташкент, Алмазарский район, ул. 2-пр. Чукурсой, д.96А Тел: +(998) 78 120 2545
Факс: +(998) 71 228 1695 E-mail: wellmed.inf@gmail.com

Производитель:

AXA PARENTERALS LIMITED "KHASRA NO.936,937 & 939
VILL-KISHANPUR JAMALPUR,
ROORKEE-247 667 DISTT-HARDWAR UTTARA khand, Индия

