


METOVEL®

Мелдония дигидрат – 500 мг 5мл

Показания:



в комплексной терапии ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда);

хроническая сердечная недостаточность;

дисгормональная кардиомиопатия;

в комплексной терапии острых и хронических нарушений кровоснабжения головного мозга (инсульт и цереброваскулярная недостаточность);

тромбоз центральной вены сетчатки и ее ветвей;

сниженная работоспособность;

умственное и физическое перенапряжение (в т.ч. у спортсменов);

синдром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со специфической терапией алкоголизма).



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ



МЕТОВЕЛ (METOVEL) Раствор для инъекций

Состав:

1 ампула (5 мл) содержит:

- Активное вещество: мелдония дигидрат – 100 мг 1мл
- Вспомогательное вещество: вода для инъекций

Описание:

Прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый раствор.

Фармакологические свойства:

- Улучшает снабжение клеток кислородом,
- Защищает их от повреждений,
- Повышает физическую и умственную работоспособность.

Показания к применению:

- Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, стенокардия.
- Хроническая сердечная недостаточность, кардиомиопатия.
- Инсульт, цереброваскулярная недостаточность.
- Гемофтальм, тромбоз вен сетчатки, ретинопатия.
- Физическое и умственное перенапряжение.
- Абстинентный синдром при алкоголизме.

Способ применения и дозировка:

- Сердечно-сосудистые заболевания: 0,5–1 г/сут внутривенно 4–6 дней.
- Острое нарушение мозгового кровообращения: 0,5 г/сут в/в 10 дней, затем таблетированная форма.
- Физическое и умственное перенапряжение: 0,5 г/сут в/в 10–14 дней.
- Алкогольная зависимость: 0,5 г 2 раза/сут в/в 7–10 дней.

Противопоказания:

- Высокое внутричерепное давление.
- Органические поражения ЦНС.
- Беременность, лактация.
- Возраст до 18 лет.
- Индивидуальная непереносимость.

Побочные эффекты:

Редко: тахикардия, изменение АД, возбуждение, диспепсия, аллергические реакции (зуд, сыпь, отек).

Особые указания:

- Применять с осторожностью при заболеваниях печени и почек.
- Не является препаратом первой линии при остром коронарном синдроме.

Лекарственные взаимодействия:

Усиливает действие гипотензивных средств, сердечных гликозидов. Осторожность при комбинировании с нитратами, блокаторами кальциевых каналов.

Передозировка:


Случаи не описаны. Препарат малотоксичен.

Форма выпуска и хранение:

- Форма: раствор для инъекций 10% (ампулы 5 мл).
- Хранение: в упаковке, защищенной от света, при температуре до 25°C.
- Срок годности: 2 года.
- Отпуск в аптеках: по рецепту.

Информация предназначена для специалистов.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству продуктов на территории Республики Узбекистан ИП ООО «WELL MED PHARM» Республика Узбекистан, 100057, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. 2-пр. Чукурсой д. 96А
Тел: +999 78 120 25 45; Факс: +999 71 228 16 95. e-mail: wellmed.inf@gmail.com www.wellmedpharm.uz




Механизм действия Metovel®



ГББ - гамма-бутиробетаин; ОПСС - общее периферическое сопротивление сосудов; СЖК - свободные жирные кислоты.


КАРДИОЛОГИЯ: ИБС, стенокардия напряжения, ХСН → ↓ частоты ангинозных приступов, ↑ толерантности к нагрузке.



НЕВРОЛОГИЯ: ЦВЗ, постинсультные состояния → ↑ перфузии мозга, ускорение восстановления.



КОМОРБИДНЫЕ ПАЦИЕНТЫ (ИБС + АГ): профилактика сосудистых катастроф (инсульт, инфаркт).





Механизм действия Metovel®

NO-зависимый механизм:



Перспективы применения МЕТОВЕЛ у пациентов с ХСН и ИБС + СД



- Снижает частоту приступов стенокардии
- Уменьшает потребность в нитратах,
- Облегчает симптомы ХСН,
- Улучшает систолическую и диастолическую функцию сердца.

Показатели	Группа Metovel®	Контрольная группа
Гликированный гемоглобин (HbA1c)	-12%	-3%
Триглицериды (ТГ)	-26,9%	-7,7%
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)	-27,1%	-8,3%

1. Михин В., Хлебодаров Ф. Перспективы применения милдроната у больных с сердечно-сосудистой патологией. Российский кард. журн. 2010;4(84):58-68.
2. Dzerve V, Matison D., Pozdnyakov Y., Oganov R. Mildronate improves the exercise tolerance in patients with stable angina. Seminars in Cardiovascular medicine. 2010;16:3.