



НАЕМ UP

Сироп, 200 мл

• ЖЕЛЕЗА (III) ГИДРОКСИД САХАРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС
• АНТИАНЕМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОСТАВ

Каждые 15 мл сиропа содержат:

- Железа аммония цитрат — 160 мг
- Фолиевая кислота — 0,5 мг
- Цианокобаламин (витамин B₁₂) — 7,5 мкг
- Медь сульфат — 30 мкг
- Марганец сульфат — 30 мкг

Вспомогательные вещества: натрия бензоат, натрия метилпарабен, натрия пропилпарабен, сахар, глицерин, лимонная кислота моногидрат, краситель карамель, ароматизатор ваниль, ароматизатор Фруктовая смесь FB93026 и др.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ код АТХ: B03AD02

Препарат восполняет дефицит железа и витаминов группы В, способствует нормализации процессов кроветворения, повышению уровня гемоглобина и улучшению общего состояния организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Железодефицитная анемия
- Скрытый дефицит железа
- Периоды повышенной потребности в железе
- Восстановление после заболеваний
- Неполноценное питание

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Взрослым и детям старше 12 лет препарат назначают по 5-10 мл сиропа, один или два раза в день или по назначению врача до достижения нормального уровня гемоглобина в крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Заболевания, сопровождающиеся избыточным накоплением железа.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В редких случаях возможны аллергические реакции или расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Применять препарат в период беременности и лактации — по назначению врача.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА Отпускается по рецепту врача.

ФОРМА ВЫПУСКА Сироп, флакон 200 мл.

СРОК ГОДНОСТИ 2 года

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ


Cadila Pharmaceuticals Ltd.,
Дхолка, Индия.

Производственная лицензия № G/1090.



Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств

на территории Республики Узбекистан. ИП ООО «WELL MED PHARM». Республика Узбекистан 100057 г. Ташкент Алмазарский район, ул. Чукурсой 2-пр. д. 96А
Тел. +998781202545 Факс +998712281695 e-mail: wellmed.inf@gmail.com



Сироп 200 мл



НАЕМ UP

• ЖЕЛЕЗА (III) ГИДРОКСИД САХАРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС
• АНТИАНЕМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО



Показания:

- Железодефицитная анемия при хронической болезни почек, гемодиализе.
- Железодефицит у беременных (по назначению врача).
- Дефицит железа у детей и подростков.
- Тяжелая анемия, требующая быстрого восполнения запасов железа.
- Восполнение железа при хронической кровопотере, когда другие методы недостаточны.


HAEM UP Обладает высоким профилем **Эффективности и Безопасности** в лечении железодефицитной анемии:

- У больных находящихся на гемодиализе
- Во время беременности и послеродовом периоде
- При кровопотере любого генеза

Эффективность

УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА И КОНЦЕНТРАЦИИ ФЕРРИТИНА (n=111)

■ **HAEM UP** (железа (III) гидроксид сахарозный комплекс)
■ Сульфат железа



Выводы:

При применении **HAEM UP** (железа (III) гидроксид сахарозный комплекс) обеспечивается быстрый рост общей концентрации железа в сыворотке крови, быстрое распределение и включение в органы мишени.

HAEM UP (железа (III) гидроксид сахарозный комплекс) n=52, сульфат железа n=59

Фармакокинетика

- Всасывание: быстро доступно для эритропоэза
- T_{1/2}: 5–6 часов
- Распределение: поступает в ретикулоэндотелиальную систему, не в печёночную паренхиму → снижает риск повреждения печени
- Выведение: медленное, через клетки RES
- Способ введения: струйно или капельно

HAEM UP ампулы (инъекции) → **СИРОП** (приём внутрь)

- После курса ампул для поддержки уровня железа и завершения лечения.
- Позволяет постепенно восполнить запас железа и предотвратить рецидив анемии.

Состав:

Каждый 15 мл :

- Цитрат аммония железа (III) 160 мг,
 - Фолиевая кислота (III) 0,5 мг,
 - Цианокобаламин (III) 7,5 мкг,
 - Сульфат меди (USP) 30 мкг,
 - Сульфат марганца (USP) 30 мкг,
- Ароматизированная сиропообразная основа (Q.S.).



Добавки железа


- Снижает риск анемии у беременных женщин на сроке 70%
- Обеспечивает более высокий средний вес новорожденного

Фолиевая кислота

- Снижение риска развития пороков нервной трубки у плода и повышение уровня защиты при более высоких дозах²

Дополнительное преимущество: гематопозитические факторы

- **Медь** : взаимодействует с железом, помогая организму формировать эритроциты. Также способствует усвоению железа³
- **Марганец** : необходим для правильного метаболизма железа и помогает предотвратить анемию⁴
- **Цианокобаламин** : витамин B12, фолат и железо играют важную роль в эритропоэзе⁵ Вкусный яблочный аромат.



- Приём железа у беременных женщин снижает риск анемии у новорождённого.
- Ежедневный приём 65 мг железа снижает риск преждевременных родов и низкой массы тела у ребёнка.
- Ежедневный приём 40 мг железа предотвращает развитие анемии у 95% женщин.
- В течение одного месяца уровень гемоглобина повышается на 42%

Уровень гемоглобина (Hb):

- На 4-м месяце беременности (ранний срок): 8,3 г/дл
- На 9-м месяце беременности (поздний срок): 12,2 г/дл

То есть за 5 месяцев уровень гемоглобина повысился на 42%.

