




Metronidazol Klotrimazol Xlorgeksidin atsetati

KLOTMER


Метронидазол	200 мг	Metronidazol	200 mg
Клотримазол	160 мг	Klotrimazol	160 mg
Хлоргексидина ацетат	8,0 мг	Xlorgeksidin atsetati	8,0 mg




Грибковый налёт на стенках влагалища при кандидозе




Нормоценоз



Промежуточный тип



Дисбиоз



Вагинит



- ▶ бактерия ва замбуруғларни йўқ қилади;
- ▶ вагинал инфекцияларда яллиғланишни камайтиради;
- ▶ қичишиш, ачишиш ва ноқулайликни бартараф этади;
- ▶ ёқимсиз ажралмаларни камайтиришга ёрдам беради;
- ▶ вагинал микрофлорани тиклашга қўмаклашади;
- ▶ инфекция қайталанишининг олдини олишга ёрдам беради.



Соглом микрофлора
ва қулайлик.

Ишончли ва ягона эксклюзив хамкор:

Дори воситалари сифати бўйича даъво (таклиф)ларни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили:
«WELL MED PHARM» ХК МЧЖЎзбекистон Республикаси, 100057, Тошкент шаҳри, Олмазор тумани,
Чукурсой 2-пр., 96А-уй.Тел.: +998 78 120 25 45Факс: +998 71 228 16 95e-mail: wellmed.inf@gmail.com

ТИББИЙ ҲОИДАЛАНИШ БЎЙИЧА КЎРСАТМАЛАР

ТАРКИБИ:

1 суппозиторий таркибида

Фаол моддалар:

Метронидазол – 200 мг;

Клотримазол – 160 мг;

Хлоргексидин ацетати – 8 мг;

Ёрдамчи моддалар

Ярим синтетик мойсмон глицерин (38-тур), парафин, ланолин.

Тавсифи

Сут-қаймоқсимон (сутли-сариқ) рангдаги, цилиндр шаклли суппозиторийлар.

Фармакотерапевтик гуруҳ

Гинекологик касалликларни даволаш учун антисептик ва микробларга қарши препаратлар.

Имидазол ҳосилалари.

АТС коди: G01AF

Фармакокинетика

Метронидазол интравагинал қўлланилганда қон оқимида сўрилади. Қондаги максимал концентрацияси

6–12 соатда аниқланади ва оғиз орқали қабул қилинган дозанинг тахминан 50% ни ташкил қилади.

Препаратнинг 60–80% буйраклар орқали, 6–15% ичак орқали чиқарилади. Клотримазол шиллиқ қаватлардан жуда кам миқдорда (тахминан 3%) сўрилади, жигарда метаболизмга учрайди ва

буйраклар орқали чиқарилади. Ярим парчаланиш даври 3–5 соат. Хлоргексидин шиллиқ қаватлар орқали деярли сўрилмайди.

Фармакодинамика

Кенг таъсир доирасига эга бўлган комбинирланган антибактериал ва замбуруғларга қарши препарат.

- Метронидазол анаэроб микроорганизмларга қарши таъсир кўрсатиб, уларнинг ДНКсига зарар еткази.
- Клотримазол замбуруғлар ҳужайра мембранаси синтезини бузиб, уларнинг ўсиши ва кўпайишини тўхтатади.
- Хлоргексидин кучли маҳаллий антисептик бўлиб, бактериялар ҳужайра мембранасини бузиш орқали таъсир қилади.

Қўллашга кўрсатмалар

- бактериал вагинит
- замбуруғли кольпит
- вагинал трихомониаз
- аралаш инфекцияли кольпит

Қўллаш усули ва дозалари

Вагинал қўлланилади.

Ухладан олдин, қўлларни ювиб, ётган ҳолда суппозиторийни бармоқ учи билан қинга чуқур киритинг.

Кунига 1 марта 1 суппозиторий.

Даволаш курси — 7 кун.

Қайта курс биринчи менструация тугагандан кейин ўтказилади.

Ножўя таъсирлари

Кам ҳолларда аллергик реакциялар, қинда ёниш ҳисси кузатилиши мумкин.

Қарши кўрсатмалар

Препарат таркибига юқори сезувчанлик, 18 ёшгача бўлган болалар

Алоҳида кўрсатмалар

Ҳомиладорлик ва лактация даври.

Транспорт воситаларини бошқаришга таъсири

Аниқланмаган.

Чиқарилиш шакли ва қадоқланиши

7 тадан суппозиторий ПВХ-ПЭ плёнкадан тайёрланган контур ячейкали қадоқда.

Сақлаш шароитлари

25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда, қуруқ ва ёруғликдан ҳимояланган жойда сақлансин.

Музлатишга йўл қўйилмасин.

Болалар ололмайдиган жойда сақлансин!

Яроқлилик муддати

2 йил.

