



TEONVEL®

Tenoxicam 20 mg

- Скоростной результат через 15 минут
- Купирование боли и воспаления в течение 24 часов
- Удобство применения 1 раз в сутки

Быстрый и сильный НПВС



**3 флакона с лиофилизатом
3 ампулы с растворителем**

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

СОСТАВ:

1 ампула (2 мл) содержит:

- Теноксикам – 20 мг
- Вспомогательные вещества: маннитол, натрия гидроксид, вода для инъекций и др.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА:

Раствор для внутримышечного введения.

Прозрачная, светло-жёлтая жидкость без видимых частиц.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:

Нестероидное противовоспалительное средство (НПВС)

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Обладает выраженным обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим действием. Блокирует синтез простагландинов, уменьшая боль и отёчность.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Травмы (вывихи, переломы), бурситы, тендовагиниты
- Обезболивание при артроскопии
- Неврит, невралгия, корешковый синдром (ишиас, люмбаго, спинномозговая грыжа)
- Остеоартрита на фоне остеоартроза либо другого дегенеративно-воспалительного заболевания суставов (остеохондроз, анкилозирующий спондиллит, подагра)
- Ревматоидный артрит
- Почечная колика
- Альгодисменорея

РЕЖИМ ДОЗИРОВАНИЯ

Для в/м и в/в введения.

В/в или в/м введение применяется для кратковременного (1-2 дня) лечения в дозе 20 мг 1 раз/сут. При необходимости дальнейшей терапии переходят на пероральные лекарственные формы теноксикама.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ / ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

См. прилагаемую инструкцию по медицинскому применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить при температуре не выше 25°C, в защищённом от света месте.

Беречь от детей!

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК: По рецепту врача.

Эксклюзивный дистрибьютер:

ИП ООО «WELL MED PHARM» Республика Узбекистан, 100057,
г.Ташкент, Алмазарский район, ул. 2-пр. Чукурсой, д.96А Тел: +(998) 78 120 2545
Факс: +(998) 71 228 1695 E-mail: wellmed.inf@gmail.com

Производитель:

СП ООО «UZGERMED PHARM» Республика Узбекистан, 111904,
Ташкентская область, Юкори Чирчикский район, ССГ Борданкул.



Теноксикам обладает рядом уникальных особенностей, отличающих его от других НПВС.

Длительное действие и удобство приёма:

- Период полувыведения 60–75 ч → приём 1 раз в сутки.
- Повышает комплаентность.
- В отличие от Ибупрофена, Диклофенака (2–4 раза в день).

Двойной механизм действия Теноксикама:

- Ингибирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2.
- Подавляет нейтрофилы и синтез лейкотриенов → меньше воспаления и бронхоспазма.

Мощное обезболивание без зависимости:

- Эффект как у слабых опиоидов (трамадол), но безопаснее.
- Эффективен при хронической боли (ОА, РА).

Меньше риска для ЖКТ:

- Реже вызывает язвы и кровотечения, чем индометацин или пироксикам.
- Щелочные свойства – щадит слизистую.

Слабый антиагрегантный эффект:

- Ингибирует ЦОГ-1 в тромбоцитах → умеренное антиагрегантное действие.
- Не заменяет аспирин в кардиологии.



Критерий	Теноксикам	Диклофенак
Механизм действия	Ингибитор ЦОГ-1 и ЦОГ-2, подавляет нейтрофилы и лейкотриены	Ингибитор ЦОГ-1 и ЦОГ-2
Период полувыведения	60–75 часов	1–2 часа
Частота приёма	1 раз в сутки	2–3 раза в сутки
Начало действия	Через 15–30 минут	Через 20–60 минут
Длительность действия	До 24 часов	6–8 часов
Анальгетическая сила	Высокая, сопоставима с трамаолом	Умеренная
Риск ЖКТ-осложнений	Ниже, чем у диклофенака и пироксикама	Выше, часто требует ИПП
Антиагрегантный эффект	Слабый, длительный	Незначительный, кратковременный

Доказанный хондропротективный эффект

Теноксикам обладает хондропротективным действием, значительно снижает синтез коллагеназы и протосгликаназы, препятствует разрушению хряща

Концентрация Теноксикама в синоовии (мг/л)	Протеогликан хряща (ЕД/час/мг)	Протеогликан хряща (%)	Коллагеназа хряща (ЕД/час/мг)	Коллагеназа хряща (%)
0	10,7	100%	32,14	100%
2	5,5	- 49%	27,4	- 15%
4	3,2	- 71%	20,08	- 36%
6	1,7	- 85%	10,8	- 67%

Вывод:

Теноксикам значительно улучшает метаболизм хрящевой ткани, препятствует ее разрушению у пациентов с остеоартритом

Эффективное лечение воспалительно-дегенеративных заболеваний

Рандомизированные контролируемые исследования

Garsia-Oyola E et. al
4 604 пациента

92,3%
хороший
и превосходный
эффект терапии

Katzmann, 1990 Europe
41 025 пациентов

73,5-94%
хороший
и превосходный
эффект терапии

- Ревматоидный артрит
- Остеоартрит
- Анкилозирующий спондилит
- Повреждения мягких тканей

Пациенты принимали Теноксикам 20 мг × 1 раз в сутки

*По Laurence D.R., Bennet P.N., 1992 (2).
Страчунский Л.С., Козлов С.Н. (1997)

*С.Л.Эпштейн, А.В. Николаев, 1999