

Suma de vectores y multiplicación por un escalar en  $\mathbb{R}^3$ 

y

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

$$\alpha \mathbf{u} = (\alpha x_1, \alpha y_1, \alpha z_1)$$

Ésta es la misma definición de suma de vectores y multiplicación por un escalar que se tenía; se ilustra en la figura 4.20.




Figura 4.20

Ilustración de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar en  $\mathbb{R}^3$ .

Un **vector unitario**  $\mathbf{u}$  es un vector con magnitud 1. Si  $\mathbf{v}$  es un vector diferente de cero, entonces  $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$  es un vector unitario que tiene la misma dirección que  $\mathbf{v}$ .

## Vector unitario

EJEMPLO 4.3.3 Cálculo de un vector unitario en  $\mathbb{R}^3$ 

Encuentre un vector unitario que tenga la misma dirección que  $\mathbf{v} = (2, 4, -3)$ .

**SOLUCIÓN** ▶ Como  $v = \sqrt{2^2 + 4^2 + (-3)^2} = \sqrt{29}$  se tiene

$$\mathbf{u} = \left( \frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{4}{\sqrt{29}}, -\frac{3}{\sqrt{29}} \right)$$

Ahora se puede definir formalmente la dirección de un vector en  $\mathbb{R}^3$ . No se puede definir como el ángulo  $\theta$  que forma el vector con el eje  $x$  positivo ya que, por ejemplo, si  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ , por lo que existe un número infinito de vectores que forman un ángulo  $\theta$  con el lado positivo del eje  $x$ , y estos vectores juntos forman un cono (vea la figura 4.21).




Figura 4.21

Todos los vectores que están en este cono forman un ángulo  $\theta$  con la parte positiva del eje  $x$ .

## Definición 4.3.2

Dirección en  $\mathbb{R}^3$ 

La **dirección** de un vector  $\mathbf{v}$  en  $\mathbb{R}^3$  se define como el vector unitario  $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ .