$$y_{1} = a + bx_{1} + cx_{1}^{2}$$

$$y_{2} = a + bx_{2} + cx_{2}^{2}$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$y_{n} = a + bx_{n} + cx_{n}^{2}$$
(6.2.10)

El sistema (6.2.10) se puede volver a escribir como

$$\mathbf{y} = A\mathbf{u}$$

Con

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$
 (6.2.11)

al igual que antes. Si todos los datos no se encuentran sobre la misma parábola, entonces $y - A\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ para cualquier vector \mathbf{u} , y de nuevo el problema es

Encontrar un vector \mathbf{u} en \mathbb{R}^3 tal que $|\mathbf{y} - A\mathbf{u}|$ sea mínima.

Utilizando un razonamiento similar al anterior, se puede demostrar que si cuando menos tres de las x_i son diferentes, entonces A^TA es invertible y el vector que minimiza al vector $\overline{\mathbf{u}}$ está dado por

$$\overline{\mathbf{u}} = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1}A^{\mathsf{T}}\mathbf{y} \tag{6.2.12}$$

EJEMPLO 6.2.2 El mejor ajuste cuadrático para cuatro puntos

Encuentre el mejor ajuste cuadrático para los datos del ejemplo 6.2.1.

SOLUCIÓN ► Aquí

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{pmatrix}, \quad A^{\top} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{pmatrix} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Entonces

$$A^{\mathsf{T}}A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 30 \\ 6 & 30 & 84 \\ 30 & 84 & 354 \end{pmatrix}, \qquad (A^{\mathsf{T}}A)^{-1} = \frac{1}{4752} \begin{pmatrix} 3564 & 396 & -396 \\ 396 & 516 & -156 \\ -396 & -156 & 84 \end{pmatrix}$$

У

$$\overline{\mathbf{u}} = (A^{\mathsf{T}}A)^{-1} A^{\mathsf{T}} \mathbf{y} = \frac{1}{4752} \begin{pmatrix} 3564 & 396 & -396 \\ 396 & 516 & -156 \\ -396 & -156 & 84 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4752} \begin{pmatrix} 3564 & 396 & -396 \\ 396 & 516 & -156 \\ -396 & -156 & 84 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \\ 31 \end{pmatrix} = \frac{1}{4752} \begin{pmatrix} 17820 \\ -3852 \\ -180 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.75 \\ -0.81 \\ -0.04 \end{pmatrix}$$