

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h}.$$

**Teorema 12** Si  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  es diferenciable, entonces todas las derivadas direccionales existen. La derivada direccional en  $\mathbf{x}$  en la dirección  $\mathbf{v}$  está dada por

$$\begin{aligned} Df(\mathbf{x})\mathbf{v} &= \text{grad} f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v} \\ &= \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{x}) \right] v_1 + \left[ \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{x}) \right] v_2 + \left[ \frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{x}) \right] v_3, \end{aligned}$$

donde  $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ .

**Demostración** Sea  $\mathbf{c}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{v}$ , de forma que  $f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) = f(\mathbf{c}(t))$ . Por el primer caso especial de la regla de la cadena,  $(d/dt)f(\mathbf{c}(t)) = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t)$ . Sin embargo,  $\mathbf{c}(0) = \mathbf{x}$  y  $\mathbf{c}'(0) = \mathbf{v}$ , y por tanto

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{x} + t\mathbf{v}) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v},$$

como se quería demostrar. ■

Obsérvese que no es necesario utilizar rectas al calcular la variación de  $f$  en una dirección determinada  $\mathbf{v}$ . De hecho, para una trayectoria general  $\mathbf{c}(t)$  con  $\mathbf{c}(0) = \mathbf{x}$  y  $\mathbf{c}'(0) = \mathbf{v}$ , por la regla de la cadena tenemos,

$$\left. \frac{d}{dt} f(\mathbf{c}(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) \Big|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}.$$

### Ejemplo 3

Sea  $f(x, y, z) = x^2 e^{-yz}$ . Calcular la variación de  $f$  en la dirección del vector unitario

$$\mathbf{v} = \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad \text{en el punto} \quad (1, 0, 0).$$

### Solución

La variación requerida es, utilizando el Teorema 12,

$$\nabla f \cdot \mathbf{v} = (2xe^{-yz}, -x^2ze^{-yz}, -x^2ye^{-yz}) \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right),$$

que, en el punto  $(1, 0, 0)$ , es

$$(2, 0, 0) \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

