

y

$$\begin{aligned}
 \|v'_3\| &= \left[\int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right)^2 dx \right]^{\frac{1}{2}} \\
 &= \left[\int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 + \frac{4}{3}x^2 + \frac{x}{3} + \frac{1}{36} \right) dx \right]^{\frac{1}{2}} \\
 &= \left[\left(\frac{x^5}{5} - \frac{x^4}{2} + \frac{4x^3}{9} - \frac{x^2}{6} + \frac{x}{36} \right) \right]_0^1^{\frac{1}{2}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{180}} = \frac{1}{6\sqrt{5}}
 \end{aligned}$$

Entonces $u_3 = 6 \sqrt{5} \left(x^2 - x + \frac{1}{6} \right) = \sqrt{5} (6x^2 - 6x + 1)$. Por último, una base ortonormal es $\{1, \sqrt{3}(2x-1), \sqrt{5}(6x^2-6x+1)\}$.



EJEMPLO 6.3.9 Un conjunto ortonormal infinito $C[0, 2\pi]$

En $C[0, 2\pi]$, el conjunto infinito

$$S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin 2x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2x, \dots, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \dots \right\}$$

es un conjunto ortonormal. Esto es cierto, ya que si $m \neq n$, entonces

$$\int_0^{2\pi} \sin mx \cos nx \, dx = \int_0^{2\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \int_0^{2\pi} \cos mx \cos nx \, dx = 0$$

Para probar una de estas igualdades se observa que

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} \sin mx \cos nx \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [\sin(m+n)x \sin(m-n)x] \, dx \\
 &= -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos(m+n)x}{m+n} + \frac{\cos(m-n)x}{m-n} \right]_0^{2\pi} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

ya que $\cos x$ es periódica con periodo 2π . Se vio que $\|\sin x\| = \sqrt{\pi}$. Así, $\left\| \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x \right\| = 1$. Las otras igualdades se deducen de forma similar. Este ejemplo proporciona una situación en la que tenemos un conjunto ortonormal *infinito*. De hecho, aunque esto está más allá del alcance elemental de este libro, es cierto que algunas funciones en $C[0, 2\pi]$ se pueden expresar como combinaciones lineales de las funciones en S . Suponga que $f \in C[0, 2\pi]$. Después, si se escribe f como una combinación lineal infinita de los vectores en S , se obtiene lo que se denomina la **representación por series de Fourier** de f .

Representación
por series de
Fourier

D Definición 6.3.4

Proyección ortogonal

Sea H un subespacio del espacio con producto interno V con una base ortonormal $\{u_1, u_2, \dots, u_k\}$. Si $v \in V$, entonces la **proyección ortogonal** de v sobre H denotada por $\text{proy}_H v$ está dada por