



Figura 2.6.3 En el plano, el gradiente ∇f es ortogonal a la curva $f = \text{constante}$.

Ejemplo 6

Calcular la ecuación del plano tangente a la superficie definida por $3xy + z^2 = 4$ en $(1, 1, 1)$.

Solución

Aquí $f(x, y, z) = 3xy + z^2$ y $\nabla f = (3y, 3x, 2z)$, que en el punto $(1, 1, 1)$ es el vector $(3, 3, 2)$. Por tanto, el plano tangente es

$$(3, 3, 2) \cdot (x - 1, y - 1, z - 1) = 0;$$

es decir,

$$3x + 3y + 2z = 8. \quad \blacktriangle$$

En el Teorema 14 y en la definición posterior, podríamos haber trabajado tanto en dos dimensiones como en tres. Por tanto, si tenemos $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y consideramos una *curva* de nivel

$$C = \{(x, y) \mid f(x, y) = k\},$$

entonces $\nabla f(x_0, y_0)$ es perpendicular a C en cualquier punto (x_0, y_0) de C . Del mismo modo, la recta tangente a C en (x_0, y_0) se expresa mediante la ecuación

$$\nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0) = 0 \quad (2)$$

si $\nabla f(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$; es decir, la recta tangente es el conjunto de puntos (x, y) que satisface la Ecuación (2) (véase la Figura 2.6.3).

Campo vectorial gradiente

A menudo nos referimos a ∇f como un **campo vectorial gradiente**. La palabra “campo” significa que ∇f asigna un vector a cada punto en el dominio de f . En la Figura 2.6.4 describimos el gradiente ∇f no por medio de su gráfica que, si $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, sería un subconjunto de \mathbb{R}^6 —es decir, el conjunto de pares $(\mathbf{x}, \nabla f(\mathbf{x}))$ —, sino representando $\nabla f(P)$, para cada punto P como un vector que parte del punto P , no del origen. Como en una gráfica, este método de representación de ∇f contiene el punto P y el valor $\nabla f(P)$ en la misma imagen.