

Sumas, productos, cocientes

Estas reglas funcionan del mismo modo que en el cálculo de una variable.

Teorema 10 Sumas, productos, cocientes

- (I) **Regla de la multiplicación por una constante.** Sea $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una función diferenciable en \mathbf{x}_0 y sea c un número real. Entonces $h(\mathbf{x}) = cf(\mathbf{x})$ es diferenciable en \mathbf{x}_0 y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) \quad (\text{igualdad de matrices}).$$

- (II) **Regla de la suma.** Sean $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferenciables en \mathbf{x}_0 . Entonces $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x})$ es diferenciable en \mathbf{x}_0 y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{D}g(\mathbf{x}_0) \quad (\text{suma de matrices}).$$

- (III) **Regla del producto.** Sean $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciables en \mathbf{x}_0 y sea $h(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})f(\mathbf{x})$. Entonces $h: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en \mathbf{x}_0 y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = g(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) + f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0).$$

(Obsérvese que cada lado de esta ecuación es una matriz $1 \times n$. En el Ejercicio 31 al final de esta sección se presenta una regla del producto más general.)

- (IV) **Regla del cociente.** Con las mismas hipótesis que en la regla (III), sea $h(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$ y supongamos que g nunca se anula en U . Entonces h es diferenciable en \mathbf{x}_0 y

$$\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = \frac{g(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) - f(\mathbf{x}_0)\mathbf{D}g(\mathbf{x}_0)}{[g(\mathbf{x}_0)]^2}.$$

Demostración Las demostraciones de las reglas (I) a (IV) siguen casi exactamente las mismas líneas que en el caso de una variable, pero con una notación algo diferente. Demostraremos las reglas (I) y (II), y dejaremos las de las reglas (III) y (IV) para el Ejercicio 27.

- (I) Para demostrar que $\mathbf{D}h(\mathbf{x}_0) = c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)$, tenemos que demostrar que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|h(\mathbf{x}) - h(\mathbf{x}_0) - c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0,$$

es decir, que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{\|cf(\mathbf{x}) - cf(\mathbf{x}_0) - c\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)\|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = 0,$$