

$$\begin{aligned}
&= \nabla \times \mathbf{E} + \nabla \times \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \\
&= \nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right).
\end{aligned}$$

Aplicando el Teorema 7 de la Sección 8.3, existe una función con valores reales ϕ en \mathbb{R}^3 tal que

$$\mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = -\nabla \phi.$$

Sustituyendo esta ecuación y $\mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{A}$ en la Ecuación (7) y usando la identidad vectorial (cuya demostración dejamos como ejercicio)

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A},$$

obtenemos

$$\begin{aligned}
\mathbf{J} &= \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) - \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla \phi \right) \\
&= \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} + \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \phi).
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mathbf{J} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \phi).$$

Es decir,

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mathbf{J} + \nabla \left(\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{\partial \phi}{\partial t} \right). \quad (16)$$

De nuevo, utilizando la ecuación $\mathbf{E} + \partial \mathbf{A} / \partial t = -\nabla \phi$ y la ecuación $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho$, obtenemos

$$\rho = \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \left(-\nabla \phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 \phi - \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbf{A})}{\partial t}.$$

Esto es,

$$\nabla^2 \phi = -\rho - \frac{\partial(\nabla \cdot \mathbf{A})}{\partial t}. \quad (17)$$

Ahora explotemos la libertad de nuestra elección de \mathbf{A} . Imponemos la “condición”

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0. \quad (18)$$

Debemos asegurarnos de que podemos hacer esto. Suponiendo que tenemos un \mathbf{A}_0 dado y el correspondiente ϕ_0 , ¿podemos elegir un nuevo $\mathbf{A} = \mathbf{A}_0 + \nabla f$ y luego un nuevo ϕ tal que $\nabla \cdot \mathbf{A} + \partial \phi / \partial t = 0$? Con este