

**EJEMPLO B.5** Determine las formas polares de los siguientes números complejos: i) 1, ii)  $-1$ , iii)  $i$ , iv)  $1 + i$ , v)  $-1 - \sqrt{3}i$  y vi)  $-2 + 7i$ .

**SOLUCIÓN** ► Los seis puntos están graficados en la figura B.5.

i) De la figura B.5a) es evidente que  $\arg 1 = 0$ . Como  $\operatorname{Re} 1 = 1$ , se ve que, en forma polar,  $1 = 1e^{i0} = 1e^0 = 1$ .

ii) Como  $\arg(-1) = \pi$  (figura B.5b) y  $|-1| = 1$ , se tiene

$$-1 = 1e^{i\pi} = e^{i\pi}$$

iii) De la figura B.5c) se ve que  $\arg i = \frac{\pi}{2}$ . Puesto que  $|i| = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$ , se concluye que

$$i = e^{\frac{i\pi}{2}}$$

iv)  $\arg(1 + i) = \tan^{-1}\left(\frac{1}{1}\right) = \left(\frac{\pi}{4}\right)$  y  $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ , de manera que

$$1 + i = \sqrt{2}e^{\frac{i\pi}{4}}$$

v) En este caso,  $\tan^{-1}\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) = \tan^{-1}\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$ . Sin embargo,  $\arg z$  se encuentra en el tercer cuadrante, de manera que  $\theta = \frac{\pi}{3} - \pi = \frac{-2\pi}{3}$ . Además

$$|-1 - \sqrt{3}i| = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$$

por lo que

$$-1 - \sqrt{3}i = 2e^{\frac{-2\pi i}{3}}$$

vi) Para calcular esto se requiere una calculadora. Se encuentra que, en radianes,

$$\arg z = \tan^{-1}\left(-\frac{7}{2}\right) = \tan^{-1}(-3.5) \approx -1.2925$$

Pero  $\tan^{-1} x$  está definida como un número en el intervalo  $\left(\frac{-2\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ . De la figura B.5f),  $\theta$  está en el segundo cuadrante, por lo que se ve que  $\arg z = \pi - \tan^{-1}(3.5) \approx 1.8491$ . Después se ve que

$$|-2 + 7i| = \sqrt{(-2)^2 + 7^2} = \sqrt{53}$$

Así,

$$-2 + 7i \approx \sqrt{53}^{1.8491i}$$

**EJEMPLO B.6** Convierta los siguientes números complejos de la forma polar a la forma cartesiana i)  $2e^{\frac{i\pi}{3}}$ ; ii)  $4e^{\frac{3\pi i}{2}}$ .

**SOLUCIÓN** ► i)  $e^{\frac{i\pi}{3}} = \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)i$ . Entonces  $2e^{\frac{i\pi}{3}} = 1 + \sqrt{3}i$ .

ii)  $e^{\frac{3\pi i}{2}} = \cos 3\frac{\pi}{2} + i \sin 3\frac{\pi}{2} = 0 + i(-1) = -i$ . Entonces  $4e^{\frac{3\pi i}{2}} = -4i$ .

Si  $\theta = \arg z$ , entonces por la ecuación (B.14),  $\arg \bar{z} = -\theta$ . Así, puesto que  $|\bar{z}| = |z|$ ,

Si  $z = re^{j\theta}$ , entonces  $\bar{z} = re^{-j\theta}$

(B.18)