

$$\begin{aligned}
\int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} &= \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) dt && \text{(por definición)} \\
&= \int_a^b \left[\mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \frac{\mathbf{c}'(t)}{\|\mathbf{c}'(t)\|} \right] \|\mathbf{c}'(t)\| dt && \text{(cancelando } \|\mathbf{c}'(t)\| \text{) (1)} \\
&= \int_a^b [\mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{T}(t)] \|\mathbf{c}'(t)\| dt.
\end{aligned}$$

Esta fórmula dice que $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ es igual a algo que es similar a la integral de la componente tangencial $\mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{T}(t)$ de \mathbf{F} a lo largo de \mathbf{c} . De hecho, la última parte de la fórmula (1) es análoga a la integral de una función escalar f a lo largo de la trayectoria \mathbf{c} .³

Para calcular una integral de línea en un caso particular, bien podemos utilizar la definición original o bien integrar la componente tangencial de \mathbf{F} a lo largo de \mathbf{c} , como establece la fórmula (1), dependiendo de que sea más fácil o más apropiado.

Ejemplo 1

Sea $\mathbf{c}(t) = (\sin t, \cos t, t)$ con $0 \leq t \leq 2\pi$. Sea el campo vectorial \mathbf{F} definido por $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$.

Solución

Aquí, $\mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) = \mathbf{F}(\sin t, \cos t, t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, y $\mathbf{c}'(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Por tanto,

$$\mathbf{F}(\mathbf{c}(t)) \cdot \mathbf{c}'(t) = \sin t \cos t - \cos t \sin t + t = t,$$

y por tanto

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} t dt = 2\pi^2. \quad \blacktriangle$$

Otra forma común de escribir las integrales de línea es

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_C F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz,$$

donde F_1, F_2 y F_3 son las componentes del campo vectorial \mathbf{F} . Decimos que la expresión $F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$ es una **forma diferencial**.⁴ Por *definición*, la integral de una forma diferencial a lo largo de una trayectoria \mathbf{c} , donde $\mathbf{c}(t) = (x(t), y(t), z(t))$, es

³Si \mathbf{c} no se corta a sí misma [es decir, si $\mathbf{c}(t_1) = \mathbf{c}(t_2)$ implica que $t_1 = t_2$], entonces cada punto P sobre C (la curva imagen de \mathbf{c}) se puede escribir de forma única como $\mathbf{c}(t)$ para algún t . Si definimos $f(P) = f(\mathbf{c}(t)) = \mathbf{F}(\mathbf{c}) \cdot \mathbf{T}(t)$, f es una función sobre C ; por definición, su integral a lo largo de \mathbf{c} está dada por la fórmula (1) y no existe ninguna dificultad en interpretar literalmente $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ como una integral a lo largo de una trayectoria. Si \mathbf{c} se corta a sí misma, no podemos definir f como una función sobre C como antes (¿por qué?); sin embargo, en este caso sigue siendo útil pensar en el lado derecho de la fórmula (1) como en una integral a lo largo de una trayectoria.

⁴En la Sección 8.5 se proporciona una breve exposición sobre la teoría general de las formas diferenciales.