

## Ficha técnica de virus

<b>Especie huésped</b>	<i>Solanum lycopersicum</i>
<b>Nombre común del huésped</b>	Jitomate, Tomate, Tomatera
<b>Nombre</b>	Beet curly top virus
<b>Nombre en español</b>	Virus de la parte superior rizada de la remolacha
<b>Abreviatura</b>	BCTV
<b>Género</b>	<i>Curtovirus</i>
<b>Familia</b>	<i>Geminiviridae</i>
<b>Especie</b>	<i>Beet curly top virus</i>
<b>Tamaño de la partícula</b>	npi
<b>Tamaño del genoma</b>	2.9–3.0 kb
<b>Tipo de genoma</b>	sin segmentar
<b>Grupo de Baltimore</b>	II
<b>Modo de transmisión</b>	Vector
<b>Transmitido por</b>	Chicharrita de la remolacha (BLH)

### Datos adicionales

Una planta de tomate puede comenzar a mostrar síntomas entre 7 y 14 días después de la infección.

### Referencias

- 
1. [https://extension.usu.edu/pests/research/curly-top-virus-tomato#:~:text=Beet%20Curly%20Top%20Virus%20\(BCTV,Utah%20and%20the%20western%20U.S.](https://extension.usu.edu/pests/research/curly-top-virus-tomato#:~:text=Beet%20Curly%20Top%20Virus%20(BCTV,Utah%20and%20the%20western%20U.S.)
-