

Ficha Técnica de la Encuesta



FICHA TÉCNICA

I. OBJETIVO:

Proveer información actualizada sobre la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños menores de cinco años, así como brindar información sobre el estado y factores asociados a las enfermedades no transmisibles y transmisibles, así como el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento; información que permita estimar los indicadores identificados en los Programas Presupuestales, en el marco de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultado (PpR) que permita el seguimiento, evaluación y formulación de los programas de población y de salud familiar en el país.

II. POBLACIÓN OBJETIVO:

- Los hogares particulares y sus miembros, personas que son residentes habituales y aquellas que no siendo residentes pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista.
- Todas las mujeres de 12 a 49 años de edad y niñas/os menores de 5 años.
- Una persona de 15 años a más de edad por cada hogar particular.
- Todas las niñas y niños menores de 12 años.

III. DISEÑO MUESTRAL 2023

3.1 Antecedentes

Ante la culminación de la muestra maestra para el periodo 2012-2014, fue necesario evaluar este diseño y desarrollar otro diseño muestral para el periodo 2015-2017 y años posteriores.

Una de las debilidades a superar del diseño 2012-2014 fue la variabilidad observada en la estimación de los indicadores básicos como desnutrición crónica, anemia, etc. a nivel de los departamentos predominantemente urbanos y regiones naturales, como la Región Costa, dominios no previstos con sus respectivos niveles de inferencia, pero obtenidos como subproducto de las estimaciones departamentales, esto debido a la baja cobertura de las poblaciones objetivo de la encuesta, esencialmente en niños menores de 5 años.

Con la finalidad de estimar con mayor precisión los indicadores principales de la encuesta y mejorar la cobertura de las poblaciones, se propuso un nuevo diseño muestral a partir del año 2015, previo a ello se realizó una prueba piloto durante el segundo semestre del año 2014, donde se aplicó el muestreo equilibrado. A este tipo de muestreo se le conoce también como el método del cubo, el cual permite obtener muestras con estimaciones de totales aproximadamente iguales a las características de la población objetivo de la encuesta y replica la estructura poblacional dentro de la muestra seleccionada considerando los grupos de edad, sexo y otras variables de equilibrio, logrando mejorar la cobertura de las poblaciones objetivos y las precisiones estadísticas de los indicadores principales. En el 2023 se continuará ejecutando diseño muestral establecido para el periodo 2021-2024, siendo el mismo diseño que se ejecutó para los periodos 2015-2017 y 2018-2020.

Características técnicas del diseño:

- Mejora la cobertura de la población objetivo.
- La muestra de conglomerados seleccionada se ha realizado al 100% del marco maestro de muestreo CPV 2017.
- Existe mayor dispersión de la muestra.
- El número de viviendas seleccionadas en el conglomerado son iguales en los departamentos a nivel urbano y rural.

- Requiere una actualización cartográfica y de registro de viviendas de manera continua para obtener información de sexo y edad de los residentes, que permita una adecuada selección de viviendas que contenga la población objetivo de la encuesta.
- Mejora las precisiones estadísticas de los indicadores, coeficientes de variación menores al 15%.
- La Unidad Primaria de Muestreo (conglomerado) se selecciona con probabilidad proporcional al tamaño, en términos de su peso en viviendas ocupadas empleando el muestreo equilibrado del marco CPV 2017 y la Unidad Secundaria de Muestreo (viviendas) se selecciona del registro de viviendas aplicando el muestreo equilibrado, considerando las variables: niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil y otras poblaciones.
- Para el ajuste de los factores de ponderación se utiliza la información auxiliar recopilada en la etapa de registro de viviendas.
- Los meses de trabajo de campo de la encuesta ha variado en los últimos años, desde sus inicios hasta el 2017 se realizó de marzo a diciembre; en el 2018 de febrero a diciembre. En el año 2019, se realizó de enero a diciembre y va continuar para los próximos años.
- Los conglomerados que tienen la misma numeración en la variable HV001 (conglomerado) en los años 2022 y 2023 son paneles.
- La muestra del primer semestre programada por año es de 18 370 viviendas y 1 627 conglomerados, se realizó la cobertura al 100 %, **asimismo se programaron recuperaciones de las viviendas con resultado ausentes y rechazo en el segundo semestre en los departamentos que presentaron problemas de acceso, por los fenómenos naturales y conflictos sociales.**

3.2 Marco Muestral

El marco muestral, para la selección de la muestra, lo constituye la información estadística y cartográfica proveniente de los Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda del año 2017 (CPV 2017), y el material cartográfico actualizado para tal fin en el proceso de actualización cartográfica realizado para la ejecución de la ENDES.

3.3 Unidades de Muestreo

- En el Área Urbana: El conglomerado y la vivienda particular.
- En el Área Rural: El Área de Empadronamiento Rural y la vivienda particular.

3.4 Tipo de Muestra

La muestra se caracteriza por ser bietápica, probabilística de **tipo equilibrado**, estratificada e independiente, a nivel departamental, por área urbana y rural.

3.5 Tamaño Muestral

El tamaño de la muestra semestral programada de la ENDES es de 18 370 viviendas, correspondiendo:

- 7 420 viviendas al área sede (capitales de departamento y los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana).
- 4 650 viviendas al resto urbano
- 6 300 viviendas al área rural.

3.6 Distribución de la muestra

La distribución de la muestra de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar para el 2023, fue estimada previa evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de las encuestas ENDES ejecutadas en los periodos 2012 a 2020 y los lineamientos del tipo de diseño previamente establecidos para este fin.

Los detalles y características de la muestra se presentan a continuación:

CUADRO N° 1
PERÚ: TAMAÑO DE LA MUESTRA SEMESTRAL DE CONGLOMERADOS Y VIVIENDAS
POR ÁMBITO, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento									Número de Viviendas por Conglomerado		
	Total de conglomerados	Conglomerados			Total de viviendas	Viviendas					
		Sede	Resto Urbano	Rural		Sede	Resto Urbano	Rural	Sede	Resto Urbano	Rural
Perú	1 627	742	465	420	18 370	7 420	4 650	6 300			
Amazonas	60	7	21	32	760	70	210	480	10	10	15
Ancash	55	26	9	20	650	260	90	300	10	10	15
Apurímac	53	9	14	30	680	90	140	450	10	10	15
Arequipa	62	43	13	6	650	430	130	90	10	10	15
Ayacucho	64	20	18	26	770	200	180	390	10	10	15
Cajamarca	53	9	11	33	695	90	110	495	10	10	15
Provincia Constitucional del Callao	65	65	-	-	650	650	-	-	10	0	0
Cusco	53	18	13	22	640	180	130	330	10	10	15
Huancavelica	53	7	8	38	720	70	80	570	10	10	15
Huánuco	60	13	14	33	765	130	140	495	10	10	15
Ica	62	17	40	5	645	170	400	75	10	10	15
Junín	57	17	24	16	650	170	240	240	10	10	15
La Libertad	59	27	21	11	645	270	210	165	10	10	15
Lambayeque	61	28	25	8	650	280	250	120	10	10	15
Lima Metropolitana 1/	169	169			1 690	1 690			10	0	0
Departamento de Lima 2/	60		46	14	670		460	210	0	10	15
Loreto	56	27	14	15	635	270	140	225	10	10	15
Madre de Dios	59	36	10	13	655	360	100	195	10	10	15
Moquegua	60	26	24	10	650	260	240	150	10	10	15
Pasco	57	18	23	16	650	180	230	240	10	10	15
Piura	60	17	33	10	650	170	330	150	10	10	15
Puno	50	6	19	25	625	60	190	375	10	10	15
San Martín	57	16	25	16	650	160	250	240	10	10	15
Tacna	61	51	4	6	640	510	40	90	10	10	15
Tumbes	63	29	29	5	655	290	290	75	10	10	15
Ucayali	58	41	7	10	630	410	70	150	10	10	15

Nota: Conglomerados de Sede, comprende a aquellos seleccionados en las capitales de departamento y de Lima Metropolitana.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

3.7 Niveles de Inferencia:

La muestra semestral de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, es una muestra diseñada para dar estimaciones representativas, en los siguientes dominios:

- **Mensual**
 - Nacional para algunos indicadores para estimaciones con coeficientes de variación menores al 15%.
- **Semestral**
 - Nacional
 - Nacional Urbana
 - Nacional Rural
 - Región Natural: Costa, Sierra y Selva.

IV. MUESTRAS PANELES CON ROTACIÓN

Para realizar la rotación se seleccionará una muestra maestra que contiene 6 submuestras seleccionadas del marco maestro de muestreo CPV 2017. El esquema de rotación adoptado para la encuesta es de la tercera parte de la muestra por año. Es decir, el 33.3% de la muestra sale cada año, y el mismo porcentaje de la muestra es reemplazado cada año. Esto implica que se mantendrá el 66.7% de muestra de conglomerados de un año a otro.

En encuestas bietápicas de hogares, donde las unidades de muestreo son viviendas, es más natural realizar la rotación a nivel de las unidades primarias de muestreo (conglomerados). En cada año un grupo de conglomerados sale de la muestra, y otro grupo entra. A diferencia de las muestras paneles clásicos de otras encuestas, en la ENDES en cada conglomerado, las viviendas seleccionadas son diferentes durante todo el periodo que el conglomerado permanece en la muestra.

La rotación de la muestra se realizará durante 4 años. Se iniciará en el año 2022, en este periodo se mantendrá el 66.7% de la muestra de conglomerados del año anterior y se completará con el 33.3% de una submuestra nueva de conglomerados en cada mes de trabajo. En el año 2024 se concluirá de utilizar las 6 submuestras de la muestra maestra. Para el año 2025 se deberán seleccionar una nueva muestra maestra para continuar con la rotación.

Para ilustrar más fácilmente el esquema de rotación establecido, veamos el siguiente esquema:

FIGURA N° 1
PERÚ: ESQUEMA DE ROTACIÓN DE LAS SUBMUESTRAS DE CONGLOMERADOS DE LA MUESTRA MAESTRA,
ENDES 2021-2024

Semestre	Mes	Año			
		2021	2022	2023	2024
I Semestre	Enero	a b c	a b d	a d e	d e f
	Febrero	a b c	a b d	a d e	d e f
	Marzo	a b c	a b d	a d e	d e f
	Abril	a b c	a b d	a d e	d e f
	Mayo	a b c	a b d	a d e	d e f
	Junio	a b c	a b d	a d e	d e f
II Semestre	Julio	a b c	a b d	a d e	d e f
	Agosto	a b c	a b d	a d e	d e f
	Setiembre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Octubre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Noviembre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Diciembre	a b c	a b d	a d e	d e f

En cada año, se cambiará 1/3 de la muestra.

Donde: a, b, c, d, e, f Submuestras (33,3% c/u) provenientes del marco CPV2017.

V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 Unidad de Investigación:

La unidad de investigación de la encuesta está constituida por:

- Los residentes habituales de viviendas particulares de áreas urbanas y rurales del país que hayan pernoctado la noche anterior, a la encuesta, en la vivienda seleccionada.

Se excluye de la encuesta a:

- Los residentes habituales que no hayan pernoctado la noche anterior a la encuesta en la vivienda seleccionada.
- Visitantes que pasaron la noche anterior al día de la encuesta en la vivienda seleccionada.

5.2 Temas investigados:

En la ENDES 2023 se aplican tres cuestionarios, uno al Hogar y sus miembros, el otro, a todas las mujeres elegibles, es decir, de 12 a 49 años de edad y el Cuestionario de Salud que es aplicado a una persona de 15 años a más.

La cobertura temática con el cuestionario ENDES modificado es la siguiente:

A. Cuestionario del Hogar:

- Características: Demográficas, salud (acceso al seguro de salud), actividad económica y educativa de los miembros del hogar.
- Características básicas de la vivienda: Servicios básicos (agua, desagüe y alumbrado), equipamiento del hogar, estructurales (piso, paredes y techo).
- Programas sociales No Alimentarios: Programa BECA 18, Programa Nacional LURAWI PERPU /TRABAJA PERU, Programa JUNTOS, Programa Nacional Cuna Más (SAF) y Programa PENSIÓN 65.
- Programas Sociales Alimentarios: Programa Social Vaso de Leche, Programa Social Comedor Popular, Programa Nacional Cuna Más (Cuidado Diurno) y Programa Social Qali Warma.
- Registro de la medición antropométrica (peso y talla) en niñas/os menores de 6 años y mujeres de 12 a 49 años.
- Registro de los niveles de hemoglobina niñas/os de 4 meses a menores de 6 años y mujeres de 12 a 49 años.
- Prueba de Yodo en la Sal y Prueba de Cloro Residual en el Agua.

B. Cuestionario Individual de la Mujer y niño:

- Características demográficas y sociales.
- Historia reproductiva.
- Discapacidad.
- Uso de métodos anticonceptivos.
- Atención pre-natal, asistencia del parto y atención puerperal.
- Embarazo y lactancia.
- Inmunización.
- Prevalencia de IRA y EDA.
- Desarrollo Infantil Temprano para niñas/os de 9 a 71 meses.
- Nupcialidad.
- Preferencia de fecundidad.
- Antecedentes del cónyuge y trabajo de la mujer (Experiencia laboral)
- Conocimientos y actitudes respecto al SIDA y otras ITS.
- Mortalidad Materna.
- Violencia Doméstica.

C. Cuestionario de Salud

- Antecedentes de la persona.
- Hipertensión y Diabetes.
- Factores de riesgo de las Enfermedades No transmisibles.
- Salud Bucal y Ocular en Adultos.
- Prevención y Control de Cáncer.
- VIH / SIDA.
- Salud Mental en Adultos.
- Salud Bucal, Ocular y Mental en niñas y niños
- Mediciones de Antropometría y Presión Arterial.

5.3 Instrumentos de recolección:

La recolección de información de cobertura en las viviendas seleccionadas, se efectúa a través de un dispositivo móvil: Tablet.

5.4 Método de recolección de datos:

El método utilizado es por ENTREVISTA DIRECTA (presencial), realizada por personal debidamente capacitado para el recojo de esta información, quienes visitan las viviendas seleccionadas para diligenciar los cuestionarios de la encuesta.

5.5 Informantes:

- **En el Cuestionario del Hogar:** El Jefe/a de Hogar, el (la) esposo/a o persona de 18 años a más.
- **En el Cuestionario Individual:** Mujeres de 12 a 49 años de edad.
- **En el Cuestionario de Salud:** Persona de 15 años a más de edad seleccionada en el hogar.

VI. FACTORES DE PONDERACIÓN

Los factores de ponderación devuelven a las unidades de muestreo seleccionados las probabilidades desiguales de selección permitiendo recomponer la estructura de la población de referencia, al cual también se incorpora el ajuste por falta de respuesta por departamento, área de residencia y estrato socioeconómico; garantizando así la adecuada estimación de los indicadores.

A continuación, se presenta en orden secuencial el procedimiento de elaboración de los ponderadores:

- Probabilidad de selección de los conglomerados (Unidad primaria de muestreo, UPM): se calcula a partir del marco maestro de muestreo.
- Probabilidad de selección de las viviendas (Unidad secundaria de muestreo, USM): En cada conglomerado se seleccionan 2 grupos de viviendas con probabilidad proporcional al número de viviendas (con niños y sin niños) según la información del registro de viviendas y establecimientos.
 - Las viviendas con niños: son todas aquellas viviendas particulares ocupadas que tienen al menos un niño de 0 a 4 años al momento de la actualización de las viviendas listadas en el registro.
 - Las viviendas sin niños: son aquellas viviendas particulares ocupadas que reportaron personas de 5 y más años para el mismo periodo del registro.
- Probabilidad Conjunta: es el producto de las probabilidades de selección de las UPM y USM.
- Factor Básico de Muestreo: Es la inversa de la probabilidad conjunta.
 - ✓ El factor básico de muestreo se ajusta a la no respuesta de las viviendas de la encuesta.
 - ✓ A partir del factor básico de muestreo ajustado a la no respuesta de viviendas, se determina el factor hogar, mujer, niño y de cualquier población objetivo de una encuesta.

Los factores para realizar las estimaciones son los siguientes:

➤ Factor Hogar (HV005)

Es el factor básico de muestreo que ha sido ajustado a la no respuesta de viviendas y se utiliza para el cálculo de los indicadores que están relacionados al hogar, desnutrición y anemia en menores de 5 años.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

HV001: conglomerado, HV022: estrato, peso=HV005/1000000

El factor hogar (HV005) se encuentra en el módulo RECH0 de la base de datos.

➤ **Factor Mujer (V005)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de las mujeres en edad fértil y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, por ejemplo: Planificación familiar de mujeres, parto institucional, demanda insatisfecha de planificación familiar, control prenatal, entre otros.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

V001: conglomerado, V022: estrato, peso=V005/1000000

El factor mujer (V005) se encuentra en el módulo REC0111 de la base de datos.

También se considera los factores para el módulo de salud:

➤ **Para personas de 15 años a más (PESO15_AMAS)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de las personas de 15 años a más y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, por ejemplo: Hipertensión, Diabetes Mellitus, Cáncer, Obesidad, Salud ocular, Salud Bucal, entre otros.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

qhcluster: conglomerado, HV022: estrato, peso= PESO15_AMAS /1000000

El factor de esta población se encuentra en el módulo CSALUD01 de la base de datos.

➤ **Para niños menores de 12 (Pesomen12)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de los menores de 12 años y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, como Salud Bucal y Salud Ocular.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

qhcluster: conglomerado, HV022: estrato, peso= Pesomen12/1000000

El factor de esta población se encuentra en el módulo CSALUD08 de la base de datos.

Definición de Términos e Indicadores



DEFINICIÓN DE TÉRMINOS E INDICADORES

1. INDICADOR

Es una medida o expresión numérica que da cuenta de un aspecto de la realidad seleccionada; en general los indicadores son “Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo (...) productos y alcanzando objetivos”. Entre ellos, la razón, la proporción y la tasa son los indicadores de uso en el presente informe:

1.1 Razón

Es el cociente entre dos números, en el que ninguno o solo algunos elementos del numerador están incluidos en el denominador. Por ejemplo, la razón de niños por mujer cuya expresión de cálculo es la siguiente:

Razón de niños por mujer	Nº de Niños menores de 5 años.	X	1000
	Nº de Mujeres de 15 a 49 años		

1.2 Proporción

La proporción es un tipo especial de razón en la cual los elementos del numerador están incluidos en el denominador. En el numerador, se considera el número de individuos que verifican una condición determinada, por ejemplo: Desnutrido crónico, Mujeres y niños con anemia, niñas y niños con EDA o IRA en las últimas dos semanas, etc. Y, en el denominador el total de los individuos que comprende a los que presentan la condición determinada y los que no presentan dicha condición, cuyo cociente se expresa por uno por cien. Por ejemplo, la proporción de Población Urbana cuya expresión de cálculo es la siguiente:

Proporción de Población Urbana	Población del Área Urbana	X	100
	Población Total (Del área urbana y del área rural)		

1.3 Tasa

Es la frecuencia de los eventos socio-demográficos acaecidos en una población durante un determinado período de tiempo (normalmente un año) dividida entre la población “a riesgo” de sufrir el evento durante ese período de tiempo. La tasa es un tipo especial de proporción o razón que incluye una medida de tiempo en el denominador. Los componentes de una tasa son el numerador, el denominador, el tiempo específico en el que el hecho ocurre y usualmente un multiplicador, potencia de 10, que convierte una fracción decimal en un número entero. Por ejemplo, la Tasa específica de fecundidad por edad cuya expresión de cálculo es la siguiente:

$$\text{Tasa Específica de Fecundidad} = \frac{\text{Nº de Nacimientos de las Mujeres de 20 a 24 años}}{\text{Nº de Mujeres de 20 a 24 años}} \times 1000$$

1.4 Coeficiente de variación

Es una medida estadística que relaciona la desviación estándar con la media estimada en una muestra de población determinada; y, cuyo cociente expresa el nivel o grado de homogeneidad de los valores materia de estimación en la muestra y es indicativo del nivel de precisión de la estimación obtenida:

ESCALA DE PRECISIÓN DEL ESTIMADOR

Intervalo del Coeficiente de Variación (C.V)	Nivel de precisión de la Estimación
Menos de 5%	Muy buena
De 5 a menos de 10%	Buena
De 10 a menos de 15%	Aceptable
De 15% o más	Referencial

1.5 Intervalo de Confianza

El intervalo de confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada.

1.6 Índice de Bienestar

Es un índice compuesto que otorga un nivel socioeconómico al Hogar a partir de las características de la vivienda y la disponibilidad de ciertos bienes de consumo duradero, el cual por extensión se asigna a los integrantes del hogar.

En la construcción del indicador a cada hogar se le asigna un puntaje mediante la metodología del análisis de componentes principales, dependiendo de la tenencia o no de los bienes duraderos y las características de la vivienda; metodología que fuera desarrollada por Shea Rutstein y Kiersten Johnson de Macro Internacional Inc.; y, Deon Filmer y Lant Pritchett del Banco Mundial.

1.7 Quintil de Riqueza

Es la distribución de los Hogares en cinco partes iguales teniendo como unidad de ordenamiento el valor del Índice de Riqueza que éstos alcanzaron, dando lugar a la especificación de un punto de corte para cada uno de ellos.

En el presente documento, el Quintil de Riqueza se presenta en dos versiones. La primera que preserva el puntaje y los valores del Índice de Riqueza de la ENDES 2000, a fin de facilitar el seguimiento de los segmentos de población que mantienen un mismo nivel socioeconómico en el tiempo.

De otro lado, restituyendo el concepto de quintiles, los puntos de cortes son establecidos según la distribución propia del año de la Encuesta.

2. PRESUPUESTO POR RESULTADO

Es un esquema presupuestario que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de resultados a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales para la reasignación, reprogramación y ajustes de las intervenciones.

3. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Son intervenciones articuladas del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a la resolución de un problema central que aqueja a la población de un país. Los programas estratégicos, constituyen el elemento fundamental de gestión del presupuesto por resultado; en tal sentido, responden a un modelo causal para lograr resultados, cuyos niveles guardan una relación lógica de medios-fines, a partir de los insumos, subproductos, productos, resultados intermedios y finales asociados con el conjunto de intervenciones que lo constituyen.

El artículo 10° de la Ley N° 28927 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2007 estableció el inicio de la aplicación de la gestión presupuestaria basada en resultados, a través de instrumentos como la Programación Presupuestaria Estratégica, metas físicas, indicadores de resultados y el desarrollo de pruebas piloto de evaluación.

En cumplimiento del citado marco normativo, la Dirección Nacional del Presupuesto Público durante el primer semestre del año fiscal 2007, inició los trabajos para el diseño de un conjunto de intervenciones bajo el nuevo enfoque de Presupuesto por Resultados (PPR) dando como resultado la constitución de los cinco primeros Programas Presupuestales que se detallan a continuación:

- Programa Articulado Nutricional
- Salud Materno Neonatal
- Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo
- Acceso a Servicios Sociales Básicos y
- Acceso de la Población a la Identidad

3.1 Programa Presupuestal Articulado Nutricional

Este Programa Estratégico tiene por finalidad reducir la Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años, mejorando la alimentación y nutrición del menor de 36 meses, reduciendo la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes; además, busca reducir la incidencia de bajo peso al nacer.

3.2 Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

El Programa Salud Materno Neonatal busca reducir la Mortalidad Materna y Neonatal, para ello propone dar atención universal a los niños y adolescentes y poner a disposición servicios de planificación familiar, ofrecer atención prenatal de calidad, identificando factores de riesgo, asegurar la atención del parto y del recién nacido por personal calificado; y, fortalecer los servicios de atención obstétrica básica.

3.3 Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad

Este Programa Estratégico tiene por finalidad reducir la proporción de peruanos cuyo nacimiento no está registrado y como tal no tienen Documento Nacional de Identidad - DNI. Estar indocumentado hace invisible a la persona y no le permite la existencia legal ante el Estado. Por esta razón, no son considerados en los programas sociales, ni favorecidos por los beneficios sociales que ofrece el Estado, restringiéndose su desarrollo personal y el ejercicio de su ciudadanía.

INDICADOR N°01

PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA

DEFINICIÓN

Porcentaje de hogares que consumen agua tratada: Obtenida de red pública o agua que no proviene de red pública pero que recibe tratamiento antes de consumirla: Hervida, con cloro, con desinfección solar o agua embotellada.

JUSTIFICACIÓN

El agua tiene una estrecha relación con la vida de las personas pues es un agente esencial de salud o enfermedad. Si el agua está contaminada se convierte en uno de los principales vehículos de transmisión de enfermedades, las que afectan a los grupos más desprotegidos de la población, entre ellos, a las niñas y niños.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a los hogares

Agua tratada:

La variable agua tratada se construye a partir de la pregunta 40 (¿Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua que utilizan en su hogar para tomar o beber?) del Cuestionario del Hogar, Sección 2 (Características de la vivienda); respondieron:

1. El código 11 (Dentro de la vivienda) o
2. El código 91 (Agua embotellada) o
3. Los códigos: 12 (Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio), 13 (Pilón/Grifo público), 21 (Pozo en casa/patio/lote), 22 (Pozo público), 31 (Manantial), 32 (Río/acequia/laguna), 41 (Agua de lluvia), 51 (Camión /tanque/aguatero), 96 (Otro); y en la pregunta 47 (En su hogar, ¿Habitualmente toman o beben agua tal como viene del caño, pozo o fuente de abastecimiento?; respondieron el código 2 (La hierben), 3 (Le echan lejía/cloro) o 6 (Desinfección solar)

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=HV005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I18 = \frac{TH_AT}{TH} \times 100$$

Donde:

TH_AT: Total de hogares que consume agua tratada

TH: Total de hogares

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23

RECH0

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
40	¿Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua que utilizan en su hogar para tomar o beber?	RED PÚBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA..... 11 FUERA DE LA VIVIENDA, PERO DENTRO DEL EDIFICIO..... 12 PILÓN / GRIFO PÚBLICO..... 13 AGUA DE POZO POZO EN LA CASA/PATIO/LOTE..... 21 POZO PÚBLICO..... 22 AGUA DE SUPERFICIE MANANTIAL (PUQUIO)..... 31 RÍO / ACEQUIA / LAGUNA..... 32 OTRAS AGUA DE LLUVIA..... 41 CAMIÓN TANQUE / AGUATERO..... 51 AGUA EMBOTELLADA..... 91 OTRO..... 96 (ESPECIFIQUE)	→ 42 → 47 → 45 → 47 → 45 → 47 → 45
41	¿Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua que utilizan en su hogar?	RED PÚBLICA DENTRO DE LA VIVIENDA..... 11 FUERA DE LA VIVIENDA, PERO DENTRO DEL EDIFICIO..... 12 PILÓN / GRIFO PÚBLICO..... 13 AGUA DE POZO POZO EN LA CASA/PATIO/LOTE..... 21 POZO PÚBLICO..... 22 AGUA DE SUPERFICIE MANANTIAL (PUQUIO)..... 31 RÍO / ACEQUIA / LAGUNA..... 32 OTRAS AGUA DE LLUVIA..... 41 CAMIÓN TANQUE / AGUATERO..... 51 OTRO..... 96 (ESPECIFIQUE)	→ 47 → 45 → 47 → 45

47	En su hogar, ¿Habitualmente toman o beben agua tal como viene del caño, pozo o fuente de abastecimiento?	TOMAN TAL COMO VIENE DE LA FUENTE.....	01	
		LA HIERVEN.....	02	
		LE ECHAN LEJÍA / CLORO.....	03	
		UTILIZA UN FILTRO ESPECIAL PARA AGUA.....	04	
		FILTRA A TRAVÉS DE UNA TELA.....	05	
		DESINFECCIÓN SOLAR.....	06	
		DEJA REPOSAR.....	07	
		TOMAN AGUA EMBOTELLADA.....	91	→ 53
		OTRO.....	96	
		(ESPECIFIQUE)		

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P40	HV201	RECH23
P41	HV202	RECH23
P47	HV237A HV237B HV237E	RECH23

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* Generando la variable "Agua segura".
if (sysmis(hv201) ) hv201=hv202.
recode hv201 ( 11 thru hi=0) into agua.
if ( hv201 =11 | (hv201>11 & (hv237a=1 | hv237b=1 | hv237e=1)) ) agua= 1.
if (hv201=71) agua= 1.
var label agua ' Agua segura'.
val label agua 1 'Si' 0 'No'.
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programas Articulado Nutricional.

INDICADOR N°02

PORCENTAJE DE HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO

DEFINICIÓN

Porcentaje de hogares con saneamiento básico: Servicio higiénico conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pozo séptico o letrina.

JUSTIFICACIÓN

Medir el nivel de sanidad del hogar, ya que la disponibilidad de instalaciones sanitarias (baño, letrina, etc.) son factores importantes para el control de enfermedades y la mejora de la salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a los hogares

Saneamiento básico:

La variable saneamiento básico se construye a partir de la pregunta 53 (¿Qué tipo de servicio higiénico tiene su hogar?) del Cuestionario del Hogar, Sección 2 (Características de la vivienda); respondieron alguno de los códigos detallados:

1. 11(Dentro de la vivienda)
2. 12(Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio)
3. 21(Pozo séptico/Tanque séptico)
4. 31(Letrina mejorada ventilada)
5. 32(Letrina mejorada ecológica/Abonera/Compostera)
6. 34(Pozo ciego o negro con tratamiento de cal, ceniza, estiércol, aserrín, arena)
7. 35 (Pozo ciego o negro)

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=HV005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I_{19} = \frac{TH_SB}{TH} \times 100$$

Donde:

TH_SB: Total de hogares con saneamiento básico

TH: Total de hogares

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:
RECH23
RECH0.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
53	¿Qué tipo de servicio higiénico tiene su hogar?	CONECTADO A RED PÚBLICA DE DESAGÜE DENTRO DE LA VIVIENDA..... 11 FUERA DE LA VIVIENDA, PERO DENTRO DEL EDIFICIO..... 12 POZO SÉPTICO/ TANQUE SÉPTICO..... 21	
	SI TIENE LETRINA SONDEE EL TIPO	LETRINA MEJORADA VENTILADA..... 31 MEJORADA ECOLÓGICA / ABONERA / COMPOSTERA..... 32 MEJORADA COLGANTE / FLOTANTE..... 33 POZO CIEGO O NEGRO CON TRATAMIENTO DE CAL, CENIZA, ESTIÉRCOL..... 34 ASERRÍN, ARENA..... 35 OTRAS RÍO, ACEQUIA O CANAL..... 41 NO HAY SERVICIO (MATORRAL / CAMPO)..... 51 OTRO..... 96	61
		(ESPECIFIQUE)	

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P53	HV205	RECH23

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* Generando la variable "Saneamiento básico".
recode hv205 (11 thru 23 =1)(24 thru 96=0) into desag .
var label desag 'saneamiento basico'.
val label desag 1 'Si' 2 'No'.
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programas Articulado Nutricional.

INDICADOR N°03

PORCENTAJE DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BÁSICO

DEFINICIÓN

Porcentaje de hogares rurales con saneamiento básico: Servicio higiénico conectado a red pública de desagüe dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pozo séptico o letrina.

JUSTIFICACIÓN

Medir el nivel de sanidad del hogar, ya que la disponibilidad de instalaciones sanitarias (baño, letrina, etc.) son factores importantes para el control de enfermedades y la mejora de la salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a los hogares del área rural

Saneamiento básico rural:

La variable saneamiento básico se construye a partir de la pregunta 53 (¿Qué tipo de servicio higiénico tiene su hogar?) del Cuestionario del Hogar, Sección 2 (Características de la vivienda); respondieron alguno de los códigos detallados:

1. 11(Dentro de la vivienda)
2. 12(Fuera de la vivienda, pero dentro del edificio)
3. 21(Pozo séptico/Tanque séptico)
4. 31(Letrina mejorada ventilada)
5. 32(Letrina mejorada ecológica/Abonera/Compostera)
6. 34(Pozo ciego o negro con tratamiento de cal, ceniza, estiércol, aserrín, arena)
7. 35 (Pozo ciego o negro)

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=HV005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I_{20} = \frac{TH_SBR}{TH} \times 100$$

Donde:

TH_SBR: Total de hogares del área rural con saneamiento básico

TH: Total de hogares

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:
RECH23
RECH0

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 2: CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

N°	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
53	¿Qué tipo de servicio higiénico tiene su hogar?	CONECTADO A RED PÚBLICA DE DESAGÜE DENTRO DE LA VIVIENDA..... 11 FUERA DE LA VIVIENDA, PERO DENTRO DEL EDIFICIO..... 12 POZO SÉPTICO/ TANQUE SEPTICO 21 LETRINA MEJORADA VENTILADA..... 31 MEJORADA ECOLÓGICA / ABONERA / COMPOSTERA..... 32 MEJORADA COLGANTE / FLOTANTE..... 33 POZO CIEGO O NEGRO CON TRATAMIENTO DE CAL, CENIZA, ESTIÉRCOL..... 34 ASERRÍN, ARENA..... 35 OTRAS RÍO, ACEQUIA O CANAL..... 41 NO HAY SERVICIO (MATORRAL / CAMPO)..... 51 OTRO..... 96 (ESPECIFIQUE)	61

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

N° de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P53	HV205	RECH23

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* Generando la variable "Saneamiento básico".
recode hv205 (11 thru 23 =1)(24 thru 96=0) into desag .
var label desag 'saneamiento basico'.
val label desag 1 'Si' 2 'No'.
exe.
```

```
use all.
compute filter_$=(hv205=2).
filter by filter_$.
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programas Articulado Nutricional.

INDICADOR N°04

PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS (PATRÓN OMS)

DEFINICIÓN

Porcentaje niñas y niños menores de cinco años de edad cuya talla para la edad está a dos desviaciones estándar por debajo de la mediana del Patrón de Crecimiento Internacional tomado como población de referencia (Patrón OMS)

JUSTIFICACIÓN

La desnutrición crónica se determina al comparar la talla de la niña o niño con la esperada para su edad y sexo. La desnutrición crónica es el estado en el cual las niñas y niños tienen baja estatura con relación a una población de referencia, refleja los efectos acumulados de la inadecuada alimentación o ingesta de nutrientes y de episodios repetitivos de enfermedades (principalmente diarreas e infecciones respiratorias) y, de la interacción de ambas.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La medición de la talla y el peso es la que determina el indicador de desnutrición, por lo que debe ser tomado con precisión por parte de las antropometristas. Los errores en esta parte influyen en el indicador.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a todos los menores de cinco años de edad que durmieron la noche anterior a la entrevista en el hogar entrevistado (HV103=1)

Los niños menores de 2 años se tallan echados (longitud) y los niños de 2 años a más se tallan parados (estatura)

Las variables de desnutrición crónica se construyen a partir de las preguntas del Cuestionario del hogar, Características de los miembros del hogar (Sección 1) y Medición de peso y talla (Sección 4)

Sección 1.

- 1) Pregunta 5: ¿Durmió "nombre de la niña o niño" aquí anoche? respondieron el código 1 (Si)
- 2) Pregunta 6: Sexo de la niña o niño

Sección 4.

- 3) Pregunta P205: Talla en centímetros
- 4) Pregunta P207A: Fecha de la medición (peso y talla)
- 5) Pregunta P203: Fecha de nacimiento de la niña o niño

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (HV007) = 2015, entonces: $PESO = HV005X / 1\ 000\ 000$

Si: Año de entrevista (HV007) $\neq$ 2015, entonces: $PESO = HV005 / 1\ 000\ 000$

Si: Año de entrevista (HV007) $\neq$ 2015 y (HV007) $\neq$ 2020, entonces: $PESO = HV005 / 1\ 000\ 000$

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I2 = \frac{TN<5DC}{TN<5} \times 100$$

Donde:

TN<5DC: Total de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS).

TN<5: Total de niñas y niños menores de cinco años edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos (Llave):

RECH6 (HHID + HC0)

RECH1 (HHID + HVIDX)

RECH0 (HHID)

RECH23 (HHID)

Donde:

HC0=HVIDX

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4. MEDICIÓN DEL PESO Y TALLA – CUESTIONARIO DEL HOGAR

IDENTIFIQUE EN LA COLUMNA (10) DEL LISTADO DEL HOGAR A TODOS LOS MENORES DE 6 AÑOS DE EDAD; Y EN LAS PREGUNTAS 200 Y 201 DE LA SIGUIENTE TABLA REGISTRE EL N° DE ORDEN Y NOMBRE QUE ELLOS TIENEN. LUEGO, MUJER POR MUJER, VEA LA PREGUNTA 217 Y 215 DEL CUESTIONARIO INDIVIDUAL Y NIÑO POR NIÑO, TRANSCRIBA EN LA PREGUNTA 202 Y 203 LA EDAD, DÍA, MES Y AÑO DE NACIMIENTO. POSTERIORMENTE, CONTÍNE CON EL REGISTRO DE LAS MEDICIONES Y LOS DATOS CORRESPONDIENTES.

N° DE ORDEN CIRCULADO EN COL. 10	NOMBRE DE LA COL. (2) DEL L.H.	EDAD PGTA 217 DEL C.I.	¿Cuál es la fecha de nacimiento de (NOMBRE)? * PREGUNTA 215 DEL C. I.	PESO (KILOGRAMOS)	TALLA (CENTÍMETROS)	MEDIDO ACOSTADO O PARADO	RESULTADO 1 MEDIDO (A) 2 NO PRESENTE 3 RECHAZO 5 MEDIDO (A) PARCIALMENTE 6 OTRO	FECHA DE LA MEDICIÓN
(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(207 A)
			DÍA MES AÑO			ACOST. PAR.		DÍA MES
						1 2		

SECCIÓN 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR – CUESTIONARIO DEL HOGAR

Nº OR-DEN	RESIDENTES HABITUALES Y VISITANTES	RELACIÓN CON EL JEFE DEL HOGAR	LUGAR DE RESIDENCIA	SEXO	EDAD	FECHA DE NACIMIENTO	ESTADO CIVIL	ELEGIBILIDAD			
	Digame por favor los nombres y apellidos de las personas que habitualmente viven en su hogar y de los visitantes que pasaron la noche anterior aquí, empezando por el Jefe del Hogar	¿Cuál es la relación de parentesco de (NOMBRE) con el Jefe del Hogar? 01 JEFE 02 ESPOSA / ESPOSO 03 HIJO / HIJA 04 YERNO / NUERA 05 NIETO / NIETA 06 PADRE / MADRE 07 SUEGRO / SUEGRA 08 HERMANO / A 09 OTRO FAMILIAR 10 HIJO ADOPTADO / HIJO DE CRIANZA 11 SIN PARENTESCO 12 EMPLEADA DOMÉSTICA	¿Vive (NOMBRE) habitualmente aquí? ¿Durmíó (NOMBRE) aquí anoche?	¿Es (NOMBRE) hombre o mujer?	¿Cuántos años cumplidos tiene? ¿Qué día y mes es el cumpleaños de (NOMBRE)? ANOTE "99" PARA MENOR DE UN AÑO	PERSONAS DE 15 AÑOS A MÁS PERSONAS DE 12 AÑOS Y MÁS ¿Cuál es su estado civil o conyugal? 1 CONVIVIENTE 2 CASADO(A) 3 VIUDO(A) 4 DIVORCIADO(A) 5 SEPARADO(A) 6 SOLTERO(A)	CIRCULE EL NÚMERO DE ORDEN DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS	CIRCULE EL NÚMERO DE ORDEN DE LAS MUJERES DE 12 A 14 AÑOS	CIRCULE EL NÚMERO DE ORDEN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7A)	(8)	(9)	(9A)	(10)
			SI NO	SI NO	H M	EN AÑOS	DÍA MES				

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P5	HV103	RECH1
P205, (P207A – P203), P6	HC70	RECH6

Donde:

- HC70: Talla/Edad Desviación Standard (de acuerdo con OMS). Son puntuaciones o índices calculados en base a la Talla, Sexo y la Edad en días (mediante la fecha de medición (P207A) y la fecha de nacimiento (P203) del niño(a)) en comparación al Patrón OMS.
- Las estimaciones se refieren a las niñas y niños nacidos en el periodo 0-59 meses anteriores a la encuesta. Cada índice (HC70) se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por la OMS. Las niñas y niños se clasifican como desnutridos si están por debajo de -2 desviaciones estándar (DE) de la media de la población de referencia.

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Desnutrición".

do if hv103=1.

if (hc70 < -200) desnwho=1.

if (hc70 >= -200 & hc70<601) desnwho=0.

end if.

val lab desnwho

0 'No desnutrido' 1 'Desnutrido'.

Execute.

Nota: El cálculo de las puntuaciones o z-scores obtenido en la variable HC70, se realiza con la metodología proporcionada por la OMS, mayor información se encuentra en el siguiente link: <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/software>

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°05

PORCENTAJE DE MENORES DE 6 MESES CON LACTANCIA MATERNA

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de niñas y niños menores de seis meses de edad cuya única fuente de alimentos fue la leche materna el día anterior al día de la entrevista.

JUSTIFICACIÓN

La lactancia materna exclusiva es la práctica de alimentar a la niña o niño con solo leche materna, libre de contaminantes y gérmenes, previene las infecciones respiratorias agudas y refuerza su sistema inmunológico, razón por la cual es considerada como el único alimento capaz de satisfacer todas las necesidades nutricionales de la niña o niño durante los primeros seis meses de vida, sin requerir otros alimentos o agregados como agua o jugos.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de la informante, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, al no declarar correctamente sobre el consumo de líquidos y alimentos en el periodo de lactancia.

PRECISIONES TÉCNICAS

Tener en cuenta que la niña o niño esté actualmente lactando, y solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni bebida, ni siquiera agua.

Para el cálculo del indicador se considera solo al último hijo nacido vivo menor de 6 meses de las mujeres entrevistadas de 15 a 49 años de edad y que vive con ella.

Lactancia:

La variable lactancia, se construye a partir de las preguntas del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia):

- 1) Pregunta 438: ¿Aún le está dando pecho (leche materna) a (NOMBRE)? respondieron el código 1 (Si);
- 2) Pregunta 492: Ahora me gustaría preguntarle acerca de los líquidos que (NOMBRE) bebió ayer durante el día o la noche. Ayer durante el día o la noche (NOMBRE) bebió:) respondieron el código 2 (No) para las alternativas A, B, C, D, E, F, G; y
- 3) Pregunta 493 (Ahora me gustaría preguntarle acerca de los tipos de alimentos que (NOMBRE) comió ayer durante el día o la noche separados o combinados con otros alimentos. Ayer durante el día o la noche (NOMBRE) comió:), respondieron el código 2 (No) para todas las alternativas: desde A hasta P.

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I3 = \frac{LACT}{TN<6} \times 100$$

Donde:

LACT: Total de niñas y niños menores de seis meses de edad cuya única fuente de alimentación es la leche materna.

TN<5: Total de niñas y niños menores de seis meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos (Llave):

REC41 (CASEID + MIDX)

REC42 (CASEID)

REC0111 (CASEID)

REC21 (CASEID + BIDX)

REC91 (CASEID)

RECH23 (HHID)

Donde:

BIDX = MIDX

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4A. EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA – CUESTIONARIO INDIVIDUAL

	NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
434	¿Le dió pecho (leche materna) alguna vez a (NOMBRE)?	SI..... 1 (PASE A 436) ← NO..... 2	SI..... 1 (PASE A 436) ← NO..... 2	SI..... 1 (PASE A 436) ← NO..... 2
437	VERIFIQUE 404: NIÑA / O VIVA / O	VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 439)	VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 439)	VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 439)
438	¿Aún le está dando pecho (leche materna) a (NOMBRE)?	SI..... 1 (PASE A 440A) ← NO..... 2	SI..... 1 (PASE A 440A) ← NO..... 2	SI..... 1 (PASE A 440A) ← NO..... 2
439	¿Durante cuántos meses le dió Ud. pecho (leche materna) a (NOMBRE)? SI MENOS DE UN MES ANOTE "00"	MESES..... NO SABE..... 98	MESES..... NO SABE..... 98	MESES..... NO SABE..... 98

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD – CUESTIONARIO INDIVIDUAL

SECCION II: INMUNIZACION Y SALUD

CUESTIONARIO INDIVIDUAL

492	Ahora me gustaría preguntarle acerca de los líquidos que (NOMBRE) bebió ayer durante el día o la noche. Ayer durante el día o la noche (NOMBRE) bebió:			
		SI	NO	NO SABE
a.	¿Agua sola (sin mezclar con nada)?.....	1	2	8
b.	¿Leche en polvo para bebé (NAM, S26, SIMILAC, etc.)?.....	1	2	8
c.	¿Leche materna refrigerada / conservada?.....	1	2	8
d.	¿Cualquier otra leche (fresca, evaporada o en polvo)?.....	1	2	8
e.	¿Jugo de fruta?.....	1	2	8
f.	¿Te/café?.....	1	2	8
g.	¿Cualquier otro líquido como bebidas gaseosas, caldo?.....	1	2	8

493	Ahora me gustaría preguntarle acerca de los tipos de alimentos que (NOMBRE) comió ayer durante el día o la noche separados o combinados con otros alimentos.			
Ayer durante el día o la noche (NOMBRE) comió:				
		SI	NO	NO SABE
a.	¿Harina, pan, fideos, galletas o cualquier comida hecha de cereales?.....	1	2	8
b.	¿Camote, zapallo, zanahoria?.....	1	2	8
c.	¿Habas, frijol, lenteja, soya, pallares, garbanzos, arvejas?.....	1	2	8
d.	¿Comida hecha de tubérculos o raíces (papa, yuca, olluco, oca, mashua)?	1	2	8
e.	¿Alguna verdura de hojas verdes oscuras (espinaca, acelga, etc.)?.....	1	2	8
f.	¿Mango, papaya, aguaje?.....	1	2	8
g.	¿Naranja, mandarina, lima, maracuya, toronja?.....	1	2	8
h.	¿Otras frutas (plátano de isla, plátano de seda, maduro, manzana, palta, etc.)?.....	1	2	8
i.	1. ¿Carne de res, hígado, otras vísceras?.....	1	2	8
	2. ¿Carne de pollo, pescado, mariscos, mondongo, otras carnes?.....	1	2	8
j.	¿Huevos?.....	1	2	8
k.	¿Queso, yogurt u otros alimentos preparados con leche (leche asada, helados, crema volteadas, etc.)?.....	1	2	8
l.	¿Cualquier comida hecha con aceite, manteca o mantequilla o al que le agregó aceite, manteca, mantequilla?.....	1	2	8
m.	¿Papilla de Programas Sociales?.....	1	2	8
n.	¿Cualquier otra comida sólida o semisólida?.....	1	2	8
o.	¿Cualquier fruta seca?.....	1	2	8
p.	¿Cualquier alimento azucarado como chocolates, caramelos u otros?.....	1	2	8

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P434 =2, P438=1 y P439	M4	REC41
P492A	V409	REC42
P492B	V411A	REC42
P492C	V411	REC42

P492D	V412	REC42
P492E	V410	REC42
P492F	V410A	REC42
P492G	V413	REC42
P493A	V414E	REC42
P493B	V414I	REC42
P493C	V414O	REC42
P493D	V414F	REC42
P493E	V414J	REC42
P493F	V414K	REC42
P493G	V414A	REC42
P493H	V414L	REC42
P493I	V414H	REC42
P493J	V414G	REC42
P493K	V414P	REC42
P493L	V414Q	REC42
P493M	V414B	REC42
P493N	V414S	REC42
P493O	V414C	REC42
P493P	V414R	REC42

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Lactancia".

Recode M4 (0 thru 94=1) (95=2) into lacta.

Vector V=V409 to V414u.

Loop #I=1 to 35.

If (V(#I)=1) lacta =1 .

End loop.

Val label lacta 1 'No lacta, lacta y otro alimentos' 2 ' Solo lacta'.

if (edadm<6 & lacta<3) lact_xcl=0.

if (edadm<6 & lacta=2) lact_xcl=1.

var label lact_xcl ' lactancia en menores de 6 meses'.

Donde:

- La variable M4 refiere a la Duración de la lactancia y proviene de la pregunta P439: ¿Durante cuántos meses le dio Ud. Pecho (leche materna) a (NOMBRE)? Además, la variable M4 contiene la recodificación de las categorías 94 y 95 construidas con las preguntas 438 y 434. Es decir:

M4 =95, Si en la Pregunta 438: ¿Aún le está dando pecho (leche materna) a (NOMBRE)? respondieron el código 1 (Si);

M4=94, Si en la Pregunta 434 ¿Le dio pecho (leche materna) alguna vez a (NOMBRE)? respondieron el código 2 (No);

- las variables V409 hasta V414u provienen de las alternativas de las preguntas 492 y 493 sobre los líquidos y alimentos que consumió el niño(a).

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°06

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON PREVALENCIA DE ANEMIA

DEFINICIÓN

Porcentaje niñas y niños menores de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia, es decir con menos de 11 gramos de hemoglobina por decilitro de sangre.

JUSTIFICACIÓN

La anemia tiene además un gran impacto en el desarrollo emocional, cognitivo y motor de las niñas y niños menores de 36 meses, y, por ser un problema de salud multicausal, debe ser abordado de manera intersectorial e intergubernamental, de modo que se garanticen intervenciones efectivas que aborden los distintos factores asociados y sean capaces de reducir su incidencia.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La medición de la hemoglobina es a partir de una muestra de sangre capilar (una gota). La hemoglobina es medida a través del Sistema Hemocue, que se basa en el método de la azidametahemoglobina. El personal que toma la muestra requiere ser estandarizado por el CENAN – INS.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que durmieron la noche anterior en el hogar al día de la entrevista (HV103=1), con resultado del cuestionario del hogar completo (HV15=1) y con medición de hemoglobina (HC55=0)

En zonas geográficas ubicadas por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar (msnm), se debe realizar el ajuste del valor de la hemoglobina observada.

Anemia:

A partir de la Variable HC53 (Prueba de Hemoglobina de los Niños); se crea la variable HAJ (hemoglobina ajustada) mediante la siguiente fórmula:

$$\begin{aligned} \text{Si: } HV040 < 1000, \text{ entonces } HAJ &= (HC53/10) \\ \text{Si: } HV040 \geq 1000 \text{ entonces } HAJ &= ((HC53/10 - (-0.032 * \text{alt} + 0.022 * \text{ALT} * \text{ALT}))) \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta que ALT es Altura en MSNM: $ALT = (HV040/1000) * 3.3$

La clasificación de la anemia en severa, moderada o leve y se hace con los siguientes puntos de corte para niñas y niños de 6 a 59 meses (NTS N°134-MINSA/2017):

Anemia severa: < 7,0 g/dl Anemia
moderada: 7,0-9,9 g/dl Anemia
leve: 10,0-10,9

La edad en meses de los niñas y niños esta especificada en la variable HC1

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (HV007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000 Si:
Año de entrevista (HV007) <>2015, entonces: PESO=HV005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I4 = \frac{TN6 < 35A}{TN6 < 35} * 100$$

Donde:

TN6<35A: Total de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con anemia

TN6<35: Total de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH0, RECH1, RECH6, RECH23, REC0111, REC21.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 5. PRUEBA DE HEMOGLOBINA - CUESTIONARIO DEL HOGAR

Nº DE ORDEN CIRCULADO EN COL. 10	NIÑA / O A NIÑA / O VEA PGTA 203. LUEGO, CIRCULE EN PGTA 208 SEGÚN CORRESPONDA	PGTE POR RESPONSABLE DE ESTA PERSONA Y ANOTE EL Nº DE ORDEN QUE EL RESPONSABLE TIENE EN EL L. H. SI NO ESTÁ EN ÉSTE, ANOTE "00".	LEA LA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO A CADA MUJER O PERSONA RESPONSABLE, DE ACUERDO AL CASO CIRCULE CÓDIGO	NIVEL DE HEMOGLOBINA (G/DL)	HORA DE LA TOMA DE HEMOGLOBINA	FECHA DE LA MEDICIÓN	RESULTADO 1 MEDIDO(A) 2 NO PRESENTE 3 RECHAZÓ 6 OTRO
	(208)	(209)	(210)	(211)	(212 A)	(212 B)	(213)
	4 MESES Y MAS..... 1 OTRO..... 2 PASE SGTE. NIÑA / O ←		ACEPTÓ..... 1 RECHAZÓ / OTRO..... 2 PASE A 213 ←	-	HORA MINUTOS 	DÍA MES 	

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

N° de Pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P5	HV103	RECH1
P211	HC53	RECH6
P213	HC55	RECH6

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* Generando la variable "Anemia".  
Compute ALT= (HV040/1000)*3.3. IF  
(HV040<1000) HAJ= (HC53/10).  
IF (HV040>=1000) HAJ= ((HC53/10 -(-0.032*ALT+0.022*ALT*ALT))). Do if  
HV103=1.  
If (HAJ>1 & HAJ<11) Anemia=1.  
If (HAJ>=11 & HAJ<30) Anemia=0.  
end if.  
Val lab anemia 1 'Anemia' 0 'Sin anemia'.  
Execute.
```

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°07

PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES LA ENCUESTA TUVIERON IRA

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses que tuvieron alguna Infección Respiratoria Aguda - IRA. Se define la infección respiratoria aguda como el conjunto de infecciones del aparato respiratorio causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros con un periodo inferior a 15 días, con la presencia de uno o más síntomas o signos clínicos como: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria, los cuales pueden estar acompañados de fiebre.

JUSTIFICACIÓN

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en ocasiones se convierten en neumonía. Las infecciones respiratorias agudas constituyen un importante problema de salud pública, pues resultan con la mortalidad más alta en el mundo. Las IRA son más frecuentes cuando se producen cambios bruscos en la temperatura y en ambientes muy contaminados.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de la madre en el tiempo de referencia “últimos 14 días” considerado hasta el día anterior de la entrevista. Asumiendo que la entrevistada haya entendido el sentido de la pregunta.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños menores de 36 meses de edad

IRA:

La variable IRA, se construye a partir de las preguntas del Cuestionario Individual, Sección 4B (Inmunización y Salud):

- 1) Pregunta 468: ¿En los últimos 14 días, es decir, entre el “___” y el día de ayer, ¿(NOMBRE) ha tenido tos? respondieron el código 1 (Sí); y
- 2) Pregunta 468A: Cuando (NOMBRE) estuvo enfermo con tos, ¿respiraba más rápido que de costumbre, con respiraciones cortas y agitadas? respondieron el código 1 (Sí)

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000Si:

Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I5 = \frac{TN < 36IRA}{TN < 36} * 100$$

Donde:

TN<36IRA: Total de niñas y niños menores de 36 meses de edad que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron infección respiratoria aguda (IRA)

TN<36: Total de niñas y niños menores de 36 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD – CUESTIONARIO INDIVIDUAL

NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
468	En los últimos 14 días, es decir, entre el y el día de ayer, ¿(NOMBRE) ha tenido tos? SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 469) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 469) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 469) ←
468A	Cuando (NOMBRE) estuvo enfermo con tos, ¿respiraba más rápido que de costumbre, con respiraciones cortas y agitadas? SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 469) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 469) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 469) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

N° de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P468A	H31B	REC43
P468	H31	REC43

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* Generando la variable "IRA".  
RECODE H31B (1=1) (ELSE=0) INTO IRA.  
if (sysmis(h31) ) IRA=h31.  
val label IRA 0 'no' 1 'si' .  
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°08

PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES LA ENCUESTA TUVIERON EDA

DEFINICIÓN

Porcentaje niñas y niños menores de 36 meses de edad con enfermedad diarreica aguda (EDA) en los últimos 14 días. Se define como diarrea la eliminación de heces líquidas o semilíquidas en número de tres o más en 24 horas o bien una sola con moco, sangre o pus durante un máximo de dos semanas.

JUSTIFICACIÓN

La Enfermedad Diarreica Aguda es una enfermedad intestinal generalmente infecciosa, caracterizada por evacuaciones líquidas o disminuidas de consistencia y frecuentes, casi siempre en número mayor a tres en 24 horas con evolución menor de dos semanas. La EDA está considerada entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, particularmente entre las niñas y niños que viven en medio de pobreza, bajo nivel educativo y saneamiento inadecuado.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

El diligenciamiento de la pregunta 472 requiere de mucho cuidado y atención debido a que se precisa de una recordación de eventos importantes para determinar la presencia de diarrea en el tiempo de referencia: "últimos 14 días", considerando hasta el día anterior de la entrevista.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños menores de 36 meses de edad

EDA:

La variable EDA, se construye a partir de los que respondieron el código 1 (Sí) a la pregunta 472 (En los últimos 14 días, es decir, entre el y el día de ayer, ¿(NOMBRE) ha tenido diarrea?) del Cuestionario Individual, Sección 4B (Inmunización y Salud):

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3). Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000Si:

Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

La deposición frecuente de heces formes (de consistencia sólida), no es diarrea, ni tampoco la deposición de heces de consistencia suelta y "pastosa" por bebés amamantados.

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I_6 = \frac{TN < 36IRA}{TN < 36} * 100$$

Donde:

TN<36E: Total de niñas y niños menores de 36 meses de edad con EDA, en las dos semanas anteriores a la encuesta

TN<36: Total de niñas y niños menores de 36 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD			
NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO
	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
472	En los últimos 14 días, es decir, entre el y el día de ayer, ¿(NOMBRE) ha tenido diarrea? SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 476) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 476) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 476) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P472	H11	REC43

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "EDA". recode

H11 (0,8=0) (2=1) into EDA.val label

eda 0 'no' 1 'si'.

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°09

PORCENTAJE DE NACIDOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años que independientemente de su edad gestacional pesaron menos de 2,500 gramos al momento de su nacimiento.

JUSTIFICACIÓN

El peso al nacer es el primer peso del recién nacido después del parto. En el caso de los nacidos vivos, el bajo peso al nacer se define como el peso que no supera los 2500 gramos (hasta 2499 gramos inclusive). Las niñas y niños con bajo peso al nacer tienen un alto riesgo de mortalidad, morbilidad, crecimiento deficiente, pobre desarrollo cognitivo y psicomotor como resultados inmediatos.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

El porcentaje de niñas y niños no pesados en el momento del parto constituye un impedimento para controlar de forma precisa el bajo peso al nacer en el recién nacido.

PRECISIONES TÉCNICAS

Durante la entrevista se solicita el carné de atención integral de salud del niño(a) inmediatamente después de formular la pregunta 430B (¿Cuánto pesó (NOMBRE)?), del cuestionario individual. Si la entrevistada no tiene el carné, pero recuerda el peso al nacer de su hijo(a), se registra la información. Para el cálculo del indicador ingresan las dos formas. código 1 (Gramos del carné) o código 2 (Gramos según recuerda)

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas, menores de 5 años de edad, con madres de 15 a 49 años de edad.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X / 1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005 / 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I7 = \frac{TN<5BP}{TN<5} \times 100$$

Donde:

TN<5BP: Total de niñas y niños menores de 5 años nacidos con bajo peso al nacer (Peso menor a 2500 gramos)

TN<5: Total de niñas y niños menores de 5 años.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOSPágina web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>**Datos:****REC41, REC0111, REC21, REC91, RECH23.****INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN**

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4A. EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA

	NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
430A	¿Pesaron a (NOMBRE) al momento de nacer?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 430C) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 430C) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 430C) ←
430B	¿Cuánto pesó (NOMBRE)? SOLICITE QUE LE MUESTREN EL CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD Y TRANSCRIBA LA INFORMACIÓN	GRAMOS DEL CARNÉ..... 1 GRAMOS SEGÚN RECUERDA..... 2 NO SABE..... 99998	GRAMOS DEL CARNÉ..... 1 GRAMOS SEGÚN RECUERDA..... 2 NO SABE..... 99998	GRAMOS DEL CARNÉ..... 1 GRAMOS SEGÚN RECUERDA..... 2 NO SABE..... 99998

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P430A, P430B	M19	REC41

SINTAXIS**Programa empleado: SPSS**

* Generando la variable "Bajo peso al nacer".
 recode M19 (low thru 2499=1)(2500 Thru 8000=0) into pesonac.
 val label pesonac 1 'menos de 2,5kg' 0 '>=2,5 kg' .
 exe.

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°10

PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD (Según RM N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses que han recibido las vacunas de acuerdo a su edad, según el Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en la Resolución Ministerial N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP.

JUSTIFICACIÓN

Las vacunas son una manera sencilla de evitar que los niños se contagien de algunas enfermedades que pueden tener, en algunos casos, complicaciones graves (tétanos, poliomielitis, sarampión, etc.). Para lograr una protección suficiente y prolongada es necesario aplicar todas las dosis de vacunas que recomienda el Esquema de vacunación, el mismo que es normado y aprobado por el Ministerio de Salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Los datos de vacunas provienen del registro del Carné de Atención Integral de Salud del Niño/a y de aquella información proporcionada por la madre cuando no dispone del carné al momento de la entrevista. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con respecto a la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso en el registro de las fechas de las vacunas o cuando es un duplicado y no se registran en su totalidad las vacunas. Con respecto a lo que informa la madre, cuando hay problemas de memoria o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños vivos (B5=1) menores de 36 meses de edad, con madres de 15 a 49 años de edad.

Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación, donde se considera el registro de las siguientes dosis:

- 1 dosis de BCG
- 3 dosis de Pentavalente
- 3 dosis de Polio
- 2 dosis de Rotavirus
- 3 dosis de Neumococo
- 2 dosis de SPR
- 1 dosis de refuerzo de DPT
- 1 dosis de refuerzo de Polio

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X / 1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005 / 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I8.1 = \frac{TN<36VC}{TN<36} \times 100$$

Donde:

TN<36VC: Total de niñas y niños menores de 36 meses con vacunas de acuerdo a su edad

TN<36: Total de niñas y niños vivos menores de 36 meses.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, REC95, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

456	ENTREVISTADORA 1 AL FINAL DE LA ENTREVISTA COPIE DEL CARNÉ LAS FECHAS DE VACUNACIÓN PARA CADA VACUNA. 2 ANOTE "44" EN LA COLUMNA "DÍA" SI LA TARJETA MUESTRA QUE SE DIÓ UNA VACUNA, PERO NO SE ANOTÓ LA FECHA.											
ÚLTIMO NACIDO VIVO												
EDAD GESTACIONAL DÍA MES AÑO												
NÚMERO DE ORDEN NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO												
BCG (Recién nacido)	BCG	DÍA	MES	AÑO	ANTIHEPATITIS B HvB (Recién nacido)	HvB 0	DÍA	MES	AÑO			
POLIO	P 1	DÍA	MES	AÑO	P 2	DÍA	MES	AÑO	P 3	DÍA	MES	AÑO
PENTAVALENTE (DPT + HvB + Hib)	Pe 1	DÍA	MES	AÑO	Pe 2	DÍA	MES	AÑO	Pe 3	DÍA	MES	AÑO
DPT	DPT 1	DÍA	MES	AÑO	DPT 2	DÍA	MES	AÑO	DPT 3	DÍA	MES	AÑO
DT					DT 1	DÍA	MES	AÑO	DT 2	DÍA	MES	AÑO
ANTIHEPATITIS B - HvB	HvB 1	DÍA	MES	AÑO	HvB 2	DÍA	MES	AÑO	HvB 3	DÍA	MES	AÑO
ANTIHAEMOPHILUS - Hib	Hib 1	DÍA	MES	AÑO	Hib 2	DÍA	MES	AÑO	Hib 3	DÍA	MES	AÑO
TETRAVALENTE	T	DÍA	MES	AÑO								
HEXAVALENTE	He 1	DÍA	MES	AÑO	He 2	DÍA	MES	AÑO	He 3	DÍA	MES	AÑO
ROTAVIRUS	Rot 1	DÍA	MES	AÑO	Rot 2	DÍA	MES	AÑO				
NEUMOCOCCO	Neu 1	DÍA	MES	AÑO	Neu 2	DÍA	MES	AÑO	Neu 3	DÍA	MES	AÑO

INFLUENZA	Inf 1										
ANTISARAMPIONOSA / SPR	SPR 1										
ANTIAMARÍLLICA / AMA	AMA										
REFUERZOS											
DPT	1ero										
DT	1ero										
POLIO	1ero										

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

452	VERIFIQUE NÚMERO DE ORDEN EN 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN
453	DE 212, ANOTE EL NOMBRE DE 216, SI ESTA VIVO O MUERTO	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)
454	¿Tiene usted el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)? ¿Me permite verlo por favor?	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3
455	¿Tuvo usted alguna vez el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←
457	¿(NOMBRE) recibió vacunas que no están registradas en este carné, incluyendo vacunas recibidas en Campañas de Vacunación y/o de Salud? MARQUE "SI" SÓLO SI LA ENTREVISTADA MENCIONA BCG, POLIO, PENTAVALENTE, DPT, DT, ANTIHEPATITIS, ANTIHAEMOPHILUS, TETRAVALENTE, HEXAVALENTE, ROTAVIRUS, NEUMOCOCCO, INFLUENZA, ANTISARAMPIONOSA, SPR, ANTIAMARÍLLICA, VITAMINA "A".	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←
458	¿Recibió (NOMBRE) alguna vacuna para protegerlo(a) contra las enfermedades, incluyendo las recibidas en días de Campaña de Vacunación y/o de salud ?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←

459	Dígame por favor si (NOMBRE) recibió alguna de las siguientes vacunas: ¿La vacuna BCG contra la tuberculosis, esto es una inyección que se aplica al recién nacido en el hombro y deja una cicatriz?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8
460	¿Recibió (NOMBRE) una vacuna contra la POLIO, esto es, gotas en la boca o inyección en el muslo?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←
460A	¿Cuántas veces recibió la vacuna contra la POLIO?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8
461	¿Recibió (NOMBRE) la vacuna DPT, que es una inyección que se pone en el muslo o el brazo cada vez que le ponen la vacuna contra la polio?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←
461A	¿Cuántas veces?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8
462	¿Recibió (NOMBRE) la vacuna PENTAVALENTE, que es una inyección que se pone en el muslo o el brazo para evitar la DIFTERIA, TOS CONVULSIVA, TÉTANOS, HEPATITIS B y HAEMOPHILUS INFLUENZAE?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←
462A	¿Cuántas veces?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8
463	¿(NOMBRE) recibió una vacuna contra el SARAMPIÓN, PAPERAS Y RUBÉOLA, que es una inyección que se pone en la parte superior del brazo?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P454,P456, P457,P458,P459	H2	REC43
P454, P456, P461	S45D4	REC95
P456, P462	S45PV1	REC95
P456, P462, P462A	S45PV2	REC95
P456, P462, P462A	S45PV3	REC95
P454, P456, P457, P458, P460	H4	REC43
P454, P456, P460, P460A	H6	REC43
P454, P456, P457, P458, P460, P460A	H8	REC43
P456, P460, P460A	S45P4	REC95
P454, P456, P457, P458, P463	H9	REC43
P456, P457	S45SP2	REC95

S45NM1
S45NM2
S45NM3
S45RT1
S45RT2

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```

* BCG.
*-----
  compute bcgok=0.
  recode H2 (1,2,3=1) into bcgok.

*PENTAVALENTE.
*-----
  recode S45PV1 (1,2,3=1) into penta1.
  recode S45PV2 (1,2,3=1) into penta2.
  recode S45PV3 (1,2,3=1) into penta3.

  do if (v007<2019).
  recode S45D4R (1,2,3=1) into refuerzo. /*Considerando refuerzo DPT
  else if (v007>=2019).
  recode S45D4 (1,2,3=1) into refuerzo. /*Considerando refuerzo DPT.
  end if.
  compute pentas = sum(penta1,penta2,penta3,refuerzo) /*Considerando refuerzo DPT .

  /*Considerando refuerzo DPT.
  compute pentaok=0.
  if ( edadm < 3 ) pentaok=1.
  if ( (edadm >=3 and edadm<=4 ) and pentas >=1 ) pentaok=1.
  if ( (edadm >=5 and edadm<=6 ) and pentas >=2 ) pentaok=1.
  if ( (edadm >=7 and edadm<=18) and pentas >=3 ) pentaok=1.
  if ( edadm >18 and pentas >=4 ) pentaok=1.

*POLIO.
*-----
  recode H4 (1,2,3=1) into polio1.
  recode H6 (1,2,3=1) into polio2.
  recode H8 (1,2,3=1) into polio3.
  recode S45P4 (1,2,3=1) into polior. /*Considerando refuerzo Polio.
  compute pols = sum(polio1,polio2,polio3, polior) .

  compute polok=0.
  if ( edadm < 3 ) polok=1.
  if ((edadm>=3 and edadm<=4 ) and pols >=1 ) polok=1.
  if ((edadm>=5 and edadm<=6 ) and pols >=2 ) polok=1.
  if (( edadm >6 and edadm<=18) and pols>=3 ) polok=1.
  if ( edadm >18 and pols>=4 ) polok=1.

```

*SARAMPION.

*-----.

recode H9 (1,2,3=1) into sarampion1.

recode S45SP2 (1,2,3=1) into sarampion2.

compute saramps= sum(sarampion1,sarampion2) .

compute sprok=0.

if (edadm < 13) sprok=1.

if ((edadm>=13 and edadm<=18) and saramps>=1) sprok=1.

if (edadm > 18 and saramps>=2) sprok=1.

*NEUMOCOCO.

*-----.

recode S45NM1 (1,2,3=1) into neum1.

recode S45NM2 (1,2,3=1) into neum2.

recode S45NM3 (1,2,3=1) into neum3.

compute neums = SUM(neum1,neum2,neum3) .

compute nmcok=0.

if edadm < 3 nmcok=1.

if ((edadm>=3 and edadm<=4) and neums>=1) nmcok=1.

if ((edadm>=5 and edadm<=12) and neums>=2) nmcok=1.

if ((edadm>12) and neums>=3) nmcok=1.

*ROTAVIRUS.

*-----.

recode S45RT1 (1,2,3=1) into rotav1.

recode S45RT2 (1,2,3=1) into rotav2.

compute rotavs= SUM(rotav1,rotav2) .

compute rotok=0.

if edadm < 3 rotok=1.

if ((edadm>=3 and edadm<=4) and rotavs>=1) rotok=1.

if ((edadm>4) and rotavs>=2) rotok=1.

* Indicador vacuna de acuerdo a su edad para menores de 36 meses.

*-----.

compute vacc36=0.

if (bcgok=1 & pentaok=1 & polok=1 & sprok=1 & nmcok=1 & rotok=1) vacc36=1.

var lab vacc36 'Menores de 36 meses con vacunas de acuerdo a su edad'.

val lab vacc36 1 'Si' 0 'No'.

end if.

exe.

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°11

PORCENTAJE DE MENORES DE 15 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD (Según RM N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de niñas y niños menores de 15 meses que han recibido las vacunas de acuerdo a su edad, según el Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en la Resolución Ministerial N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP.

JUSTIFICACIÓN

Las vacunas son una manera sencilla de evitar que los niños se contagien de algunas enfermedades que pueden tener, en algunos casos, complicaciones graves (tétanos, poliomielitis, sarampión, etc.). Para lograr una protección suficiente y prolongada es necesario aplicar todas las dosis de vacunas que recomienda el Esquema de vacunación, el mismo que es normado y aprobado por el Ministerio de Salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Los datos de vacunas provienen del registro del Carné de Atención Integral de Salud del Niño/a y de aquella información proporcionada por la madre cuando no dispone del carné al momento de la entrevista. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con respecto a la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso en el registro de las fechas de las vacunas o cuando es un duplicado y no se registran en su totalidad las vacunas. Con respecto a lo que informa la madre, cuando hay problemas de memoria o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños vivos (B5=1) menores de 15 meses de edad, con madres de 15 a 49 años de edad.

Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación, donde se considera el registro de las siguientes dosis:

- 1 dosis de BCG
- 3 dosis de Pentavalente
- 3 dosis de Polio
- 2 dosis de Rotavirus
- 2 dosis de Neumococo
- 1 dosis de SPR

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X / 1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005 /1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I8.2 = \frac{TN<15VC}{TN<15} \times 100$$

Donde:

TN<15VC: Total de niñas y niños menores de 15 meses con vacunas de acuerdo a su edad

TN<15: Total de niñas y niños vivos menores de 15 meses.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, REC95, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

456	ENTREVISTADORA 1 AL FINAL DE LA ENTREVISTA COPIE DEL CARNÉ LAS FECHAS DE VACUNACIÓN PARA CADA VACUNA. 2 ANOTE "44" EN LA COLUMNA "DÍA" SI LA TARJETA MUESTRA QUE SE DIÓ UNA VACUNA, PERO NO SE ANOTÓ LA FECHA.											
ÚLTIMO NACIDO VIVO												
EDAD GESTACIONAL												
DÍA MES AÑO												
NÚMERO DE ORDEN NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO												
DÍA MES AÑO												
BOG (Recién nacido)	BOG	DÍA	MES	AÑO	ANTIHEPATITIS B HvB (Recién nacido)	HvB 0	DÍA	MES	AÑO			
POLIO	P 1				P 2					P 3		
PENTAVALENTE (DPT + HvB + Hib)	Pe 1				Pe 2					Pe 3		
DPT	DPT 1				DPT 2					DPT 3		
DT					DT 1					DT 2		
ANTIHEPATITIS B - HvB	HvB 1				HvB 2					HvB 3		
ANTIHAEMOPHILUS - Hib	Hib 1				Hib 2					Hib 3		
TETRAVALENTE	T											
HEXAVALENTE	He 1				He 2					He 3		
ROTAVIRUS	Rot 1				Rot 2							
NEUMOCOCO	Neu 1				Neu 2					Neu 3		

INFLUENZA	Inf 1									
ANTISARAMPIONOSA / SPR	SPR 1									
ANTIAMARILICA / AMA	AMA									
REFUERZOS										
DPT	1ero									
DT	1ero									
POLIO	1ero									
	2do									

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

452	VERIFIQUE NÚMERO DE ORDEN EN 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN
453	DE 212, ANOTE EL NOMBRE DE 216, SI ESTA VIVO O MUERTO	NOMBRE _____ VIVO MUERTO (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO MUERTO (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO MUERTO (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)
454	¿Tiene usted el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)? ¿Me permite verlo por favor?	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3
455	¿Tuvo usted alguna vez el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←
457	¿(NOMBRE) recibió vacunas que no están registradas en este carné, incluyendo vacunas recibidas en Campañas de Vacunación y/o de Salud? MARQUE "SI" SÓLO SI LA ENTREVISTADA MENCIONA BCG, POLIO, PENTAVALENTE, DPT, DT, ANTITETANUS, TETRAVALENTE, ANTIHAEMOPHILUS, HEXAVALENTE, ROTAVIRUS, NEUMOCOCO, INFLUENZA, ANTISARAMPIONOSA, SPR, ANTIAMARILICA, VITAMINA "A".	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←
458	¿Recibió (NOMBRE) alguna vacuna para protegerlo(a) contra las enfermedades, incluyendo las recibidas en días de Campaña de Vacunación y/o de salud?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←

459	Dígame por favor si (NOMBRE) recibió alguna de las siguientes vacunas: ¿La vacuna BCG contra la tuberculosis, esto es una inyección que se aplica al recién nacido en el hombro y deja una cicatriz?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8
460	¿Recibió (NOMBRE) una vacuna contra la POLIO, esto es, gotas en la boca o inyección en el muslo?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←
460A	¿Cuántas veces recibió la vacuna contra la POLIO?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8
461	¿Recibió (NOMBRE) la vacuna DPT, que es una inyección que se pone en el muslo o el brazo cada vez que le ponen la vacuna contra la polio?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←
461A	¿Cuántas veces?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8
462	¿Recibió (NOMBRE) la vacuna PENTAVALENTE, que es una inyección que se pone en el muslo o el brazo para evitar la DIFTERIA, TOS CONVULSIVA, TÉTANOS, HEPATITIS B y HAEMOPHILUS INFLUENZAE?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←
462A	¿Cuántas veces?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8
463	¿(NOMBRE) recibió una vacuna contra el SARAMPIÓN, PAPERAS Y RUBÉOLA, que es una inyección que se pone en la parte superior del brazo?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P454,P456, P457,P458,P459	H2	REC43
P454, P456, P461	S45D4	REC95
P456, P462	S45PV1	REC95
P456, P462, P462A	S45PV2	REC95
P456, P462, P462A	S45PV3	REC95
P454, P456, P457, P458, P460	H4	REC43
P454, P456, P460, P460A	H6	REC43
P454, P456, P457, P458, P460, P460A	H8	REC43
P456, P460, P460A	S45P4	REC95
P454, P456, P457, P458, P463	H9	REC43

P456, P457	S45SP2 S45NM1 S45NM2 S45NM3 S45RT1 S45RT2	REC95
------------	--	-------

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* BCG.

```
*-----
compute bcgok=0.
recode H2 (1,2,3=1) into bcgok.
```

*PENTAVALENTE.

```
*-----
recode S45PV1 (1,2,3=1) into penta1.
recode S45PV2 (1,2,3=1) into penta2.
recode S45PV3 (1,2,3=1) into penta3.

do if (v007<2019).
recode S45D4R (1,2,3=1) into refuerzo. /*Considerando refuerzo DPT
else if (v007>=2019).
recode S45D4 (1,2,3=1) into refuerzo. /*Considerando refuerzo DPT.
end if.
compute pentas = sum(penta1,penta2,penta3,refuerzo) /*Considerando refuerzo DPT .
```

/*Considerando refuerzo DPT.

```
compute pentaok=0.
if ( edadm < 3 ) pentaok=1.
if ( (edadm >=3 and edadm<=4 ) and pentas >=1 ) pentaok=1.
if ( (edadm >=5 and edadm<=6 ) and pentas >=2 ) pentaok=1.
if ( (edadm >=7 and edadm<=18) and pentas >=3 ) pentaok=1.
if ( edadm >18 and pentas >=4 ) pentaok=1.
```

*POLIO.

```
*-----
recode H4 (1,2,3=1) into polio1.
recode H6 (1,2,3=1) into polio2.
recode H8 (1,2,3=1) into polio3.
recode S45P4 (1,2,3=1) into polior. /*Considerando refuerzo Polio.
compute pols = sum(polio1,polio2,polio3, polior) .

compute polok=0.
if ( edadm < 3 ) polok=1.
if ((edadm>=3 and edadm<=4 ) and pols >=1 ) polok=1.
if ((edadm>=5 and edadm<=6 ) and pols >=2 ) polok=1.
if (( edadm >6 and edadm<=18) and pols>=3 ) polok=1.
if ( edadm >18 and pols>=4 ) polok=1.
```

*SARAMPION.

*-----.

```
recode H9 (1,2,3=1) into sarampion1.
recode S45SP2 (1,2,3=1) into sarampion2.
compute saramps= sum(sarampion1,sarampion2) .
```

```
compute sprok=0.
if ( edadm < 13 ) sprok=1.
if (( edadm>=13 and edadm<=18 ) and saramps>=1) sprok=1.
if ( edadm > 18 and saramps>=2 ) sprok=1.
```

*NEUMOCOCO.

*-----.

```
recode S45NM1 (1,2,3=1) into neum1.
recode S45NM2 (1,2,3=1) into neum2.
recode S45NM3 (1,2,3=1) into neum3.
compute neums = SUM(neum1,neum2,neum3) .
```

```
compute nmcok=0.
if edadm < 3 nmcok=1.
if ((edadm>=3 and edadm<=4) and neums>=1) nmcok=1.
if ((edadm>=5 and edadm<=12) and neums>=2) nmcok=1.
if ((edadm>12 ) and neums>=3) nmcok=1.
```

*ROTAVIRUS.

*-----.

```
recode S45RT1 (1,2,3=1) into rotav1.
recode S45RT2 (1,2,3=1) into rotav2.
compute rotavs= SUM(rotav1,rotav2) .
```

```
compute rotok=0.
if edadm < 3 rotok=1.
if ((edadm>=3 and edadm<=4) and rotavs>=1) rotok=1.
if ((edadm>4 ) and rotavs>=2) rotok=1.
```

* Indicador vacuna de acuerdo a su edad para menores de 15 meses.

*-----.

```
compute vacc15=0.
if (bcgok=1 & pentaok=1 & polok=1 & sprok=1 & nmcok=1 & rotok=1) vacc15=1.
var lab vacc15 'Menores de 15 meses con vacunas de acuerdo a su edad'.
val lab vacc15 1 'Si' 0 'No'.
```

```
end if.
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°12

PORCENTAJE DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD (Según RM N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses que han recibido las vacunas de acuerdo a su edad, según el Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en la Resolución Ministerial N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP.

JUSTIFICACIÓN

Las vacunas son una manera sencilla de evitar que los niños se contagien de algunas enfermedades que pueden tener, en algunos casos, complicaciones graves (tétanos, poliomielitis, etc.). Para lograr una protección suficiente y prolongada es necesario aplicar todas las dosis de vacunas que recomienda el Esquema de vacunación, el mismo que es normado y aprobado por el Ministerio de Salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Los datos de vacunas provienen del registro del Carné de Atención Integral de Salud del Niño/a y de aquella información proporcionada por la madre cuando no dispone del carné al momento de la entrevista. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con respecto a la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso en el registro de las fechas de las vacunas o cuando es un duplicado y no se registran en su totalidad las vacunas. Con respecto a lo que informa la madre, cuando hay problemas de memoria o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños vivos (B5=1) menores de 12 meses de edad, con madres de 15 a 49 años de edad.

Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación, donde se considera el registro de las siguientes dosis:

- 1 dosis de BCG
- 3 dosis de Pentavalente
- 3 dosis de Polio
- 2 dosis de Rotavirus
- 2 dosis de Neumococo

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I9.1 = \frac{TN<12VC}{TN<12} \times 100$$

Donde:

TN<12VC: Total de niñas y niños menores de 12 meses con vacunas de acuerdo a su edad

TN<12: Total de niñas y niños vivos menores de 12 meses.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, REC95, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

456	ENTREVISTADORA 1 AL FINAL DE LA ENTREVISTA COPIE DEL CARNÉ LAS FECHAS DE VACUNACIÓN PARA CADA VACUNA. 2 ANOTE "44" EN LA COLUMNA "DÍA" SI LA TARJETA MUESTRA QUE SE DIÓ UNA VACUNA, PERO NO SE ANOTÓ LA FECHA.																								
ÚLTIMO NACIDO VIVO										EDAD GESTACIONAL															
										DÍA MES AÑO															
		NÚMERO DE ORDEN		NOMBRE				FECHA DE NACIMIENTO																	
BCG (Recién nacido)		BCG		DÍA		MES		AÑO		ANTIHEPATITIS B HvB (Recién nacido)		HvB 0		DÍA		MES		AÑO							
POLIO		P 1		DÍA		MES		AÑO		P 2		DÍA		MES		AÑO		P 3		DÍA		MES		AÑO	
PENTAVALENTE (DPT + HvB + Hib)		Pe 1		DÍA		MES		AÑO		Pe 2		DÍA		MES		AÑO		Pe 3		DÍA		MES		AÑO	
DPT		DPT 1		DÍA		MES		AÑO		DPT 2		DÍA		MES		AÑO		DPT 3		DÍA		MES		AÑO	
DT										DT 1		DÍA		MES		AÑO		DT 2		DÍA		MES		AÑO	
ANTIHEPATITIS B - HvB		HvB 1		DÍA		MES		AÑO		HvB 2		DÍA		MES		AÑO		HvB 3		DÍA		MES		AÑO	
ANTIHAEMOPHILUS - Hib		Hib 1		DÍA		MES		AÑO		Hib 2		DÍA		MES		AÑO		Hib 3		DÍA		MES		AÑO	
TETRAVALENTE		T		DÍA		MES		AÑO																	
HEXAVALENTE		He 1		DÍA		MES		AÑO		He 2		DÍA		MES		AÑO		He 3		DÍA		MES		AÑO	
ROTAVIRUS		Rot 1		DÍA		MES		AÑO		Rot 2		DÍA		MES		AÑO									
NEUMOCOCO		Neu 1		DÍA		MES		AÑO		Neu 2		DÍA		MES		AÑO		Neu 3		DÍA		MES		AÑO	

INFLUENZA	Inf 1									
ANTISARAMPIONOSA / SPR	SPR 1									
ANTIAMARÍLICA / AMA	AMA									
REFUERZOS										
DPT	1ero									
DT	1ero									
POLIO	1ero									
	2do									

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

452	VERIFIQUE NÚMERO DE ORDEN EN 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN
453	DE 212, ANOTE EL NOMBRE DE 216, SI ESTA VIVO O MUERTO	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)
454	¿Tiene usted el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)? ¿Me permite verlo por favor?	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3
455	¿Tuvo usted alguna vez el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←
457	¿(NOMBRE) recibió vacunas que no están registradas en este carné, incluyendo vacunas recibidas en Campañas de Vacunación y/o de Salud? MARQUE "SI" SÓLO SI LA ENTREVISTADA MENCIONA BCG, POLIO, PENTAVALENTE, DPT, DT, ANTIHEPATITIS, ANTIHAEMOPHILUS, TETRAVALENTE, HEXAVALENTE, ROTAVIRUS, NEUMOCOCCO, INFLUENZA, ANTISARAMPIONOSA, SPR, ANTIAMARÍLICA, VITAMINA "A".	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←
458	¿Recibió (NOMBRE) alguna vacuna para protegerlo(a) contra las enfermedades, incluyendo las recibidas en días de Campaña de Vacunación y/o de salud ?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465B) ←

459	Dígame por favor si (NOMBRE) recibió alguna de las siguientes vacunas: ¿La vacuna BCG contra la tuberculosis, esto es una inyección que se aplica al recién nacido en el hombro y deja una cicatriz?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8
460	¿Recibió (NOMBRE) una vacuna contra la POLIO, esto es, gotas en la boca o inyección en el muslo?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461) ←
460A	¿Cuántas veces recibió la vacuna contra la POLIO?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8
461	¿Recibió (NOMBRE) la vacuna DPT, que es una inyección que se pone en el muslo o el brazo cada vez que le ponen la vacuna contra la polio?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 461B) ←
461A	¿Cuántas veces?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8
462	¿Recibió (NOMBRE) la vacuna PENTAVALENTE, que es una inyección que se pone en el muslo o el brazo para evitar la DIFTERIA, TOS CONVULSIVA, TÉTANOS, HEPATITIS B y HAEMOPHILUS INFLUENZAE?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 462B) ←
462A	¿Cuántas veces?	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8	No. DE VECES..... NO SABE..... 8

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P454, P456, P457, P458, P459	H2	REC43
P454, P456, P461	S45D4	REC95
P456, P462	S45PV1	REC95
P456, P462, P462A	S45PV2	REC95
P456, P462, P462A	S45PV3	REC95
P454, P456, P457, P458, P460	H4	REC43
P454, P456, P460, P460A	H6	REC43
P454, P456, P457, P458, P460, P460A	H8	REC43
P456, P460, P460A	S45P4	REC95
P456, P457	S45NM1 S45NM2 S45NM3 S45RT1 S45RT2	REC95

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* BCG.
*-----
  compute bcgok=0.
  recode H2 (1,2,3=1) into bcgok.

*PENTAVALENTE.
*-----
  recode S45PV1 (1,2,3=1) into penta1.
  recode S45PV2 (1,2,3=1) into penta2.
  recode S45PV3 (1,2,3=1) into penta3.

  do if (v007<2019).
  recode S45D4R (1,2,3=1) into refuerzo. /*Considerando refuerzo DPT
  else if (v007>=2019).
  recode S45D4 (1,2,3=1) into refuerzo. /*Considerando refuerzo DPT.
  end if.
  compute pentas = sum(penta1,penta2,penta3,refuerzo) /*Considerando refuerzo DPT .

  /*Considerando refuerzo DPT.
  compute pentaok=0.
  if ( edadm < 3 ) pentaok=1.
  if ( (edadm >=3 and edadm<=4 ) and pentas >=1 ) pentaok=1.
  if ( (edadm >=5 and edadm<=6 ) and pentas >=2 ) pentaok=1.
  if ( (edadm >=7 and edadm<=18) and pentas >=3 ) pentaok=1.
  if ( edadm >18 and pentas >=4 ) pentaok=1.

*POLIO.
*-----
  recode H4 (1,2,3=1) into polio1.
  recode H6 (1,2,3=1) into polio2.
  recode H8 (1,2,3=1) into polio3.
  recode S45P4 (1,2,3=1) into polior. /*Considerando refuerzo Polio.
  compute pols = sum(polio1,polio2,polio3, polior) .

  compute polok=0.
  if ( edadm < 3 ) polok=1.
  if ((edadm>=3 and edadm<=4 ) and pols >=1 ) polok=1.
  if ((edadm>=5 and edadm<=6 ) and pols >=2 ) polok=1.
  if (( edadm >6 and edadm<=18) and pols>=3 ) polok=1.
  if ( edadm >18 and pols>=4 ) polok=1.

*NEUMOCOCO.
*-----
  recode S45NM1 (1,2,3=1) into neum1.
  recode S45NM2 (1,2,3=1) into neum2.
  recode S45NM3 (1,2,3=1) into neum3.
  compute neums = SUM(neum1,neum2,neum3) .
```

```

compute nmcok=0.
if edadm < 3 nmcok=1.
if ((edadm>=3 and edadm<=4) and neuums>=1) nmcok=1.
if ((edadm>=5 and edadm<=12) and neuums>=2) nmcok=1.
if ((edadm>12 ) and neuums>=3) nmcok=1.

*ROTAVIRUS.
*-----,
recode S45RT1 (1,2,3=1) into rotav1.
recode S45RT2 (1,2,3=1) into rotav2.
compute rotavs= SUM(rotav1,rotav2) .

compute rotok=0.
if edadm < 3 rotok=1.
if ((edadm>=3 and edadm<=4) and rotavs>=1) rotok=1.
if ((edadm>4 ) and rotavs>=2) rotok=1.

* Indicador vacuna de acuerdo a su edad para menores de 12 meses.
*-----,
compute vacc12=0.
if (bcgok=1 & pentaok=1 & polok=1 & nmcok=1 & rotok=1) vacc12=1.
var lab vacc12 'Menores de 12 meses con vacunas de acuerdo a su edad'.
val lab vacc12 1 'Si' 0 'No'.

end if.
exe.

```

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°13

PORCENTAJE DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS Y NEUMOCOCO

(Según RM N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de menores de 24 meses que han recibido las vacunas contra el rotavirus y neumococo, según el Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en la Resolución Ministerial N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP.

JUSTIFICACIÓN

Las vacunas son una manera sencilla de evitar que los niños se contagien de algunas enfermedades que pueden tener, en algunos casos, complicaciones graves. Para lograr una protección suficiente y prolongada es necesario aplicar todas las dosis de vacunas que recomienda el Esquema de vacunación, el mismo que es normado y aprobado por el Ministerio de Salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Los datos de vacunas provienen del registro de la tarjeta de vacunación. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso o cuando es un duplicado. En caso la madre no tenga o no muestre la tarjeta de control no se diligencia la pregunta 456 del cuestionario individual.

PRECISIONES TÉCNICAS

Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación de los menores de 24 meses. Para el cálculo del indicador se consideran las siguientes vacunas:

2 dosis de Rotavirus: 1era dosis a los 2 meses y la 2da dosis a los 4 meses

3 dosis de Neumococo: 1era dosis a los 2 meses, 2da dosis a los 4 meses y 3era dosis a los 12 meses

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DEL CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I10.1 = \frac{TN<24VRNa}{TN<24} \times 100$$

Donde:

TN<24VRNa: Total de niñas y niños menores de 24 meses de edad con vacunas contra el rotavirus y neumococo.

TN<24: Total de niñas y niños vivos menores de 24 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, REC95, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

456	ENTREVISTADORA 1 AL FINAL DE LA ENTREVISTA COPIE DEL CARNÉ LAS FECHAS DE VACUNACIÓN PARA CADA VACUNA. 2 ANOTE "44" EN LA COLUMNA "DÍA" SI LA TARJETA MUESTRA QUE SE DIÓ UNA VACUNA, PERO NO SE ANOTÓ LA FECHA.											
ÚLTIMO NACIDO VIVO										EDAD GESTACIONAL		
										DÍA	MES	AÑO
 NÚMERO DE ORDEN		NOMBRE				FECHA DE NACIMIENTO						
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		
BOG (Recién nacido)		BOG			ANTIHEPATITIS B HvB (Recién nacido)				HvB 0			
POLIO		P 1			P 2				P 3			
PENTAVALENTE (DPT + HvB + Hib)		Pe 1			Pe 2				Pe 3			
DPT		DPT 1			DPT 2				DPT 3			
DT					DT 1				DT 2			
ANTIHEPATITIS B - HvB		HvB 1			HvB 2				HvB 3			
ANTIHAEMOPHILUS - Hib		Hib 1			Hib 2				Hib 3			
TETRAVALENTE		T										
HEXAVALENTE		He 1			He 2				He 3			
ROTAVIRUS		Rot 1			Rot 2							
NEUMOCOCCO		Neu 1			Neu 2				Neu 3			

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

452	VERIFIQUE NÚMERO DE ORDEN EN 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN
453	DE 212, ANOTE EL NOMBRE DE 216, SI ESTA VIVO O MUERTO	NOMBRE VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)
454	¿Tiene usted el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)? ¿Me permite verlo por favor?	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3
455	¿Tuvo usted alguna vez el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←
457	¿(NOMBRE) recibió vacunas que no están registradas en este carné, incluyendo vacunas recibidas en Campañas de Vacunación y/o de Salud? MARQUE "SI" SÓLO SI LA ENTREVISTADA MENCIONA BCG, POLIO, PENTAVALENTE, DPT, DT, ANTIHEPATITIS, ANTIHAEMOPHILUS, TETRAVALENTE, HEXAVALENTE, ROTAVIRUS, NEUMOCOCCO, INFLUENZA, ANTISARAMPIONOSA, SPR, ANTIAMARILICA, VITAMINA "A".	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P456, P457	S45NM1 S45NM2 S45NM3 S45RT1 S45RT2	REC95

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

Do if (b5=1 & edadm<60).

*ROTAVIRUS.

*-----.

```
compute rotav=0.  
recode S45RT1 (1,2,3=1) into rotav1.  
recode S45RT2 (1,2,3=1) into rotav2.  
compute rotavs= SUM(rotav1,rotav2) .
```

```
compute rotok=0.  
if edadm <3 rotok=1.  
if ((edadm>=3 & edadm<=4)& rotavs>=1) rotok=1.  
if ((edadm>4 )& rotavs>=2) rotok=1.
```

*NEUMOCOCO.

*-----.

```
compute neum=0  
recode S45NM1 (1,2,3=1) into neum1.  
recode S45NM2 (1,2,3=1) into neum2.  
recode S45NM3 (1,2,3=1) into neum3.  
compute neums = SUM(neum1,neum2,neum3) .
```

```
compute nmcok=0.  
if edadm <3 nmcok=1.  
if ((edadm>=3 & edadm<=4)& neums>=1) nmcok=1.  
if ((edadm>=5 & edadm<=12)& neums>=2) nmcok=1.  
if ((edadm>12 )& neums>=3) nmcok=1.
```

* Indicador de Rotavirus y Neumococo para menores de 24 meses.

*-----.

```
if (rotok=1 & nmcok=1) rotayneumo24=1.  
if (rotok=0 & nmcok=0) rotayneumo24=0.  
if (rotok=1 & nmcok=0) rotayneumo24=0.  
if (rotok=0 & nmcok=1) rotayneumo24=0.
```

end if.

exe.

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°14

PORCENTAJE DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS Y NEUMOCOCO

(Según RM N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de menores de 12 meses que han recibido las vacunas contra el rotavirus y neumococo, según el Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en la Resolución Ministerial N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP.

JUSTIFICACIÓN

Las vacunas son una manera sencilla de evitar que los niños se contagien de algunas enfermedades que pueden tener, en algunos casos, complicaciones graves. Para lograr una protección suficiente y prolongada es necesario aplicar todas las dosis de vacunas que recomienda el Esquema de vacunación, el mismo que es normado y aprobado por el Ministerio de Salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Los datos de vacunas provienen del registro de la tarjeta de vacunación. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso o cuando es un duplicado. En caso la madre no tenga o no muestre la tarjeta de control no se diligencia la pregunta 456 del cuestionario individual.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños vivos (B5=1) menores de 12 meses de edad, con madres de 15 a 49 años de edad.

Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación, donde se considera el registro de las siguientes 2 dosis:

1era dosis a los 2 meses y la 2da dosis a los 4 meses

3 dosis de Neumococo: 1era dosis a los 2 meses, 2da dosis a los 4 meses y 3era dosis a los 12 meses (Para obtener este indicador se consideran las dos primeras dosis)

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X / 1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005 / 1 000 000

MÉTODO DEL CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I13 = \frac{TN<12VRN}{TN<12} \times 100$$

Donde:

TN<12VRN: Total de niñas y niños menores de 12 meses de edad con vacunas contra el rotavirus y neumococo.

TN<12: Total de niñas y niños vivos menores de 12 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, REC95, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

456	ENTREVISTADORA 1 AL FINAL DE LA ENTREVISTA COPIE DEL CARNÉ LAS FECHAS DE VACUNACIÓN PARA CADA VACUNA. 2 ANOTE "44" EN LA COLUMNA "DÍA" SI LA TARJETA MUESTRA QUE SE DIÓ UNA VACUNA, PERO NO SE ANOTÓ LA FECHA.												
ÚLTIMO NACIDO VIVO										EDAD GESTACIONAL			
										DÍA MES AÑO			
NÚMERO DE ORDEN		NOMBRE				FECHA DE NACIMIENTO				DÍA MES AÑO			
BOG (Recién nacido)	BOG	DÍA	MES	AÑO	ANTIHEPATITIS B HVB (Recién nacido)	HVB 1	DÍA	MES	AÑO	HVB 2	DÍA	MES	AÑO
POLIO	P 1				P 2					P 3			
PENTAVALENTE (DPT + HVB + Hib)	Pe 1				Pe 2					Pe 3			
DPT	DPT 1				DPT 2					DPT 3			
DT					DT 1					DT 2			
ANTIHEPATITIS B - HVB	HvB 1				HvB 2					HvB 3			
ANTIHAEMOPHILUS - Hib	Hib 1				Hib 2					Hib 3			
TETRAVALENTE	T												
HEXAVALENTE	He 1				He 2					He 3			
ROTAVIRUS	Rot 1				Rot 2								
NEUMOCOCO	Neu 1				Neu 2					Neu 3			

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

452	VERIFIQUE NÚMERO DE ORDEN EN 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN
453	DE 212, ANOTE EL NOMBRE DE 216, SI ESTA VIVO O MUERTO	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)
454	¿Tiene usted el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)? ¿Me permite verlo por favor?	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3
455	¿Tuvo usted alguna vez el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←
457	¿(NOMBRE) recibió vacunas que no están registradas en este carné, incluyendo vacunas recibidas en Campañas de Vacunación y/o de Salud? MARQUE "SI" SÓLO SI LA ENTREVISTADA MENCIONA BCG, POLIO, PENTAVALENTE, DPT, DT, ANTIHEPATITIS, ANTIHAEMOPHILUS, TETRAVALENTE, HEXAVALENTE, ROTAVIRUS, NEUMOCOCCO, INFLUENZA, ANTISARAMPIONOSA, SPR, ANTIAMARÍLICA, VITAMINA "A".	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P456, P457	S45NM1 S45NM2 S45NM3 S45RT1 S45RT2	REC95

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

*ROTAVIRUS.

*-----.

```
compute rotav=0.
recode S45RT1 (1,2,3=1) into rotav1.
recode S45RT2 (1,2,3=1) into rotav2.
compute rotavs= SUM(rotav1,rotav2) .

compute rotok=0.
if edadm <3 rotok=1.
if ((edadm>=3 & edadm<=4)& rotavs>=1) rotok=1.
if ((edadm>4 )& rotavs>=2) rotok=1.
```

*NEUMOCOCO.

*-----.

```
compute neum=0
recode S45NM1 (1,2,3=1) into neum1.
recode S45NM2 (1,2,3=1) into neum2.
recode S45NM3 (1,2,3=1) into neum3.
compute neums = SUM(neum1,neum2,neum3) .

compute nmcok=0.
if edadm <3 nmcok=1.
if ((edadm>=3 & edadm<=4)& neums>=1) nmcok=1.
if ((edadm>=5 & edadm<=12)& neums>=2) nmcok=1.
```

* Indicador de Rotavirus y Neumococo para menores de 12 meses.

*-----.

```
if (rotok=1 & nmcok=1) rotayneumo12=1.
if (rotok=0 & nmcok=0) rotayneumo12=0.
if (rotok=1 & nmcok=0) rotayneumo12=0.
if (rotok=0 & nmcok=1) rotayneumo12=0.
```

end if.

exe.

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°15

PORCENTAJE DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL NEUMOCOCO (Según RM N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de menores de 24 meses que han recibido las vacunas contra el neumococo, según el Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en la Resolución Ministerial N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP.

JUSTIFICACIÓN

El neumococo es una bacteria que provoca enfermedades graves como la otitis media o la neumonía. También puede pasar a la circulación sanguínea causando meningitis e infecciones en la sangre que ponen en peligro la vida del menor. Las vacunas son una manera sencilla de evitar que los niños se contagien de algunas enfermedades que pueden tener, en algunos casos, complicaciones graves. Para lograr una protección suficiente y prolongada es necesario aplicar todas las dosis de vacunas que recomienda el Esquema de vacunación, el mismo que es normado y aprobado por el Ministerio de Salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Los datos de vacunas provienen del registro de la tarjeta de vacunación. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso o cuando es un duplicado. En caso la madre no tenga o no muestre la tarjeta de control no se diligencia la pregunta 456 del cuestionario individual.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños vivos (B5=1) menores de 24 meses de edad, con madres de 15 a 49 años de edad.

Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación, donde se considera el registro de las siguientes dosis contra el Neumococo:

- 1era dosis: 2 meses de edad
- 2da dosis: 4 meses de edad
- 3era dosis: 12 meses de edad

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DEL CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I11.1 = \frac{TN < 24 VNa}{TN < 24} \times 100$$

Donde:

TN < 24 VNa: Total de niñas y niños menores de 24 meses de edad con vacunas contra el neumococo.

TN < 24: Total de niñas y niños vivos menores de 24 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, REC95, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

456	ENTREVISTADORA 1 AL FINAL DE LA ENTREVISTA COPIE DEL CARNÉ LAS FECHAS DE VACUNACIÓN PARA CADA VACUNA. 2 ANOTE "44" EN LA COLUMNA "DÍA" SI LA TARJETA MUESTRA QUE SE DIÓ UNA VACUNA, PERO NO SE ANOTÓ LA FECHA.										
ÚLTIMO NACIDO VIVO										EDAD GESTACIONAL	
										DÍA MES AÑO	
NÚMERO DE ORDEN		NOMBRE				FECHA DE NACIMIENTO				DÍA MES AÑO	
BOG (Recién nacido)	BOG	DÍA	MES	AÑO	ANTIHEPATITIS B HVB (Recién nacido)	HVB 0	DÍA	MES	AÑO		
POLIO	P 1				P 2		P 3				
PENTAVALENTE (DPT + HVB + Hib)	Pe 1				Pe 2		Pe 3				
DPT	DPT 1				DPT 2		DPT 3				
DT					DT 1		DT 2				
ANTIHEPATITIS B - HVB	HvB 1				HvB 2		HvB 3				
ANTIHAEMOPHILUS - Hib	Hib 1				Hib 2		Hib 3				
TETRAVALENTE	T										
HEXAVALENTE	He 1				He 2		He 3				
ROTAVIRUS	Rot 1				Rot 2						
NEUMOCOCO	Neu 1				Neu 2		Neu 3				

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

452	VERIFIQUE NÚMERO DE ORDEN EN 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN
453	DE 212, ANOTE EL NOMBRE DE 216, SI ESTA VIVO O MUERTO	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE _____ VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)
454	¿Tiene usted el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)? ¿Me permite verlo por favor?	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3
455	¿Tuvo usted alguna vez el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←
457	¿(NOMBRE) recibió vacunas que no están registradas en este carné, incluyendo vacunas recibidas en Campañas de Vacunación y/o de Salud? MARQUE "SI" SÓLO SI LA ENTREVISTADA MENCIONA BCG, POLIO, PENTAVALENTE, DPT, DT, ANTIHEPATITIS, ANTIHAEMOPHILUS, TETRAVALENTE, HEXAVALENTE, ROTAVIRUS, NEUMOCOCCO, INFLUENZA, ANTISARAMPIONOSA, SPR, ANTIAMARILICA, VITAMINA "A".	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P456, P457	S45NM1 S45NM2 S45NM3	REC95

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

*NEUMOCOCO.

*-----.

```
compute neum=0  
recode S45NM1 (1,2,3=1) into neum1.  
recode S45NM2 (1,2,3=1) into neum2.  
recode S45NM3 (1,2,3=1) into neum3.  
compute neums = SUM(neum1,neum2,neum3) .
```

```
compute nmcok=0.  
if edadm <3 nmcok=1.  
if ((edadm>=3 & edadm<=4)& neums>=1) nmcok=1.  
if ((edadm>=5 & edadm<=12)& neums>=2) nmcok=1.  
if ((edadm>12 )& neums>=3) nmcok=1.
```

end if.

exe.

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°16

PORCENTAJE DE MENORES DE 24 MESES CON VACUNAS CONTRA EL ROTAVIRUS (Según RM N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de menores de 24 meses que han recibido las vacunas contra el rotavirus, según el Esquema Nacional de Vacunación vigente establecido en la Resolución Ministerial N° 719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP.

JUSTIFICACIÓN

El rotavirus es un virus que causa diarrea (a veces severa) mayormente en bebés y niños pequeños. Suele estar acompañada de vómitos y fiebre y puede traducirse en deshidratación. La vacuna contra el rotavirus es una vacuna oral; no se inyecta. Para lograr una protección suficiente y prolongada es necesario aplicar todas las dosis de vacunas que recomienda el Esquema de vacunación, el mismo que es normado y aprobado por el Ministerio de Salud.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Los datos de vacunas provienen del registro de la tarjeta de vacunación. Como se sabe, cada fuente de recolección tiene problemas de exactitud: con la tarjeta, cuando el personal de salud no es cuidadoso o cuando es un duplicado. En caso la madre no tenga o no muestre la tarjeta de control no se diligencia la pregunta 456 del cuestionario individual.

PRECISIONES TÉCNICAS

Este indicador se obtiene de la Historia de Vacunación de los menores de 24 meses. Para el cálculo del indicador se considera el registro de las dosis de la vacuna contra el Rotavirus:

- 1era dosis: 2 meses de edad
- 2da dosis: 4 meses de edad

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DEL CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I_{12} = \frac{TN<24VR}{TN<24} \times 100$$

Donde:

TN<24VR: Total de niñas y niños menores de 24 meses de edad con vacunas contra el rotavirus.

TN<24: Total de niñas y niños vivos menores de 24 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC43, REC0111, REC21, REC91, REC95, RECH23.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

456	ENTREVISTADORA 1 AL FINAL DE LA ENTREVISTA COPIE DEL CARNÉ LAS FECHAS DE VACUNACIÓN PARA CADA VACUNA. 2 ANOTE "44" EN LA COLUMNA "DÍA" SI LA TARJETA MUESTRA QUE SE DIÓ UNA VACUNA, PERO NO SE ANOTÓ LA FECHA.									
			ÚLTIMO NACIDO VIVO						EDAD GESTACIONAL	
									DÍA MES AÑO	
			NÚMERO DE ORDEN		NOMBRE				FECHA DE NACIMIENTO	
BOG (Recién nacido)			BOG		DÍA MES AÑO		ANTIHEPATITIS B HvB (Recién nacido)		HvB 0	
POLIO			P 1		DÍA MES AÑO		P 2		DÍA MES AÑO	
PENTAVALENTE (DPT + HvB + Hib)			Pe 1		DÍA MES AÑO		Pe 2		DÍA MES AÑO	
DPT			DPT 1		DÍA MES AÑO		DPT 2		DÍA MES AÑO	
DT							DT 1		DÍA MES AÑO	
ANTIHEPATITIS B - HvB			HvB 1		DÍA MES AÑO		HvB 2		DÍA MES AÑO	
ANTIHAEMOPHILUS - Hib			Hib 1		DÍA MES AÑO		Hib 2		DÍA MES AÑO	
TETRAVALENTE			T		DÍA MES AÑO					
HEXAVALENTE			He 1		DÍA MES AÑO		He 2		DÍA MES AÑO	
ROTA VIRUS			Rot 1		DÍA MES AÑO		Rot 2		DÍA MES AÑO	
NEUMOCOCCO			Neu 1		DÍA MES AÑO		Neu 2		DÍA MES AÑO	

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

452	VERIFIQUE NÚMERO DE ORDEN EN 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN
453	DE 212, ANOTE EL NOMBRE DE 216, SI ESTA VIVO O MUERTO	NOMBRE VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)	NOMBRE VIVO ☐ MUERTO ☐ (PASE A 453 EN PRÓXIMA COLUMNA; O, SI NO HAY MÁS NACIMIENTOS PASE A 480)
454	¿Tiene usted el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)? ¿Me permite verlo por favor?	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3	SÍ, VISTA..... 1 (PASE A 456X) ← SÍ, NO VISTA..... 2 (PASE A 458) ← SIN TARJETA..... 3
455	¿Tuvo usted alguna vez el carné de atención integral de salud de (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 458) ←
457	¿(NOMBRE) recibió vacunas que no están registradas en este carné, incluyendo vacunas recibidas en Campañas de Vacunación y/o de Salud? MARQUE "SI" SÓLO SI LA ENTREVISTADA MENCIONA BCG, POLIO, PENTAVALENTE, DPT, DT, ANTIHEPATITIS, ANTIHAEMOPHILUS, TETRAVALENTE, HEXAVALENTE, ROTAVIRUS, NEUMOCOCCO, INFLUENZA, ANTISARAMPIONOSA, SPR, ANTIAMARÍLICA, VITAMINA "A".	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←	SI..... 1 (INDAGUE POR VACUNAS Y ANOTE "66" EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A DÍA EN PGTA. 456 Y/O PGTA. 456X) (PASE A 465) ← NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 465) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P456, P457	S45RT1 S45RT2	REC95

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

Do if (b5=1 & edadm<60).

*ROTAVIRUS.

*-----.

compute rotav=0.

recode S45RT1 (1,2,3=1) into rotav1.

recode S45RT2 (1,2,3=1) into rotav2.

compute rotavs= SUM(rotav1,rotav2) .

compute rotok=0.

if edadm <3 rotok=1.

if ((edadm>=3 & edadm<=4)& rotavs>=1) rotok=1.

if ((edadm>4)& rotavs>=2) rotok=1.

end if.

exe.

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°17

PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD (Según NST N°137-MINSA/2017/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completos de acuerdo a su edad, según Norma Técnica de Salud N° 137-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de cinco años, aprobado con Resolución Ministerial N° 537-2017/MINSA.

JUSTIFICACIÓN

El control de crecimiento y desarrollo es un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas del crecimiento y desarrollo del niño, con la finalidad de detectar oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud a través de un monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo, así como también se considera la promoción de la salud física, mental, emocional y social. Se considera controles completos de acuerdo al número de controles requeridos por el MINSA de acuerdo a la edad del niño.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

En caso la madre no tenga o no muestre la Tarjeta de Control; no se diligencia la pregunta 466E.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños menores de 36 meses de edad, con madres de 15 a 49 años de edad.

CRED:

La variable CRED, se construye a partir de la pregunta 466C (¿Cuántos controles de Crecimiento y Desarrollo ha tenido (NOMBRE) desde su nacimiento?) del Cuestionario Individual, Sección 4B (Inmunización y Salud); respondieron mayor o igual a UNO (01) y un máximo de 24 a más controles. Si respondió el código 98 "No Sabe", se considera que no tuvo control.

Considerar que el control se puede realizar hasta un día antes de cumplir el siguiente mes. Ejemplo: Si un niño tiene 2 meses y 28 días, solo le corresponde 5 controles (4 recién nacido y 1 control del primer mes).

La pregunta 466C es validada durante la entrevista con la pregunta 466E (Número de controles de la Tarjeta).

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I16.1 = \frac{TN<36 \text{ CREDN}}{TN<36} \times 100$$

Donde:

TN<36CREDN: Total de niñas y niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED).

TN<36: Total de niñas y niños vivos menores 36 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23, REC0111, REC21, REC91, REC95, REC43.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD				
NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO	
	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
466C	¿Cuántos controles de Crecimiento y Desarrollo ha tenido (NOMBRE) desde su nacimiento? SI NINGUNO, ANOTE "00"	Nº DE VECES..... NO SABE..... 98	Nº DE VECES..... NO SABE..... 98	Nº DE VECES..... NO SABE..... 98

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P466	S466	REC95

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "CRED".

```
compute credN=0.
```

```
if cage < 1 & s466c >= 1 credN=1.
```

```
if (cage >= 1 & cage < 2) & s466c >= 4 credN=1.
```

```
if (cage >= 2 & cage < 3) & s466c >= 5 credN=1.
```

```
if (cage >= 3 & cage < 4) & s466c >= 6 credN=1.
```

```
if (cage >= 4 & cage < 5) & s466c >= 7 credN=1.
```

```
if (cage >= 5 & cage < 6) & s466c >= 8 credN=1.
```

```
if (cage >= 6 & cage < 7) & s466c >= 9 credN=1.
```

```
if (cage >= 7 & cage < 8) & s466c >= 10 credN=1.
```

```
if (cage >= 8 & cage < 9) & s466c >= 11 credN=1.
```

```
if (cage >= 9 & cage < 10) & s466c >= 12 credN=1.
```

```
if (cage >= 10 & cage < 11) & s466c >= 13 credN=1.
```

```
if (cage >= 11 & cage < 12) & s466c >= 14 credN=1.
```

```
if (cage >= 12 & cage < 14) & s466c >= 15 credN=1.
```

```
if (cage >= 14 & cage < 16) & s466c >= 16 credN=1.
```

```
if (cage >= 16 & cage < 18) & s466c >= 17 credN=1.
```

```
if (cage >= 18 & cage < 20) & s466c >= 18 credN=1.
```

```
if (cage >= 20 & cage < 22) & s466c >= 19 credN=1.
```

```
if (cage >= 22 & cage < 24) & s466c >= 20 credN=1.
```

```
if (cage >= 24 & cage < 27) & s466c >= 21 credN=1.
```

```
if (cage >= 27 & cage < 30) & s466c >= 22 credN=1.
```

```
if (cage >= 30 & cage < 33) & s466c >= 23 credN=1.
```

```
if (cage >= 33 & cage < 36) & s466c >= 24 credN=1.
```

```
if s466c=98 credN=0.
```

```
if missing(s466c) credN=0.
```

```
exe.
```

**Para la generación de cuadros tener en cuenta el siguiente filtro:

Use all.

```
Compute filter_$=(cage < 36 & b5 = 1 and v012>=15 and v012<=49).
```

```
Filter by filter_$.
```

```
Execute .
```

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°18

PORCENTAJE DE MENORES DE 12 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD (Según NST N°137-MINSA/2017/DGIESP)

DEFINICIÓN

Porcentaje de menores de 12 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completos de acuerdo a su edad, según Norma Técnica de Salud N° 137-MINSA/2017/DGIESP, Norma Técnica para el Control del Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de cinco años, aprobado con Resolución Ministerial N° 537-2017/MINSA.

JUSTIFICACIÓN

El control de crecimiento y desarrollo es un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas del crecimiento y desarrollo del niño, con la finalidad de detectar oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud a través de un monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo, así como también se considera la promoción de la salud física, mental, emocional y social. Se considera controles completos de acuerdo al número de controles requeridos por el MINSA de acuerdo a la edad del niño.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

En caso la madre no tenga o no muestre la Tarjeta de Control; no se diligencia la pregunta 466E.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños menores de 12 meses de edad, con madres de 15 a 49 años de edad.

CRED:

La variable CRED, se construye a partir de la pregunta 466C (¿Cuántos controles de Crecimiento y Desarrollo ha tenido (NOMBRE) desde su nacimiento?) del Cuestionario Individual, Sección 4B (Inmunización y Salud); respondieron mayor o igual a UNO (01) y un máximo de 14 a más controles. Si respondió el código 98 "No Sabe", se considera que no tuvo control.

Considerar que el control se puede realizar hasta un día antes de cumplir el siguiente mes. Ejemplo: Si un niño tiene 2 meses y 28 días, solo le corresponde 5 controles (4 recién nacido y 1 control del primer mes). La pregunta 466C es validada durante la entrevista con la pregunta 466E (Número de controles de la Tarjeta).

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I16.2 = \frac{TN<12 \text{ CREDN}}{TN<12} \times 100$$

Donde:

TN<12CREDN: Total de niñas y niños menores de 12 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED).

TN<12: Total de niñas y niños vivos menores 12 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23, REC0111, REC21, REC91, REC95, REC43.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

	NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO
		NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
466C	¿Cuántos controles de Crecimiento y Desarrollo ha tenido (NOMBRE) desde su nacimiento? SI NINGUNO, ANOTE "00"	Nº DE VECES..... NO SABE..... 98	Nº DE VECES..... NO SABE..... 98	Nº DE VECES..... NO SABE..... 98

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P216	B5	REC21
P466	S466	REC95

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* Generando la variable "CRED".
compute credN=0.
if cage < 1 & s466c >= 1 credN=1.

if (cage >= 1 & cage < 2) & s466c >= 4 credN=1.
if (cage >= 2 & cage < 3) & s466c >= 5 credN=1.
if (cage >= 3 & cage < 4) & s466c >= 6 credN=1.
if (cage >= 4 & cage < 5) & s466c >= 7 credN=1.
if (cage >= 5 & cage < 6) & s466c >= 8 credN=1.
if (cage >= 6 & cage < 7) & s466c >= 9 credN=1.
if (cage >= 7 & cage < 8) & s466c >= 10 credN=1.
if (cage >= 8 & cage < 9) & s466c >= 11 credN=1.
if (cage >= 9 & cage < 10) & s466c >= 12 credN=1.
if (cage >= 10 & cage < 11) & s466c >= 13 credN=1.
if (cage >= 11 & cage < 12) & s466c >= 14 credN=1.
if s466c=98 credN=0.
if missing(s466c) credN=0.
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°19

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS

DEFINICIÓN

Porcentaje de menores niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días

JUSTIFICACIÓN

Este Indicador ayuda a determinar la eficacia de la intervención destinada a la reducción de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad

Hierro:

La variable Hierro, se construye a partir de la pregunta 465E (En los últimos siete días ¿(NOMBRE) tomó:

- a) Hierro en jarabe
- b) Hierro en polvo como chispitas o “estrellitas”
- c) Hierro en gotas
- d) Hierro en otra presentación del Cuestionario Individual, Sección 4B (Inmunización y Salud); respondieron el código 1 (Sí) para alguna de las alternativas.

Se considera toda suplementación de Hierro recibida por entidades públicas y/o privadas.

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).

Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I17 = \frac{TN6<36H}{TN6<36} \times 100$$

Donde:

TN6<36H: Total de niñas y niños menores de 6 a 35 meses que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días

TN6<36: Total de niñas y niños menores de 6 a 35 meses de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23, RECH0, REC0111, REC21, REC91, REC95, REC43.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4B. INMUNIZACIÓN Y SALUD

NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO
	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
465E	En los últimos siete días ¿(NOMBRE) tomó:		
a. ¿Hierro en jarabe?	JARABE..... 1 2 8	JARABE..... 1 2 8	JARABE..... 1 2 8
b. ¿Hierro en polvo como Micronutrientes (chispitas, estrellitas o NUTROMIX)?	MICRONUTRIENTES (CHISPITAS/ ESTRELLITAS / NUTROMIX)..... 1 2 8	MICRONUTRIENTES (CHISPITAS/ / NUTROMIX)..... 1 2 8	MICRONUTRIENTES (CHISPITAS/ / NUTROMIX)..... 1 2 8
c. ¿Hierro en gotas?	GOTAS..... 1 2 8	GOTAS..... 1 2 8	GOTAS..... 1 2 8
d. ¿Hierro en otra presentación?	OTRA..... 1 2 8 (ESPECIFIQUE)	OTRA..... 1 2 8 (ESPECIFIQUE)	OTRA..... 1 2 8 (ESPECIFIQUE)
CONSIDERE TODA SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO (SULFATO FERROSO) RECIBIDA DE ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS			

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

N° de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P465E	S465EA S465EB S465EC S465ED	REC95

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Hierro".

```
RECODE edadm (6 THRU 35=1) INTO EDAD_6a35.  
do if edad_6a35=1.  
if (~missing(s465ea) or ~missing(s465eb) or ~missing(s465ec) or ~missing(s465ed) ) hierro6a35=0. if  
( s465ea=1 or s465eb=1 or s465ec=1 or s465ed=1 ) hierro6a35=1.  
end if.  
variable labels Hierro6a35 'Niños de 6 a 35 consumieron suplemento de hierro'.  
value labels Hierro6a35 1 'Si' 2'No'.  
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano.

INDICADOR N°20

TASA MORTALIDAD NEONATAL 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

La Tasa de Mortalidad neonatal es el número de nacidos vivos que fallece antes de cumplir el primer mes de vida por cada mil nacidos vivos. En este caso, la tasa tiene como periodo de referencia las defunciones de menores de 1 mes meses ocurridas en los últimos cinco años, teniendo como denominador el total de nacidos vivos en ese mismo periodo.

JUSTIFICACIÓN

La de mortalidad neonatal permite conocer la mortalidad de los menores de 1 mes el país tiene, lo que posibilita al gobierno estimar y tomar decisiones, en términos de los servicios que debe ofrecer para mejorar el valor.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación.

PRECISIONES TÉCNICAS

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL: Comprende la probabilidad de morir que tiene una o un nacido vivo antes de cumplir el primer mes de vida.

Referencia: http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSG1/Guide_to_DHS_Statistics_29Oct2012_DHSG1.pdf página 91.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005/1 000 000

Las tasas de mortalidad neonatal es un componente de probabilidad de muerte para el segmento de edad de 0 meses multiplicado por 1000.

MÉTODO DE CÁLCULO

Numerador: número de muertes de 0 a menos de 30 días.

Denominador: Numero de sobrevivientes a los 30 días o más de nacido, o los reportados como 1 o más meses.

$$TMN = \frac{NM}{NS} * 1000$$

Donde:

TMN: Tasa de Mortalidad Neonatal en los últimos 5 años

NM: Número de fallecidos antes de cumplir los 30 días, en los últimos 5 años antes de la encuesta

NS: Número de sobrevivientes a los 30 días o más de nacido, o reportados como 1 mes o más, en los últimos 5 años antes de la encuesta

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional y Área de residencia

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:
REC21

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCION 2 : REPRODUCCIÓN

HISTORIA DE NACIMIENTOS

211 Ahora me gustaría conversar con usted acerca de todos sus hijas e hijos, estén vivos/os o no, vivan o no con Ud. empezando con el primero que tuvo. ANOTE EL NOMBRE DE TODOS LAS HIJAS E HIJOS EN 212: LOS MELLIZOS Y TRILLIZOS ANÓTELOS EN LINEAS SEPARADAS. SONDEE PARA DETERMINAR SI LA SEÑORA HA TENIDO MELLIZOS Y TRILLIZOS Y, DE SER EL CASO, CIRCULE 2 EN 213 PARA FUTURA REFERENCIA.									
212 ¿Cuál es el nombre de su (primera), (segunda), (tercera), etc. hija o hijo?	213 ¿El nacimiento de (NOMBRE) fue parto único o múltiple?	214 ¿Es (NOMBRE) hombre o mujer?	215 ¿En qué día, mes y año nació (NOMBRE)? INDAGUE: ¿Cuándo es su cumpleaños?	216 ¿Está vivo (a) (NOMBRE)?	217 <u>SI ESTA VIVO</u> ¿Cuántos años cumplidos tiene? ANOTE "00" PARA MENOR DE UN AÑO	218 <u>SI ESTA VIVO</u> ¿Está (NOMBRE) viviendo con Ud?	219 <u>SI ESTA VIVO</u> REGISTRE EL NUMERO DE ORDEN DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR (REGISTRE "00" SI EL NIÑO NO FUE LISTADO)	220 <u>SI ESTA MUERTO</u> ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? SI "1 AÑO" INDAGUE: En meses ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? ANOTE: - DÍAS, SI MENOS DE 1 MES - MESES, SI MENOS DE 2 AÑOS - AÑOS SI ES 2 O MÁS AÑOS.	221 ¿Hubo algún otro nacimiento entre (NOMBRE DEL NACIMIENTO ANTERIOR) y (NOMBRE) ? SI: SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS NO: PRÓXIMO NACIMIENTO
01 (NOMBRE)	ÚNICO... 1 MULT... 2	H... 1 M... 2	DIA MES AÑO	SI... 1 NO... 2	EDAD EN AÑOS 220	SI... 1 NO... 2	NUMERO PROXIMO NACIMIENTO	DIAS... 1 MESES... 2 AÑOS... 3	

Con los datos anteriores se obtiene la edad actual del menor si está vivo y la edad que falleció para los que nacieron en los últimos 5 años

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Cuestionario	Base de datos
Fecha entrevista	V008	Cuestionario Individual	RE0111
P215	B3	Cuestionario Individual	REC21
P217	B5	Cuestionario Individual	REC21
P220	B7	Cuestionario Individual	REC21

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Edades de muerte en segmentos

Variable Labels AGEInth "Age in months - Deaths".

Value Labels

```

/AGEmnth
  0 "0"  1 "1-2"  2 "3-5"  3 "6-11"  4 "12-23"  5 "24-35"  6 "36-47"  7 "48-59"
.
* Periodo de análisis grupos de 5 años.
Variable Labels COLPER "Periods of analysis of 5 years".
Value Labels
/COLPER
  0 "0-4"
  1 "5-9"
.
* Tabular muertes por grupo de edad *.
Compute rweight = deaths / 1000.
Weight By rweight.
CrossTab agemnth By colper.
*
* Tabular exposición por grupo de edad. Para mortalidad neonatal el grupo usado es '0' o meses.
procedure output outfile='spss2.lis'.
Variable Labels AGEmnth "Age in months - Exposure".
Value Labels
/AGEmnth
  0 "0"  1 "1-2"  2 "3-5"  3 "6-11"  4 "12-23"  5 "24-35"  6 "36-47"  7 "48-59"
.
Compute rweight = exposure / 1000.
Weight By rweight.
CrossTab agemnth By colper.
*
* Tabular probabilidades por grupo de edad. Para mortalidad neonatal el grupo usado es '0' o meses.

Compute ageprb = agemnth.
Formats ageprb(F1.0).
Variable Labels AGEPRB "Age in months - Probabilities(times 1000000)".
Value Labels
/AGEPRB
  0 "0"  1 "1-2"  2 "3-5"  3 "6-11"  4 "12-23"  5 "24-35"  6 "36-47"  7 "48-59"
.
Compute rweight = deaths * 1000000/exposure.
Weight By rweight.
procedure output outfile='mt10p.tmp'.

CrossTab ageprb By colper /Write=Cells.

Data List File='MT10p.tmp'/sf 1-4 tn 5-8
                probs 9-16 ageprb 17-24 colper 25-32
                probdc 33-40 mn 41-48 infant 49-56.

* Mortrate es la mortalidad para los grupos neonatal, infantil y de menores de 5 años
Compute mortrate = 99.
If (ageprb = 0) mortrate = 0.
If (ageprb = 3) mortrate = 2.
If (ageprb = 7) mortrate = 3.
Formats mortrate(F1.0).

```

```

* Calcular la mortalidad acumulativa y la probabilidad de sobrevivencia
*.
If (mortrate =0) probdc = (10000000-probs).
If (mortrate<>0) probdc = (Lag(probdc) * (10000000-probs))/10000000.

*.
If (ageprb =4) probdc = (10000000-probs).

*.
If (mortrate =0) mn = probdc.
If (mortrate<>0) mn=Lag(mn).
If (mortrate =2) infant = probdc.
If (mortrate<>2) infant=Lag(infant).

Compute rate = 10000000 - probdc.

* Tabular las tasas de mortalidad para neonatal, infantil y menores de 5 años

Weight By rate.
procedure output outfile='rates1.tmp'.
temporary.
select if (mortrate <> 99).
CrossTab colper By mortrate/Format=NoTables/Write=Cells.

*.
Compute mortrate = 99.
If (ageprb = 3) mortrate = 1.
If (ageprb = 7) mortrate = 4.
If (mortrate = 1) rate = (10000000-probdc) - (10000000-mn) .
If (mortrate = 4) rate = 10000000 -((probdc * infant)/10000000).

Weight By rate.
procedure output outfile='rates2.tmp'.
temporary.
select if (mortrate <> 99).
CrossTab colper By mortrate/Format=NoTables/Write=Cells.

Data List File='rates1.tmp'/sf 1-4 tn 5-8
           rates 9-16 colper 17-24 mortrate 25-32.
Sort Cases By sf tn colper mortrate.
Save OutFile='rates1.tms'.
Data List File='rates2.tmp'/sf 1-4 tn 5-8
           rates 9-16 colper 17-24 mortrate 25-32.
Sort Cases By sf tn colper mortrate.
Save OutFile='rates2.tms'.
Add Files/File='rates1.tms'/File='rates2.tms'.

Variable Labels MORTRATE "Mortality rates".
Value Labels
/MORTRATE
0 "Neonatal (NM)"

```

- 1 "Post-neo. (PMN)"
- 2 "Infant (1q0)"
- 3 "Child (4q1)"
- 4 "Under-five (5q0)"

Variable Labels COLPER "Periods of analysis of 5 years".

Value Labels

/COLPER

- 0 "0-4"
- 1 "5-9"
- 2 "10-14"
- 3 "15-19"
- 4 "20-24"

* Tabular las tasaS finales *.

Compute rweight = rates / 10000.

Weight By rweight.

CrossTab tables=colper By mortrate /count=asis.

NOTA

Ámbito de Control: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

INDICADOR N°21

TASA MORTALIDAD INFANTIL 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

La Tasa de Mortalidad infantil es el número de nacidos vivos que fallece antes de cumplir el primer año de vida por cada mil nacidos vivos. En este caso, la tasa tiene como periodo de referencia las defunciones de menores de 1 año ocurridas en los últimos cinco años, teniendo como denominador el total de nacidos vivos en ese mismo periodo.

JUSTIFICACIÓN

La tasa de mortalidad infantil permite conocer la mortalidad de los menores de 1 año que el país tiene, lo que posibilita al gobierno estimar y tomar decisiones, en términos de los servicios que debe ofrecer para mejorar la calidad de vida de los niños

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación.

PRECISIONES TÉCNICAS

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL: Comprende la probabilidad de morir que tiene una o un nacido vivo durante el primer año de vida.

Referencia:

http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/DHSG1/Guide_to_DHS_Statistics_29Oct2012_DHSG1.pdf página 91.

La información se recoge en la sección 2 Reproducción del cuestionario individual (mujer y niño) en la Historia de Nacimientos.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005/1 000 000

Las tasas de mortalidad infantil es un componente de probabilidad de muerte para el segmento de edad de menores de 1 año multiplicado por 1000.

MÉTODO DE CÁLCULO

Numerador: número de muertes de 0 a menos de 1 año.

Denominador: Numero de sobrevivientes al año o más de nacido.

$$TMI = \frac{NI}{NS} * 1000$$

Donde:

TMI: Tasa de Mortalidad infantil en los últimos 5 años

NI: Número de fallecidos antes de cumplir 1 año, en los últimos 5 años antes de la encuesta

NS: Número de sobrevivientes al año o más de nacido, en los últimos 5 años antes de la encuesta

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual:

Área de residencia

Región natural (Costa, Sierra y Selva)

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC21

REC0111

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCION 2 : REPRODUCCIÓN

HISTORIA DE NACIMIENTOS

211 Ahora me gustaría conversar con usted acerca de todos sus hijas e hijos, estén vivos/os o no, vivan o no con Ud. empezando con el primero que tuvo. ANOTE EL NOMBRE DE TODOS LAS HIJAS E HIJOS EN 212: LOS MELLIZOS Y TRILLIZOS ANÓTELOS EN LINEAS SEPARADAS. SONDEE PARA DETERMINAR SI LA SEÑORA HA TENIDO MELLIZOS Y TRILLIZOS Y, DE SER EL CASO, CIRCULE 2 EN 213 PARA FUTURA REFERENCIA.									
212 ¿Cuál es el nombre de su (primera), (segunda), (tercera), etc. hija o hijo?	213 ¿El nacimiento de (NOMBRE) fue parto único o múltiple?	214 ¿Es (NOMBRE) hombre o mujer?	215 ¿En qué día, mes y año nació (NOMBRE)? INDAGUE: ¿Cuándo es su cumpleaños?	216 ¿Está vivo (a) (NOMBRE)?	217 SI ESTA VIVO ¿Cuántos años cumplidos tiene? ANOTE "00" PARA MENOR DE UN AÑO	218 SI ESTA VIVO ¿Está (NOMBRE) viviendo con Ud?	219 SI ESTA VIVO REGISTRE EL NUMERO DE ORDEN DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR (REGISTRE "00" SI EL NIÑO NO FUE LISTADO)	220 SI ESTA MUERTO ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? SI "1 AÑO" INDAGUE: En meses ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? ANOTE: - DÍAS, SI MENOS DE 1 MES - MESES, SI MENOS DE 2 AÑOS - AÑOS SI ES 2 O MÁS AÑOS.	221 ¿Hubo algún otro nacimiento entre (NOMBRE DEL NACIMIENTO ANTERIOR) y (NOMBRE) ? SI: SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS NO: PRÓXIMO NACIMIENTO
01 (NOMBRE)	ÚNICO... 1 MULT... 2	H... 1 M... 2	DÍA MES AÑO	SI... 1 NO... 2	EDAD EN AÑOS	SI... 1 NO... 2	NUMERO PROXIMO NACIMIENTO	DÍAS... 1 MESES... 2 AÑOS... 3	

Con los datos anteriores se obtiene la edad actual del menor si está vivo y la edad que falleció para los que nacieron en los últimos 5 años

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Cuestionario	Base de datos
Fecha entrevista	V008	Cuestionario Individual	RE0111
P215	B3	Cuestionario Individual	REC21
P217	B5	Cuestionario Individual	REC21
P220	B7	Cuestionario Individual	REC21

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Edades de muerte en segmentos

Variable Labels AGEInth "Age in months - Deaths".

```

Value Labels
/AGEmnth
  0 "0"  1 "1-2"  2 "3-5"  3 "6-11"  4 "12-23"  5 "24-35"  6 "36-47"  7 "48-59"
* Periodo de análisis grupos de 5 años.
Variable Labels COLPER "Periods of analysis of 5 years".
Value Labels
/COLPER
  0 "0-4"  1 "5-9"
* Tabular muertes por grupo de edad *.
Compute rweight = deaths / 1000.
Weight By rweight.
CrossTab agemnth By colper.
*
* Tabular exposición por grupo de edad.
procedure output outfile='spss2.lis'.
Variable Labels AGEmnth "Age in months - Exposure".
Value Labels
/AGEmnth
  0 "0"  1 "1-2"  2 "3-5"  3 "6-11"  4 "12-23"  5 "24-35"  6 "36-47"  7 "48-59"
.Compute rweight = exposure / 1000.
Weight By rweight.
CrossTab agemnth By colper.
*
* Tabular probabilidades por grupo de edad.
Compute ageprb = agemnth.
Formats ageprb(F1.0).
Variable Labels AGEPRB "Age in months - Probabilities(times 1000000)".
Value Labels
/AGEPRB
  0 "0"  1 "1-2"  2 "3-5"  3 "6-11"  4 "12-23"  5 "24-35"  6 "36-47"  7 "48-59".
*** probabilidad de mortalidad infantil grupos '0,1,2 y 3)
Compute rweight = deaths * 1000000/exposure.
Weight By rweight.
procedure output outfile='mt10p.tmp'.

CrossTab ageprb By colper /Write=Cells.

Data List File='MT10p.tmp'/sf 1-4 tn 5-8
                probs 9-16 ageprb 17-24 colper 25-32
                probdc 33-40 mn 41-48 infant 49-56.
* Mortrate es la mortalidad para los grupos neonatal, infantil y de menores de 5 años
Compute mortrate = 99.
If (ageprb = 0) mortrate = 0.
If (ageprb = 3) mortrate = 2.
If (ageprb = 7) mortrate = 3.
Formats mortrate(F1.0).

* Calcular la mortalidad acumulativa y la probabilidad de sobrevivencia
If (mortrate=0) probdc = (10000000-probs).
If (mortrate<>0) probdc = (Lag(probdc) * (10000000-probs))/10000000.
*

```

```

If (ageprb =4) probdc = (10000000-probs).
*.
If (mortrate =0) mn = probdc.
If (mortrate<>0) mn=Lag(mn).
If (mortrate =2) infant = probdc.
If (mortrate<>2) infant=Lag(infant).
Compute rate = 10000000 - probdc.
* Tabular las tasas de mortalidad para neonatal, infantil y menores de 5 años
Weight By rate.
procedure output outfile='rates1.tmp'.
temporary.
select if (mortrate <> 99).
CrossTab colper By mortrate/Format=NoTables/Write=Cells.
*.
Compute mortrate = 99.
If (ageprb = 3) mortrate = 1.
If (ageprb = 7) mortrate = 4.
If (mortrate = 1) rate = (10000000-probdc) - (10000000-mn) .
If (mortrate = 4) rate = 10000000 -((probdc * infant)/10000000).

Weight By rate.
procedure output outfile='rates2.tmp'.
temporary.
select if (mortrate <> 99).
CrossTab colper By mortrate/Format=NoTables/Write=Cells.

Data List File='rates1.tmp'/sf 1-4 tn 5-8
           rates 9-16 colper 17-24 mortrate 25-32.
Sort Cases By sf tn colper mortrate.
Save OutFile='rates1.tms'.
Data List File='rates2.tmp'/sf 1-4 tn 5-8
           rates 9-16 colper 17-24 mortrate 25-32.
Sort Cases By sf tn colper mortrate.
Save OutFile='rates2.tms'.
Add Files/File='rates1.tms'/File='rates2.tms'.

Variable Labels MORTRATE "Mortality rates".
Value Labels
/MORTRATE
    0 "Neonatal (NM)" 1 "Post-neo. (PMN)" 2 "Infant (1q0)" 3 "Child (4q1)" 4 "Under-five (5q0)"
.Variable Labels COLPER "Periods of analysis of 5 years".
Value Labels
/COLPER
    0 "0-4" 1 "5-9" 2 "10-14" 3 "15-19" 4 "20-24"

* Tabular las tasa finales *.
Compute rweight = rates / 10000.
Weight By rweight.
CrossTab tables=colper By mortrate /count=asis.

```

NOTA

Ámbito de Control: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

INDICADOR N°22

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LA MUJERES DE 15 A 49 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil, el periodo es los últimos 3 años

JUSTIFICACIÓN

La tasa de fecundidad permite conocer la tendencia que el país tiene, en relación al promedio de hijos por mujer a lo largo de las décadas. Lo que posibilita al gobierno estimar y tomar decisiones, en términos de lo que puede crecer la población.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación.

PRECISIONES TÉCNICAS

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es la suma de las tasas de fecundidad de todos los grupos de edad, durante un período de tiempo determinado. La TGF se mide para los tres años anteriores a la Encuesta. En el proceso del indicador se usan los meses de exposición de la mujer en los grupos de edad quinquenal los últimos 3 años, es decir una mujer podría estar expuesta en 2 grupos de edad. Ejemplo: una mujer de 20 años tiene exposición en el grupo 20 a 24 y 15 a 19 años

MÉTODO DE CÁLCULO

Se suma de las tasas específicas de fecundidad por grupos quinquenales de edades de las mujeres entre 15 y 49 años, multiplicado por 5.

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$TGF = \frac{\sum_1^7 TGE \cdot 5}{1000}$$

Donde:

TGF: Tasa Global de Fecundidad de mujeres de 15 a 49 años

TEF Tasa Especifica de fecundidad de mujeres de 15 a 49 años por grupos quinquenales

i=1 se refiere a mujeres de 15 a 19, i2 a mujeres de 20 a 24, ..., i7 a mujeres de 45 a 49 años.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual:

Área de residencia

Región natural (Costa, Sierra y Selva)

Departamental.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOSPágina web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>**Datos:****RECH23, REC0111, REC21, REC91, REC41****INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN**

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES DE LA ENTREVISTADA

106	¿Cuántos años cumplidos tiene? COMPARE 105 Y 106 Y CORRIJA SI SON INCONSISTENTES	EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS.....	
-----	---	-----------------------------	----------------------

SECCION 2 : REPRODUCCIÓN**HISTORIA DE NACIMIENTOS**

211 Ahora me gustaría conversar con usted acerca de todos sus hijas e hijos, estén vivos/os o no, vivan o no con Ud. empezando con el primero que tuvo. ANOTE EL NOMBRE DE TODOS LAS HIJAS E HIJOS EN 212: LOS MELLIZOS Y TRILLIZOS ANÓTELOS EN LINEAS SEPARADAS. SONDEE PARA DETERMINAR SI LA SEÑORA HA TENIDO MELLIZOS Y TRILLIZOS Y, DE SER EL CASO, CIRCULE 2 EN 213 PARA FUTURA REFERENCIA.									
212	213	214	215	216	217	218	219	220	221
¿Cuál es el nombre de su (primera), (segunda), (tercera), etc. hija o hijo?	¿El nacimiento de (NOMBRE) fue parto único o múltiple?	¿Es (NOMBRE) hombre o mujer?	¿En qué día, mes y año nació (NOMBRE)? INDAGUE: ¿Cuándo es su cumpleaños?	¿Está vivo (a) (NOMBRE)?	¿Cuántos años cumplidos tiene? ANOTE "00" PARA MENOR DE UN AÑO	¿Está (NOMBRE) viviendo con Ud?	REGISTRE EL NUMERO DE ORDEN DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR (REGISTRE "00" SI EL NIÑO NO FUE LISTADO)	¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? SI "1 AÑO" INDAGUE: En meses ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? ANOTE: - DÍAS, SI MENOS DE 1 MES - MESES, SI MENOS DE 2 AÑOS - AÑOS SI ES 2 O MÁS AÑOS.	¿Hubo algún otro nacimiento entre (NOMBRE DEL NACIMIENTO ANTERIOR) y (NOMBRE) ? SI: SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS NO: PRÓXIMO NACIMIENTO
01	UNICO... 1 MULT... 2	H... 1 M... 2	DÍA MES AÑO	SI... 1 NO... 2	EDAD EN AÑOS 220	SI... 1 NO... 2	NUMERO PROXIMO NACIMIENTO	DÍAS... 1 MESES... 2 AÑOS... 3	

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Cuestionario	Base de datos
P105 Fecha entrevista	V011 V008	Cuestionario Individual	REC0111
P215	B3	Cuestionario Individual	REC21

SINTAXIS**Programa empleado: SPSS**

*Periodo 3 años antes de la entrevista

*

Compute period = 36.

*edad de la madre al nacimiento del hijo en meses.

Compute agembm = B3 - V011.

* Crea los grupos de edad de la madre*.

Compute agemb5 = Trunc(agembm/60) - 2.

Variable Labels agemb5 "Edad al nacimiento".

Value Labels agemb5

1 '15-19'

2 '20-24'

3 '25-29'

4 '30-34'

5 '35-39'

6 '40-44'

7 '45-49'.

Compute withinp = 0.

If (0 < V008-B3 & V008-B3 <= period & agemb5 > 0) withinp = 1.

* selecciona los nacimientos antes de los 3 años.

select if withinp=1.

* Grupos actuales de edad de la mujer *.

Compute age = V008 - 1 - V011.

Compute age5 = Trunc(age/60).

* Calcula la exposición en meses de la mujer *

* higexp = exposición en el grupo actual *

* lowexp = exposure en el grupo anterior .

Compute higexp = age - (age5 * 60) + 1.

Compute lowexp = 0.

If (higexp > period) higexp = period.

If (higexp < period) lowexp = period - higexp.

Compute rweight = higexp * V005 / 1000000.

* El grupo se convierte 15-19 = 1 los otros grupo se ven afectados de igual forma*

* 20-24 se convierte en 2 en de de 4 *.

Compute age5 = age5 - 2.

* Crea un peso igual a la exposición en el grupo previo *.

Compute rweight2 = lowexp * V005 / 1000000.

* Reduce grupo de edad en uno: 15-19 se convierte de 1 a 0, etc.

.

Compute age5_2 = age5 - 1.

NOTA

Ámbito de Control: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

INDICADOR N°23

PORCENTAJE DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años de edad) en unión que usa actualmente algún método de planificación familiar

JUSTIFICACIÓN

Este indicador, también conocido como “prevalencia anticonceptiva”, proporciona una medida de cobertura del uso de anticonceptivos en la población con necesidad total de planificar su familia, teniendo en cuenta todas las fuentes de suministro y todos los métodos anticonceptivos, que incluye la esterilización. Es la medida más difundida para la evaluación de los programas de planificación familiar.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, que usan actualmente métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa.

Asimismo, depende mucho de la habilidad y conocimiento de las encuestadoras sobre los métodos anticonceptivos y estar familiarizadas con los conceptos.

PRECISIONES TÉCNICAS

Métodos Anticonceptivos:

La variable Métodos anticonceptivos, se construye a partir de la pregunta 311 (¿Qué está haciendo para evitar quedar embarazada?) del Cuestionario Individual, Sección 3 (Anticoncepción); respondieron alguna de las alternativas de la A hasta la X.

Para el cálculo del indicador se consideran a las mujeres unidas de 15 a 49 años de edad, es decir que declararon estar casadas o conviviendo (pregunta 501= 1 o 2). No se considera a las mujeres que se encuentran actualmente embarazadas.

- **Métodos modernos:** Esterilización femenina, esterilización masculina (Vasectomía), píldora, DIU, inyección, implantes, condón, condón femenino, espumas, jaleas, óvulos (vaginales), lactancia exclusiva (Mela) y anticoncepción oral de emergencia
- **Métodos tradicionales:** Abstinencia periódica y retiro.
- Los otros se consideran como métodos folclóricos

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005 / 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I24 = \frac{TM_MA}{TM} \times 100$$

Donde:

TM_MA: Total de mujeres unidas de 15 a 49 años que usa actualmente algún método de planificación familiar

TM: Total de mujeres unidas de 15 a 49 años de edad

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural, nivel de educación, quintil de riqueza y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos: RECH23, REC0111, REC91, RE516171, RE223132

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 3. ANTICONCEPCIÓN

308	VERIFIQUE 302 (01):	MUJER NO ESTERILIZADA ☐	MUJER ESTERILIZADA ☐	311A
309	VERIFIQUE 226:	226=2, 8 NO EMBARAZADA O INSEGURA ☐	226=1 EMBARAZADA ☐	319
310	¿Actualmente están Ud. o su pareja haciendo algo o usando algún método para postergar o evitar quedar embarazada?	SI..... 1	NO..... 2	319
311	¿Qué están haciendo o usando para evitar quedar embarazada?	ESTERILIZACIÓN FEMENINA..... A	ESTERILIZACIÓN MASCULINA (VASECTOMIA)..... B	312
	SI MENCIONA MÁS DE UN MÉTODO, SIGA EL PASE DEL QUE ESTÉ MÁS ARRIBA EN LA LISTA	PÍLDORA..... C	DIU..... D	
		INYECCIÓN..... E	IMPLANTES..... F	
		CONDÓN..... G	CONDÓN FEMENINO..... H	
311A	HAGA UN CÍRCULO EN "A" PARA LA ESTERILIZACIÓN FEMENINA.	ESPUMAS, JALEAS, ÓVULOS (VAGINALES)..... I	LACTANCIA EXCLUSIVA (MELA)..... J	316
		ABSTINENCIA PERIÓDICA..... K	RETIRO..... L	
		ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA..... M	OTRO:..... X	
		(ESPECIFIQUE)		

SECCIÓN 5. NUPCILIDAD

501	¿Actualmente Ud. está casada o conviviendo?	SÍ, ACTUALMENTE CASADA..... 1	SÍ, CONVIVIENDO..... 2	NO, NO EN UNIÓN..... 3	506
-----	---	-------------------------------	------------------------	------------------------	-----

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P226, P304, PP10, P311	V313	RE223132
P501, P502, P505	V501	RE516171

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Métodos anticonceptivos".

Recode v501 (1,2=1)(0,3,4,5=2) into unidas.

Val label unidas 1'Si' 2'No'.

Recode V313 (1,2,3=1) (0=0) INTO UsaMetodo.

val label Usametodo 1 'Uso MPF' 0 'No usa'.

if unidas=1 MU_usompf=0.

if unidas=1 & Usametodo=1 MU_usompf=1.

var lab MU_usompf 'Mujeres Unidas que usan MPF'.

val lab MU_usompf 1 'Si' 0 'No'.

exe.

NOTA

Ámbito de control: Programa Salud Materno Neonatal.

INDICADOR N°24

PORCENTAJE DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO MODERNO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años de edad) en unión que usa actualmente algún método moderno de planificación familiar

JUSTIFICACIÓN

Este indicador, también conocido como “prevalencia anticonceptiva”, proporciona una medida de cobertura del uso de anticonceptivos en la población con necesidad total de planificar su familia, teniendo en cuenta todas las fuentes de suministro y todos los métodos anticonceptivos, que incluye la esterilización. Es la medida más difundida para la evaluación de los programas de planificación familiar.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, que usan actualmente métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa. Asimismo, depende mucho de la habilidad y conocimiento de las encuestadoras sobre los métodos anticonceptivos y estar familiarizadas con los conceptos.

PRECISIONES TÉCNICAS

Métodos Anticonceptivos Modernos:

La variable Métodos anticonceptivos, se construye a partir de la pregunta 311 (¿Qué está haciendo para evitar quedar embarazada?) del Cuestionario Individual, Sección 3 (Anticoncepción); respondieron alguna de las alternativas: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y M.

Los métodos modernos incluyen: Esterilización femenina, esterilización masculina (Vasectomía), píldora, DIU, inyección, implantes, condón, condón femenino, espumas, jaleas, óvulos (vaginales), lactancia exclusiva (Mela) y anticoncepción oral de emergencia

Para el cálculo del indicador se consideran a las mujeres unidas, es decir que declararon estar casadas o conviviendo (pregunta 501= 1 o 2). No se considera a las mujeres que se encuentran actualmente embarazadas.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005 /1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I25 = \frac{TM_MAM}{TM} \times 100$$

Donde:

TM_MAM: Total de mujeres unidas de 15 a 49 años que usa actualmente algún método moderno de planificación familiar

TM: Total de mujeres unidas de 15 a 49 años de edad

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23, REC0111, REC91, RE516171, RE223132

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 3. ANTICONCEPCIÓN

308	VERIFIQUE 302 (01): MUJER NO ESTERILIZADA ☐ MUJER ESTERILIZADA ☐	311A
309	VERIFIQUE 226: 226=2, 8 NO EMBARAZADA O INSEGURA ☐ 226=1 EMBARAZADA ☐	319
310	¿Actualmente están Ud. o su pareja haciendo algo o usando algún método para postergar o evitar quedar embarazada? SI..... 1 NO..... 2	319
311	¿Qué están haciendo o usando para evitar quedar embarazada? SI MENCIONA MÁS DE UN MÉTODO, SIGA EL PASE DEL QUE ESTÉ MÁS ARRIBA EN LA LISTA	312
311A	HAGA UN CÍRCULO EN "A" PARA LA ESTERILIZACIÓN FEMENINA. ESTERILIZACIÓN FEMENINA..... A ESTERILIZACIÓN MASCULINA (VASECTOMIA)..... B PÍLDORA..... C DIU..... D INYECCIÓN..... E IMPLANTES..... F CONDÓN..... G CONDÓN FEMENINO..... H ESPUMAS, JALEAS, ÓVULOS (VAGINALES)..... I LACTANCIA EXCLUSIVA (MELA)..... J ABSTINENCIA PERIÓDICA..... K RETIRO..... L ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA..... M OTRO:..... X (ESPECIFIQUE)	316

SECCIÓN 5. NUPCILIDAD

501	¿Actualmente Ud. está casada o conviviendo? SÍ, ACTUALMENTE CASADA..... 1 SÍ, CONVIVIENDO..... 2 NO, NO EN UNIÓN..... 3	506
-----	--	-----

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P226, P304, PP10, P311	V313	RE223132
P501, P502, P505	V501	RE516171

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Métodos anticonceptivos modernos".

```
Recode V501 (1,2=1)(0,3,4,5=2) into unidas.  
Val label unidas 1'Si' 2'No'.  
Recode V313 (3=1) (1,2,0=0) into UsaMetMod.  
val label UsaMetMod 1 'Uso Método moderno de PF' 0 'No usa'.if  
unidas=1 MU_Modpf=0.  
if unidas=1 & UsaMetMod=1 MU_Modpf=1.  
var lab MU_Modpf 'Mujeres Unidas que usan Met Mod PF'.val  
lab MU_Modpf 1 'Si' 0 'No'.  
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programa Salud Materno Neonatal.

INDICADOR N°25

PORCENTAJE DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años de edad) en unión que usa actualmente algún método tradicional de planificación familiar

JUSTIFICACIÓN

Este indicador, también conocido como “prevalencia anticonceptiva”, proporciona una medida de cobertura del uso de anticonceptivos en la población con necesidad total de planificar su familia, teniendo en cuenta todas las fuentes de suministro y todos los métodos anticonceptivos. Es la medida más difundida para la evaluación de los programas de planificación familiar.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, que usan actualmente métodos anticonceptivos para evitar un embarazo, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa.

Asimismo, depende mucho de la habilidad y conocimiento de las encuestadoras sobre los métodos anticonceptivos y estar familiarizadas con los conceptos.

PRECISIONES TÉCNICAS

Métodos Anticonceptivos Tradicionales:

La variable Métodos anticonceptivos, se construye a partir de la pregunta 311 (¿Qué está haciendo para evitar quedar embarazada?) del Cuestionario Individual, Sección 3 (Anticoncepción); respondieron alguna de las alternativas: K, L, X.

Los métodos tradicionales incluyen: Abstinencia periódica y retiro. Los otros se consideran como métodos folclóricos

Para el cálculo del indicador se consideran a las mujeres unidas, es decir que declararon estar casadas o conviviendo (pregunta 501= 1 o 2). No se considera a las mujeres que se encuentran actualmente embarazadas.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I26 = \frac{TM_MAT}{TM} \times 100$$

Donde:

TM_MAT: Total de mujeres unidas de 15 a 49 años que usa actualmente algún método tradicional de planificación familiar.

TM: Total de mujeres unidas de 15 a 49 años de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* Generando la variable "Métodos anticonceptivos tradicionales".
Recode v501 (1,2=1) (0,3,4,5=2) into unidas.
Val label unidas 1'Si' 2'No'.
Recode V313 (1,2=1) (3,0=0) INTO UsaMetTrad.
val label UsaMetTrad 1 'Uso Método tradicional de PF' 0 'No usa'.if
unidas=1 MU_Tradpf=0.
if unidas=1 & UsaMetTrad=1 MU_Tradpf=1.
var lab MU_Tradpf 'Mujeres Unidas que usan Met Trad PF'.val
lab MU_Tradpf 1 'Usa Met Trad PF' 0 'no'.
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programa Salud Materno Neonatal.

INDICADOR N°26

PORCENTAJE DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de parto institucional de gestantes procedentes del área rural del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta, es decir partos ocurridos en establecimiento de salud y que fueron atendidos por profesional de la salud calificado: Médico, Obstetra y/o Enfermera

JUSTIFICACIÓN

Este indicador es una medida del potencial del sistema de salud para proveer una cobertura adecuada para los partos y da información sobre la cobertura de los partos asistidos, ya sean normales o complejos. A diferencia de otros indicadores complementarios como la proporción de nacidos vivos atendidos en establecimientos de salud, este indicador recoge las condiciones en términos de la infraestructura donde se llevan a cabo los partos, sino también las características de los recursos humanos encargados de llevar a cabo dichas tareas.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Parto Institucional rural:

La variable Parto Institucional, se construye a partir de las preguntas del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, parto, puerperio y lactancia):

- 1) Pregunta 426: ¿Quién la atendió en el parto de (NOMBRE)?; respondieron las alternativas: A (Médico), B (Obstetiz) o C (Enfermera) y
- 2) Pregunta 426A: ¿Dónde dio a luz a (NOMBRE)?; respondieron cualquiera de los códigos (21 a 32 y 41, 42); excepto: 11 (Su domicilio), 33(Casa de partera) y 96 (Otro)

Profesional de salud calificado: Médico, obstetiz, enfermera

Para obtener este indicador se considera a las mujeres del área rural de 15 a 49 años de edad que tuvieron nacimiento vivo en los últimos cinco años, estén o no embarazadas al momento de la entrevista.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005 / 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I27 = \frac{TM_PIR}{TM} \times 100$$

Donde:

TM_PIR: Total de mujeres del área rural que tuvieron nacimiento vivo atendido por personal de salud calificado en establecimientos de salud en los últimos cinco años.

TM: Total de mujeres del área rural que tuvieron nacimiento vivo en los últimos cinco años.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23, REC0111, REC21, REC91, REC41

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4A: EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA

NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
426 ¿Quién la atendió en el parto de (NOMBRE)? ¿Alguién más? TRATE DE AVERIGUAR POR LA PERSONA QUE LA ATENDIÓ Y ANOTE TODAS LAS PERSONAS QUE LA ASISTIERON SI "NADIE", SONDEE POR LA PRESENCIA DE ADULTOS	MÉDICO..... A OBSTETRIZ..... B ENFERMERA..... C TÉCNICO EN ENFERMERÍA..... D PROMOTOR DE SALUD..... E COMADRONA/ PARTERA..... F FAMILIAR..... G OTRO:..... X (ESPECIFIQUE) NADIE..... Y	MÉDICO..... A OBSTETRIZ..... B ENFERMERA..... C TÉCNICO EN ENFERMERÍA..... D PROMOTOR DE SALUD..... E COMADRONA/ PARTERA..... F FAMILIAR..... G OTRO:..... X (ESPECIFIQUE) NADIE..... Y	MÉDICO..... A OBSTETRIZ..... B ENFERMERA..... C TÉCNICO EN ENFERMERÍA..... D PROMOTOR DE SALUD..... E COMADRONA/ PARTERA..... F FAMILIAR..... G OTRO:..... X (ESPECIFIQUE) NADIE..... Y
426A ¿Dónde dió a luz a (NOMBRE)? SI EL LUGAR DE ATENCIÓN ES UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, ESCRIBA EL NOMBRE, LUEGO DETERMINE SI EL SECTOR ES PÚBLICO O PRIVADO Y CIRCULE EL CÓDIGO APROPIADO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	SU DOMICILIO..... 11 SECTOR PÚBLICO HOSPITAL: MINSAL..... 21 (PASE A 426D) ESSALUD..... 22 FF.AA. Y PNP..... 23 CENTRO SALUD MINSAL..... 24 PUESTO SALUD MINSAL..... 25 (PASE A 426D) POLICLÍNICO/CENTRO/ POSTA ESSALUD..... 26 HOSPITAL/ OTRO DE LA MUNICIPALIDAD..... 27 SECTOR PRIVADO CLÍNICA PARTICULAR..... 31 CONSULT. MÉDICO PART..... 32 CASA DE PARTERA..... 33 ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES CLÍNICA/ POSTA DE ONG..... 41 HOSPITAL/ OTRO DE LA IGLESIA..... 42 OTRO:..... 96 (ESPECIFIQUE)	SU DOMICILIO..... 11 SECTOR PÚBLICO HOSPITAL: MINSAL..... 21 (PASE A 426D) ESSALUD..... 22 FF.AA. Y PNP..... 23 CENTRO SALUD MINSAL..... 24 PUESTO SALUD MINSAL..... 25 (PASE A 426D) POLICLÍNICO/CENTRO/ POSTA ESSALUD..... 26 HOSPITAL/ OTRO DE LA MUNICIPALIDAD..... 27 SECTOR PRIVADO CLÍNICA PARTICULAR..... 31 CONSULT. MÉDICO PART..... 32 CASA DE PARTERA..... 33 ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES CLÍNICA/ POSTA DE ONG..... 41 HOSPITAL/ OTRO DE LA IGLESIA..... 42 OTRO:..... 96 (ESPECIFIQUE)	SU DOMICILIO..... 11 SECTOR PÚBLICO HOSPITAL: MINSAL..... 21 (PASE A 426D) ESSALUD..... 22 FF.AA. Y PNP..... 23 CENTRO SALUD MINSAL..... 24 PUESTO SALUD MINSAL..... 25 (PASE A 426D) POLICLÍNICO/CENTRO/ POSTA ESSALUD..... 26 HOSPITAL/ OTRO DE LA MUNICIPALIDAD..... 27 SECTOR PRIVADO CLÍNICA PARTICULAR..... 31 CONSULT. MÉDICO PART..... 32 CASA DE PARTERA..... 33 ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES CLÍNICA/ POSTA DE ONG..... 41 HOSPITAL/ OTRO DE LA IGLESIA..... 42 OTRO:..... 96 (ESPECIFIQUE)

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P426	M3A M3B M3C M3N	REC41
P426A	M15	REC41

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Parto institucional".

Recode m15 (21 thru 27=1)(31 thru 32=1)(41 thru 42=1)(else=2) into Part_estab.

execute.

variable labels Part_estab 'Partos en establecimientos de salud'.

val labels Part_estab 1 "Si" 2 "No".

compute PART_INST=0.

IF (Part_estab=1 AND (M3A=1 | M3B=1 | M3C=1)) PART_INST=1.

IF (Part_estab=2 AND (M3N=0)) PART_INST=0.

EXECUTE.

Var label part_inst "Parto institucional rural".

Val label part_inst 1 "Si" 0 "No"

use all.

compute filter_\$=(v025=2 and midx=1).

filter by filter_\$.

exe.

NOTA

Ámbito de Control: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal.

INDICADOR N°27

PORCENTAJE DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de parto institucional del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta, es decir partos ocurridos en establecimiento de salud y que fueron atendidos por profesional de la salud calificado: Médico, Obstetra y/o Enfermera

JUSTIFICACIÓN

Este indicador es una medida del potencial del sistema de salud para proveer una cobertura adecuada para los partos y da información sobre la cobertura de los partos asistidos, ya sean normales o complejos. A diferencia de otros indicadores complementarios como la proporción de nacidos vivos atendidos en establecimientos de salud, este indicador recoge las condiciones en términos de la infraestructura donde se llevan a cabo los partos, sino también las características de los recursos humanos encargados de llevar a cabo dichas tareas.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Parto Institucional:

La variable Parto Institucional, se construye a partir de las preguntas del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, parto, puerperio y lactancia):

- 1) Pregunta 426: ¿Quién la atendió en el parto de (NOMBRE)?; respondieron las alternativas: A (Médico), B (Obstetiz) o C (Enfermera) y
- 2) Pregunta 426A: ¿Dónde dio a luz a (NOMBRE)?; respondieron cualquiera de los códigos (21 a 32 y 41, 42); excepto: 11 (Su domicilio), 33(Casa de partera) y 96 (Otro)

Profesional de salud calificado: Médico, obstetiz, enfermera

Para el cálculo del indicador se considera el último nacimiento (midx=1) de las mujeres de 15 a 49 años de edad.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005 / 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I28 = \frac{TM_{PI}}{TM} \times 100$$

Donde:

TM: Total de mujeres que tuvieron nacimiento vivo en los últimos cinco años.

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/>

RECH23, REC0111, REC21, REC91, REC41

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECTOR PÚBLICO		SECTOR PÚBLICO		SECTOR PÚBLICO	
ÚLTIMO NACIDO VIVO		ÚLTIMO NACIDO VIVO		ÚLTIMO NACIDO VIVO	
NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212		NÚMERO DE ORDEN		NÚMERO DE ORDEN	
NOMBRE _____		NOMBRE _____		NOMBRE _____	
426	¿Quién la atendió en el parto de (NOMBRE)? ¿Alguién más? TRATE DE AVERIGUAR POR LA PERSONA QUE LA ATENDIÓ Y ANOTE TODAS LAS PERSONAS QUE LA ASISTIERON SI "NADIE", SONDEE POR LA PRESENCIA DE ADULTOS	MÉDICO..... A OBSTETRIZ..... B ENFERMERA..... C TÉCNICO EN ENFERMERÍA..... D PROMOTOR DE SALUD..... E COMADRONA/ PARTERA..... F FAMILIAR..... G OTRO:..... X (ESPECIFIQUE) NADIE..... Y	MÉDICO..... A OBSTETRIZ..... B ENFERMERA..... C TÉCNICO EN ENFERMERÍA..... D PROMOTOR DE SALUD..... E COMADRONA/ PARTERA..... F FAMILIAR..... G OTRO:..... X (ESPECIFIQUE) NADIE..... Y	MÉDICO..... A OBSTETRIZ..... B ENFERMERA..... C TÉCNICO EN ENFERMERÍA..... D PROMOTOR DE SALUD..... E COMADRONA/ PARTERA..... F FAMILIAR..... G OTRO:..... X (ESPECIFIQUE) NADIE..... Y	
426A	¿Dónde dió a luz a (NOMBRE)? SI EL LUGAR DE ATENCIÓN ES UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, ESCRIBA EL NOMBRE, LUEGO DETERMINE SI EL SECTOR ES PÚBLICO O PRIVADO Y CIRCULE EL CÓDIGO APROPIADO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	SU DOMICILIO..... 11 SECTOR PÚBLICO HOSPITAL: MINSA..... 21 (PASE A 426D) ← ESSALUD..... 22 FF AA. Y PNP..... 23 CENTRO SALUD MINSA..... 24 PUESTO SALUD MINSA..... 25 (PASE A 426D) ← POLICLÍNICO/CENTRO/ POSTA ESSALUD..... 26 HOSPITAL/ OTRO DE LA MUNICIPALIDAD..... 27 SECTOR PRIVADO CLÍNICA PARTICULAR..... 31 CONSULT. MÉDICO PART..... 32 CASA DE PARTERA..... 33 ORGANISMOS NO GUBERNA- MENTALES CLÍNICA/ POSTA DE ONG..... 41 HOSPITAL/ OTRO DE LA IGLESIA..... 42 OTRO:..... 96 (ESPECIFIQUE)	SU DOMICILIO..... 11 SECTOR PÚBLICO HOSPITAL: MINSA..... 21 (PASE A 426D) ← ESSALUD..... 22 FF AA. Y PNP..... 23 CENTRO SALUD MINSA..... 24 PUESTO SALUD MINSA..... 25 (PASE A 426D) ← POLICLÍNICO/CENTRO/ POSTA ESSALUD..... 26 HOSPITAL/ OTRO DE LA MUNICIPALIDAD..... 27 SECTOR PRIVADO CLÍNICA PARTICULAR..... 31 CONSULT. MÉDICO PART..... 32 CASA DE PARTERA..... 33 ORGANISMOS NO GUBERNA- MENTALES CLÍNICA/ POSTA DE ONG..... 41 HOSPITAL/ OTRO DE LA IGLESIA..... 42 OTRO:..... 96 (ESPECIFIQUE)	SU DOMICILIO..... 11 SECTOR PÚBLICO HOSPITAL: MINSA..... 21 (PASE A 426D) ← ESSALUD..... 22 FF AA. Y PNP..... 23 CENTRO SALUD MINSA..... 24 PUESTO SALUD MINSA..... 25 (PASE A 426D) ← POLICLÍNICO/CENTRO/ POSTA ESSALUD..... 26 HOSPITAL/ OTRO DE LA MUNICIPALIDAD..... 27 SECTOR PRIVADO CLÍNICA PARTICULAR..... 31 CONSULT. MÉDICO PART..... 32 CASA DE PARTERA..... 33 ORGANISMOS NO GUBERNA- MENTALES CLÍNICA/ POSTA DE ONG..... 41 HOSPITAL/ OTRO DE LA IGLESIA..... 42 OTRO:..... 96 (ESPECIFIQUE)	

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

N° de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P426	M3A M3B M3C M3N	REC41
P426A	M15	REC41

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Parto institucional".

Recode m15 (21 thru 27=1)(31 thru 32=1)(41 thru 42=1)(else=2) into Part_estab.
execute.

variable labels Part_estab 'Partos en establecimientos de salud'.

val labels Part_estab 1 "Si" 2 "No".

compute PART_INST=0.

IF (Part_estab=1 AND (M3A=1 | M3B=1 | M3C=1)) PART_INST=1.

IF (Part_estab=2 AND (M3N=0)) PART_INST=0.

EXECUTE.

Var label part_inst "Parto institucional".

Val label part_inst 1 "Si" 0 "No"

NOTA

Ámbito de Control: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

INDICADOR N°28

PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREA PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de nacimientos por cesárea procedentes del área rural de los últimos cinco años anteriores a la encuesta, es decir aquel nacimiento que se realiza a través de una intervención quirúrgica.

JUSTIFICACIÓN

La cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la morbilidad materna y perinatal. Sin embargo, no están demostrados los partos por cesárea para las mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario. Como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y largo plazo que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer y del neonato, así como a cualquier embarazo futuro.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Cesárea:

La variable Cesárea, se construye a partir de la pregunta 426D ((NOMBRE) ¿Nació por operación cesárea?) del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, parto, puerperio y lactancia); respondieron el código 1 "Sí"

Para obtener este indicador se considera a las mujeres del área rural de 15 a 49 años de edad con hijas y/o hijos nacidos vivos en los últimos cinco años, estén o no embarazadas al momento de la entrevista.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005 / 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I30 = \frac{TM_PC}{TM} \times 100$$

Donde:

TM_PC: Total de mujeres del área rural que dieron parto por cesárea en los últimos cinco años.

TM: Total de mujeres del área rural con hijas y/o hijos nacidos vivos en los últimos cinco años.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23, REC0111, REC21, REC41, REC91

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4A: EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA

NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO
	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
426D (NOMBRE) ¿nació por operación cesárea?	SI 1 NO 2 (PASE A 426FB) ←	SI 1 NO 2 (PASE A 426FB) ←	SI 1 NO 2 (PASE A 426FB) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P426A, P426D	M17	REC41

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* Generando la variable "Cesárea".
Compute CESAREA=M17.
var label CESAREA 'Parto por cesárea'.
val label CESAREA 1 'Si' 2 'No'.
exe.
```

```
use all.
compute filter_$=(v025=2).
filter by filter_$.
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programa Presupuestal Salud materno Neonatal

INDICADOR N°29

PORCENTAJE DE NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de nacimientos por cesárea de los últimos cinco años anteriores a la encuesta, es decir aquel nacimiento que se realiza a través de una intervención quirúrgica.

JUSTIFICACIÓN

La cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para prevenir la morbilidad materna y perinatal. Sin embargo, no están demostrados los partos por cesárea para las mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario. Como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto y largo plazo que pueden perdurar por muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer y del neonato, así como a cualquier embarazo futuro.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Cesárea:

La variable Cesárea, se construye a partir de la pregunta 426D ((NOMBRE) ¿Nació por operación cesárea?) del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, parto, puerperio y lactancia); respondieron el código 1 "Sí"

Para obtener este indicador se considera a las mujeres de 15 a 49 años de edad con hijas y/o hijos nacidos vivos en los últimos cinco años, estén o no embarazadas al momento de la entrevista.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005 / 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I30 = \frac{TM_PC}{TM} \times 100$$

Donde:

TM_PC: Total de mujeres que dieron parto por cesárea en los últimos cinco años.

TM: Total de mujeres con hijas y/o hijos nacidos vivos en los últimos cinco años.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Semestral: Nacional, área de residencia, región natural, nivel de educación y quintil de riqueza

Anual: Nacional, área de residencia, región natural, nivel de educación, quintil de riqueza y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23, REC0111, REC21, REC41, REC91

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4A: EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA

NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO	PENÚLTIMO NACIDO VIVO	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO
	NÚMERO DE ORDEN	NÚMERO DE ORDEN	NÚMERO DE ORDEN
	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
426D (NOMBRE) ¿nació por operación cesárea?	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 426FB) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 426FB) ←	SI..... 1 NO..... 2 (PASE A 426FB) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P426A, P426D	M17	REC41

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Cesárea".

```
Compute CESAREA=M17.  
var label CESAREA 'Parto por cesárea'.  
val label CESAREA 1 'Si' 2 'No'.  
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programa Presupuestal Salud materno Neonatal.

INDICADOR N°30

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de niñas o niños nacidos vivos con edad gestacional menor a 37 semanas en los cinco años antes de la encuesta.

JUSTIFICACIÓN

Se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de completarse las 37 semanas de embarazo. Las subcategorías de recién nacidos prematuros basados en la edad gestacional son: extremadamente prematuro (menos de 28 semanas), muy prematuro (de 28 a 32 semanas) y prematuro entre moderado y tardío (de 32 a 37 semanas).

Los niños pueden nacer prematuros debido al trabajo de parto prematuro espontáneo o por indicación médica para planificar la inducción del trabajo de parto o un parto temprano por cesárea.

Se estima que cada año nacen antes de tiempo 15 millones de niños. Esto equivale a más de 1 de cada 10 nacimientos. Cada año fallecen aproximadamente un millón de niños como consecuencia de las complicaciones del nacimiento prematuro. En el Perú 30,000 bebés cada año nacen demasiado pronto. A muchos supervivientes les espera una vida de discapacidad, lo que incluye dificultades de aprendizaje y problemas visuales y auditivos.

A nivel mundial, la prematuridad es la principal causa de defunción en menores de cinco años. Las desigualdades en las tasas de supervivencia en todo el mundo son manifiestas. En los entornos de ingresos bajos, la mitad de los niños nacidos a las 32 semanas o menos de gestación (dos meses antes de término) mueren debido a la falta de medidas de atención viables y costos eficaces, como la aportación de calor, el apoyo a la lactancia materna y la atención básica para tratar infecciones y dificultades respiratorias. En los países de ingresos altos, casi todos esos niños sobreviven. El uso sub óptimo de la tecnología en entornos de ingresos medianos está causando una mayor carga de discapacidad entre los recién nacidos prematuros que sobreviven al período neonatal.

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth>

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación. Por ello las encuestadoras deben siempre de referirse a la información consignada en el calendario para ayudar a la entrevistada a recordar fechas y eventos, además, de asegurarse que cada registro sea consistente con la información registrada anteriormente.

PRECISIONES TÉCNICAS

Prematuro:

La variable prematuro, se construye a partir del Cuestionario Individual, Sección 2 (Reproducción), según instrucción de la pregunta 225 (Por cada nacimiento desde enero de 2009 anote "N" en el mes de nacimiento en la Columna 1 del CALENDARIO y "E" en cada uno de los meses precedentes que duró el embarazo. Escriba el nombre del niño en frente del código "N") los meses de gestación (E) sumado al mes de nacimiento (N) (columna 1 del CALENDARIO), debe ser menor o igual a 8.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista (V007) = 2015, entonces: PESO=HV005X/1 000 000

Si: Año de entrevista (V007) <>2015, entonces: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I30 = \frac{TN<37SG}{TN<5} \times 100$$

Donde:

TN<37SG: Total de mujeres que tuvieron nacimientos con edad gestacional menor a 9 meses en los últimos cinco años.

TN<5: Total de mujeres con hijas y/o hijos nacidos vivos en los últimos cinco años.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://ineiinei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC21, RECH23, REC0111, REC41, REC91

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 2

HISTORIA DE NACIMIENTOS											
211 Ahora me gustaría conversar con usted acerca de todos sus hijas e hijos, estén vivos/os o no, vivan o no con Ud. empezando con el primero que tuvo.											
ANOTE EL NOMBRE DE TODAS LAS HIJAS E HIJOS EN 212: LOS MELLIZOS Y TRILLIZOS ANÓTELOS EN LINEAS SEPARADAS.											
SONDEE PARA DETERMINAR SI LA SEÑORA HA TENIDO MELLIZOS Y TRILLIZOS Y, DE SER EL CASO, CIRCULE 2 EN 213 PARA FUTURA REFERENCIA.											
212	213	214	215	216	217	218	219	220	220A	221	
¿Cuál es el nombre de su (primera), (segunda), (tercera), etc. hija o hijo?	¿El nacimiento de (NOMBRE) fue parto único o múltiple?	¿Es (NOMBRE) hombre o mujer?	¿En qué día, mes y año nació (NOMBRE)? INDAGUE: ¿Cuándo es su cumpleaños?	¿Está vivo (a) (NOMBRE)?	SI ESTA VIVO ¿Cuántos años cumplidos tiene?	SI ESTA VIVO ¿Está viviendo con Ud?	SI ESTA VIVO REGISTRE EL NUMERO DE ORDEN DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR (REGISTRE "00" SI EL NIÑO NO FUE LISTADO)	SI ESTA MUERTO ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? SI "1 AÑO" INDAGUE: En meses ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió? ANOTE: - DÍAS, SI MENOS DE 1 MES - MESES, SI MENOS DE 2 AÑOS - AÑOS SI ES 2 O MÁS AÑOS.	NACIDOS DESDE ENERO DEL 2018 ¿Cuántos meses duró el embarazo de (NOMBRE)?	¿Hubo algún otro nacimiento entre (NOMBRE DEL NACIMIENTO ANTERIOR) y (NOMBRE)? SI: SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS NO: PRÓXIMO NACIMIENTO	
01 (NOMBRE)	ÚNICO... 1 MULT... 2	H..... 1 M..... 2	DÍA MES AÑO	SI..... 1 NO..... 2	EDAD EN AÑOS 220	SI..... 1 NO..... 2	NUMERO PROXIMO NACIMIENTO	DÍAS..... 1 MESES..... 2 AÑOS..... 3			
02 (NOMBRE)	ÚNICO... 1 MULT... 2	H..... 1 M..... 2	DÍA MES AÑO	SI..... 1 NO..... 2	EDAD EN AÑOS 220	SI..... 1 NO..... 2	NUMERO PASE A 221	DÍAS..... 1 MESES..... 2 AÑOS..... 3		SI..... 1 NO..... 2 SONDEE Y COMPLETE LA HISTORIA DE NACIMIENTOS PRÓXIMO NACIMIENTO	

INSTRUCCIONES GENERALES		1	2	3	4
- EN CADA CASILLA SÓLO DEBE APARECER UN CÓDIGO.					
- LAS COLUMNAS 1 Y 4, DEBEN LLENARSE COMPLETAMENTE.					
INFORMACIÓN A SER CODIFICADA EN CADA COLUMNA.					
COL. 1: Nacimientos, Embarazos, Pérdidas y Uso de Anticonceptivos					
N	NACIMIENTOS				
E	EMBARAZOS				
T	TERMINACIONES				
0	NINGÚN MÉTODO				
1	ESTERILIZACIÓN FEMENINA				
2	ESTERILIZACIÓN MASCULINA				
3	PÍLDORAS				
4	DIU				
5	INYECCIONES				
6	IMPLANTES				
7	CONDÓN				
8	CONDÓN FEMENINO				
9	ESPUMA/JALEA/OVULOS (VAGINALES)				
J	AMENORREA POR LACTANCIA (MELA)				
K	ABSTINENCIA PERIÓDICA				
L	RETIRO				
M	ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA				
X	OTRO: _____				
	(ESPECIFIQUE)				
COL. 2: Discontinuidad de Uso de Anticonceptivos					
1	QUEDÓ EMBARAZADA MIENTRAS LO USABA				
2	DESEABA QUEDAR EMBARAZADA				
3	MARIDO DESAPROBO				
4	EFFECTOS COLATERALES				
5	MOTIVOS DE SALUD				
6	ACCESO/DISPONIBILIDAD				
7	DESEABA MÉTODO MÁS EFECTIVO				
8	USO INCONVENIENTE				
9	SEXO POCO FRECUENTE/MARIDO AUSENTE				
C	COSTO				
F	FATALISTA				
A	DIFÍCIL QUEDAR EMBARAZADA/MENOPAUSIA				
D	DISOLUCIÓN MARITAL/SEPARACIÓN				
X	OTRO: _____				
	(ESPECIFIQUE)				
Z	NO SABE				
COL. 3: Fuente de Anticoncepción					
1	HOSPITAL MINSA				
2	CENTRO DE SALUD MINSA				
3	PUESTO DE SALUD MINSA				
4	PROMOTOR DE SALUD MINSA				
5	HOSPITAL DE ESSALUD				
6	POLICLÍNICO/ CENTRO/ POSTA ESSALUD				
7	HOSPITAL /OTRO DE LAS FFAA Y PNP				
8	HOSPITAL /OTRO DE LA MUNICIPALIDAD				
A	OTRO GOBIERNO _____				
	(ESPECIFIQUE)				
B	CLÍNICA PARTICULAR				
C	FARMACIA / BOTICA				
D	CONSULTORIO MÉDICO PARTICULAR				
E	OTRO SECTOR PRIVADO _____				
	(ESPECIFIQUE)				
F	CLÍNICA/POSTA DE ONG				
G	PROMOTORES DE ONG				
H	HOSPITAL /OTRO DE LA IGLESIA				
I	TIENDA / SUPERMERCADO / HOSTAL				
J	AMIGOS / PARIENTES				
K	NADIE/SE AUTORECETO				
X	OTRO: _____				
	(ESPECIFIQUE)				
COL. 4: Matrimonio / Unión					
X	EN UNIÓN (CASADA O CONVIVIENTE)				
0	NO EN UNIÓN				

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
Calendario	Q220A	REC21

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* nacimiento prematuro".

do if QULT5=1.

recode q220a (5 thru 8=1)(9,10=0) into emb36sem .

end if.

execute.

do if (v007<2017).

compute edadm=v008-b3.

else if (v007>=2017).

compute edadm=bedad.

end if.

NOTA

Ámbito de control: Programa Salud Materno Neonatal.

INDICADOR N°31

PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS EN UNIÓN CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

DEFINICIÓN

Porcentaje de mujeres actualmente unidas que desean limitar o espaciar sus familias y no están usando método anticonceptivo alguno.

JUSTIFICACIÓN

Este indicador muestra la población donde se puede focalizar los servicios de consejería y planificación familiar para cubrir necesidades de espaciar o limitar embarazos

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación. Asimismo, depende mucho de la habilidad de las Encuestadoras para relacionar (consistenciar) correctamente las preguntas, dentro del desarrollo de la entrevista.

PRECISIONES TÉCNICAS

En el cálculo de la necesidad no satisfecha de planificación familiar, se excluyen las siguientes categorías de mujeres: 1. Mujeres que no están actualmente en unión. 2. Mujeres que están practicando la planificación familiar. 3. Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas que estaban empleando alguna forma de anticoncepción cuando quedaron embarazadas. 4. Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo fue deseado. 5. Mujeres infértiles, es decir, aquellas sin hijas y/o hijos nacidos vivos en los últimos cinco años a pesar de haber estado en unión y no haber usado anticoncepción. 6. Mujeres fértiles que desean una hija o un hijo en los próximos dos años.

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$\text{Necesidad Insatisfecha} = \frac{LS}{TM_{15-49}} * 100$$

Donde:

LS: Mujeres unidas no usuarias de métodos con necesidad insatisfecha de métodos para espaciar embarazos y mujeres no usuarias de métodos con necesidad de métodos para limitar embarazos

TM₁₅₋₄₉: Total de mujeres de 15 a 49 unidas.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual:

Nacional

Área de residencia

Región natural (Costa, Sierra y Selva).

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC0111, RE516171

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 2. REPRODUCCIÓN

PREG.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
226	¿Está usted actualmente embarazada?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE / NO ESTA SEGURA..... 8	→ 229B

SECCIÓN 3. ANTICONCEPCIÓN

310	¿Actualmente están Ud. o su pareja haciendo algo o usando algún método para postergar o evitar quedar embarazada?	SI..... 1 NO..... 2	→ 319
-----	---	------------------------	-------

SECCIÓN 4A. EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA

428	¿Le ha vuelto la regla después del nacimiento de (NOMBRE)?	SI..... 1 (PASE A 428B) ← NO..... 2 (PASE A 428C) ←
-----	--	--

SECCIÓN 6. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD

PREG.	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	PASE A
601	VERIFIQUE 311: NINGUNO ESTERILIZADO O NO SE PREGUNTÓ ☐ ÉL O ELLA ESTERILIZADOS ☐		→ 614
602	VERIFIQUE 226: NO EMBARAZADA O INSEGURA ☐ 226=2, 8 EMBARAZADA ☐ 226=1		
	Ahora tengo algunas preguntas acerca del futuro. ¿Le gustaría tener un (otro) hijo o preferiría no tener ningún (más) hijo(s)?	Ahora tengo algunas preguntas acerca del futuro. Después del nacimiento del hijo que está esperando ¿Le gustaría tener otro hijo o preferiría no tener más hijos?	
		TENER (UN / OTRO) HIJO..... 1 NO MÁS / NINGUNO..... 2 NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA..... 3 INDECISANO SABE/ INSEGURA PARA NO EMBARAZADAS..... 4 PARA EMBARAZADAS..... 5	→ 604 → 614 → 608 → 610
603	VERIFIQUE CASILLAS EN 602 : NO EMBARAZADA O INSEGURA ☐ EMBARAZADA ☐		
	¿Cuánto tiempo le gustaría esperar desde ahora hasta antes del nacimiento de un (otro) hijo?	¿Después del nacimiento del hijo que está esperando ¿Cuánto tiempo le gustaría esperar hasta antes del nacimiento de otro hijo?	
	REGISTRE: EN MESES: SI ES < DE 2 AÑOS EN AÑOS: SI ES DE 2 O MÁS AÑOS	MESES (SI ES < DE 2 AÑOS)..... 1 AÑOS (SI ES DE 2 O MÁS AÑOS)..... 2 PRONTO / AHORA..... 993 NO PUEDE QUEDAR EMBARAZADA..... 994 DESPUÉS DEL MATRIMONIO..... 995 OTRA:..... 996 (ESPECIFIQUE) NO SABE..... 998	→ 609 → 614 → 609

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Cuestionario	Base de datos
P501	V501	Cuestionario Individual	RE516171
P226, P310, P428, P602 y P603	V626	Cuestionario Individual	RE517171

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

```
* GENERANDO LA VARIABLE "DEMANDA INSATISFECHA".
*****
RECODE V501 (1,2=1)(0,3,4,5=2) INTO UNIDAS.
VAL LABEL UNIDAS 1'SI' 2'NO'.
DO IF UNIDAS=1.
  recode v626 (1,2=1)(0,3,4,5,6,7,8,9=0) into neces_Ins.
END IF.
var label neces_ins 'necesidad insatisfecha'.
val label neces_Ins 1 'si' 0 'no'.
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal

INDICADOR N°32

PORCENTAJE DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIÓ SU PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de gestante que en último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibió su primer control prenatal en el 1er trimestre de gestación.

JUSTIFICACIÓN

Este indicador es una medida del potencial del sistema de salud para proveer el acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutive. Es parte de unas intervenciones preventivas para reducir la mortalidad neonatal, infantil y perinatal.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Mes del primer control prenatal:

La variable se construye a partir de las preguntas del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, parto, puerperio y lactancia):

- 1) Pregunta 409: ¿Cuántos meses de embarazo tenía Ud. cuando se hizo su primer control prenatal?
- 2) Pregunta 410: ¿Cuántos controles prenatales tuvo Ud. durante el embarazo de (NOMBRE)?

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I32 = \frac{TM_CPN_1trim}{TM} * 100$$

Donde:

TM_CPN_1trim: Total de mujeres que se realizaron su primer control prenatal en el primer trimestre de gestación del último nacido vivo en los últimos cinco años.

TM: Total de mujeres que tuvieron nacimiento vivo en los últimos cinco años.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC0111, REC21, REC91, REC41

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4A. EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA

CUESTIONARIO ADICIONAL	
401	VERIFIQUE 215: UNO O MÁS NACIMIENTOS DESDE ENERO DEL 2015 ☐ ALGÚN NACIMIENTO ANTES DE ENERO DEL 2015 Y SEA MENOR DE 6 AÑOS ☐ → PASE A TRAMO 6A NINGÚN NACIDO MENOR DE 6 AÑOS ☐ → PASE A 480A
409	¿Cuántos meses de embarazo tenía Ud. cuando se hizo su primer control prenatal? MESES..... NO SABE..... 98
410	¿Cuántos controles prenatales tuvo Ud. durante el embarazo de (NOMBRE)? N° DE CONTROLES..... NO SABE..... 98

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P409	M13	REC41
P410	M14	REC41

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Momento del primero control prenatal".Recode

m13 (0, 1, 2, 3 =1)(4 thru 9=2) into CPN_1trim.

if (m14=0) CPN_1trim =3.

if (m13=98 | (missing(m13) & not(sysmis(m13)))) CPN_1trim=8.recode
CPN_1trim (2,3,8=0) (1=1) .

val label CPN_1trim 1 'CPN en el 1er trimestre' 0 'otro mes, Sin CPN, no sabe /sin informacion' .exe.

NOTA

Ámbito de control: Programa Salud Materno Neonatal.

INDICADOR N°33

PORCENTAJE DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MÁS CONTROLES PRENATALES

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de gestantes que en último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibió 6 o más controles prenatales

JUSTIFICACIÓN

Este indicador es una medida del potencial del sistema de salud para proveer el acceso de gestantes a servicios de atención prenatal de calidad y de las complicaciones según capacidad resolutive. Es parte de unas intervenciones preventivas para reducir la mortalidad neonatal, infantil y perinatal.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación o conocimiento.

PRECISIONES TÉCNICAS

Visitas prenatales por embarazo:

La variable se construye a partir de la pregunta del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, parto, puerperio y lactancia):

- 1) Pregunta 410: ¿Cuántos controles prenatales tuvo Ud. durante el embarazo de (NOMBRE)?

Para el cálculo del indicador se considera las mujeres de 15 a 49 años de edad.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I33 = \frac{TM_NCPN}{TM} \times 100$$

Donde:

TM_NCPN: Total de mujeres que se realizaron al menos 6 controles prenatales del último nacido vivo en los últimos cinco años.

TM: Total de mujeres que tuvieron nacimiento vivo en los últimos cinco años.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

REC0111, REC21, REC91, REC41

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4A. EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA

CUESTIONARIO ADICIONAL	
401	VERIFIQUE 215: UNO O MÁS NACIMIENTOS DESDE ENERO DEL 2015 ☐ ALGÚN NACIMIENTO ANTES DE ENERO DEL 2015 Y SEA MENOR DE 6 AÑOS ☐ → PASE A TRAMO 6A NINGÚN NACIDO MENOR DE 6 AÑOS ☐ → PASE A 480A
410	¿Cuántos controles prenatales tuvo Ud. durante el embarazo de (NOMBRE)? Nº DE CONTROLES..... NO SABE..... 98

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P410	M14	REC41

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Visitas prenatales por embarazo".

Recode m14 (0 thru 5 =2) (6 thru 50=1) into N_CPN.

If (m14=98 | (missing(m14) & not(sysmis(m14)))) N_CPN=8.

If (m14=0) N_CPN=3

recode N_CPN (2,3,8=0).

val label N_CPN 1 '6 o más veces' 0 'menos de 6, Sin CPN, no sabe /sin información'.

NOTA

Ámbito de control: Programa Salud Materno Neonatal.

INDICADOR N°34

PORCENTAJE DE GESTANTES QUE CONSUMIERON SUPLEMO DE HIERRO EN ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de mujeres que en la gestación de su última hija/hijo nacido vivo en los cinco años anteriores a la encuesta consumieron hierro en pastilla, o jarabe.

JUSTIFICACIÓN

La suplementación es una intervención que tiene como objetivo asegurar el suministro adecuado a las gestantes y puerperas de hierro, para disminuir la prevalencia de anemia y otras complicaciones.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa, por problemas de recordación.

PRECISIONES TÉCNICAS

Hierro en gestantes:

La variable Hierro, se construye a partir de la pregunta 421 (Durante el embarazo de (NOMBRE), ¿Tomó hierro en pastilla, en jarabe o lo recibió en inyección) del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, parto, puerperio y lactancia); respondieron el código 1 (Sí) y tuvo control Prenatal es decir en la pregunta 409 (¿Cuántos meses de embarazo tenía Ud. cuando se hizo su primer control prenatal?); respondieron entre 0 y 9 meses o 98 (No sabe)

Para obtener este indicador se considera a las mujeres de 15 a 49 años de edad, con hijas y/o hijos nacidos vivos en los últimos cinco años, estén o no embarazadas al momento de la entrevista.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005 /1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I21 = \frac{TM_HG}{TM} \times 100$$

Donde:

TM_HG: Total de mujeres de 15 a 49 años que en la gestación de su última hija/hijo nacido vivo en los cinco años anteriores a la encuesta consumieron hierro.

TM: Total de mujeres de 15 a 49 años con hija/hijo nacido vivo en los cinco años anteriores a la encuesta

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:

RECH23, REC0111, REC223132, REC91, REC41

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 4A. EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA		
403	VEA EN 212 EL NÚMERO DE ORDEN DE LOS NACIDOS DESDE ENERO DEL 2014 Y ANÓTELO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE.	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN
409	¿Cuántos meses de embarazo tenía Ud. cuando se hizo su primer control prenatal?	MESES..... NO SABE..... 98
421	Durante el embarazo de (NOMBRE), ¿tomó hierro en pastilla, en jarabe o lo recibió en inyección?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE..... 8 (PASE A 422A) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

N° de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P409	M13	REC41
P420	M45	REC41

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Generando la variable "Hierro en gestantes".

```
recode m13 (0 thru 98=0) into hierro_emb.  
if (m45=1 & hierro_emb=0) hierro_emb=1.  
variable labels hierro_emb 'Gestantes que consumieron hierro'.  
val label hierro_emb 1 'Si' 0 'No'.  
exe.
```

NOTA

Ámbito de control: Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal.

INDICADOR N°35

PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD / OFICINA REGISTRAL DEL RENIEC

DEFINICIÓN

Porcentaje de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad que no están inscritos en la Municipalidad/Oficina Registral del RENIEC

JUSTIFICACIÓN

Una niña o niño que no es registrado y no cuenta con un acta de nacimiento, no tiene identidad legal. Esto limita sus posibilidades de acceder a otros derechos a lo largo de su vida, como son el derecho a la protección, a la educación y a la salud, impidiendo su inclusión en la vida económica, política y cultural del país. El no tener un registro y un acta de nacimiento se convierte así en un factor de exclusión y discriminación.

No registrar el nacimiento de una niña o niño lo hace estadísticamente invisible en muchos aspectos de la medición de su desarrollo. El derecho a la identidad constituye un derecho humano y como tal es de carácter universal, inalienable, intransferible e irrenunciable. Garantiza que niñas y niños tengan un nombre, nacionalidad, relaciones familiares y cuenten con registros legales establecidos. Lo cual está reconocido en tratados internacionales y en nuestras propias leyes. Además, constituye el acceso a otros derechos como salud, educación y protección. Al conferir reconocimiento legal por parte del Estado, se genera un vínculo formal por el cual este queda obligado a protegerlos ante cualquier acción u omisión que amenace sus derechos y, por otra parte, genera obligaciones a las ciudadanas y los ciudadanos como miembros integrantes de la sociedad.

En nuestro país a través de la RENIEC se ha alcanzado altas tasas de documentación, gracias al trabajo articulado con diversos sectores. La RENIEC pone énfasis en los niños, niñas y adolescentes indocumentados, pues ellos enfrentan problemas de distinto tipo –por lo general, relacionados con su nombre o apellido– y dificultades para acceder a servicios públicos como salud y educación. Dicha institución manifiesta que, a nivel nacional, el 1.1% de menores de edad carece de DNI, pero en la selva este porcentaje sube a 2.9%. Para disminuir la indocumentación infantil, el RENIEC ejecuta distintas estrategias, que van desde atención en establecimientos de salud, hasta el trabajo coordinado con municipios, instituciones educativas y albergues para menores de edad.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

La principal limitación del indicador es que la información recogida se basa en la declaración de las informantes, por lo cual, puede no ser una medición muy precisa si la madre no muestra la partida de nacimiento y/o DNI de su hijo(a).

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las niñas y niños de 6 a 59 meses de edad

La variable del indicador, se construye a partir de la pregunta 430C del Cuestionario Individual, Sección 4A (Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia):

- 1) Pregunta 430C ¿El nacimiento de (NOMBRE) fue inscrito en la Municipalidad/Oficina Registral de RENIEC?, respondieron el código 3 (No)

Edad en meses:

La edad en meses de la niña o niño se obtiene mediante:

Si: Año de entrevista (V007) <2017, entonces: edad= fecha de entrevista (V008)-fecha de nacimiento (B3).
Si: Año de entrevista (V007) >=2017, la edad en meses ya está calculada: BEDAD.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO=V005/1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$I35 = \frac{TN_MR}{TN} \times 100$$

Donde:

TN_MR: Total de niñas(os) de 6 a 59 meses que no fue inscrito en la Municipalidad/RENIEC

TN: Total de niñas(os) de 6 a 59 meses

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia y región natural

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos: REC94, REC0111, REC21, REC91

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

CUESTIONARIO INDIVIDUAL SECCIÓN 4A. EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA

NÚMERO DE ORDEN DE LA PREGUNTA 212	ÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	PENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE	ANTEPENÚLTIMO NACIDO VIVO NÚMERO DE ORDEN NOMBRE
430C ¿El nacimiento de (NOMBRE) fué inscrito en la Municipalidad / Oficina Registral de RENIEC? SI RESPONDE "SI" SOLICITE PARTIDA DE NACIMIENTO Y/O DNI	SI, muestra Partida Nac. / DNI..... 1 SI, no muestra Partida Nac. / DNI..... 2 NO 3 NO SABE 8 (PASE A 431) ←	SI, muestra Partida Nac. / DNI..... 1 SI, no muestra Partida Nac. / DNI..... 2 NO 3 NO SABE 8 (PASE A 432) ←	SI, muestra Partida Nac. / DNI..... 1 SI, no muestra Partida Nac. / DNI..... 2 NO 3 NO SABE 8 (PASE A 432) ←

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
Fecha de entrevista	V008	REC0111
Fecha de nacimiento del niño(a)	B3	REC21
Edad de la madre	V012	REC0111
P430C	S430C	REC94

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

*Generamos la variable EDADM.

* COMPUTE EDADM=V008-B3.

do if (v007<2017).

 compute edadm=v008-b3.

else if (v007>=2017).

 compute edadm=edad.

end if.

* edad por tramos.

recode edadm (6 thru 59=1) INTO EDAD_6A59.

EXECUTE.

* Generando la variable "Menores que no están inscritos en la Municipalidad/ RENIEC".

do if EDAD_6A59=1.

 recode s430C (0=1) (1,2,8=0) into dni.

end if.

val lab dni 1 'no tiene'.

exe.

SALIDA DE LOS CUADROS .

USE ALL.

COMPUTE filter_\$=(V012 >= 15 & V012 <= 49).

VARIABLE LABELS filter_\$ 'V012 >= 15 & V012 <= 49 (FILTER)'.

VALUE LABELS filter_\$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.

FORMATS filter_\$ (f1.0).

FILTER BY filter_\$.

EXECUTE.

Donde:

- S430C=0 es el equivalente a la categoría 3 de la pregunta 430 del Cuestionario Individual (P430C =3 "No").
- En el denominador, se considera a los niños(as) de las madres de 15 a 49 años de edad

NOTA

Ámbito de Control: Programa Presupuestal Acceso de la Población a la Identidad (0079)

INDICADOR N°36

PROPORCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de mujeres que sufrieron violencia psicológica, física y/o sexual.

JUSTIFICACIÓN

La violencia familiar está constituida por todos los actos de agresión que se producen en el seno de un hogar, incluye tanto la violencia contra la mujer como el maltrato infantil y la violencia contra el hombre.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Se prioriza la entrevista presencial debido a lo sensible de la temática y metodología.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las mujeres de 15 a 49 años de edad. Como numerador al total de mujeres unidas (convivientes o casadas) o alguna vez unidas (separadas o divorciadas) de 15 a 49 años de edad, que sufrieron violencia psicológica, física y/o sexual alguna vez. Asimismo, como denominador al total de mujeres unidas (convivientes o casadas) de 15 a 49 años.

Violencia psicológica: mujeres que sufrieron violencia psicológica, es decir, que en el cuestionario individual sección 10 (Violencia doméstica), pregunta 1003 respondieron el código 1 (Si) en algunas de las alternativas a,b,c,d,e,f o en pregunta 1004 respondieron el código 1 (Si) en algunas de las alternativas a,b,c.

Violencia física: mujeres que sufrieron violencia física, es decir, que en el cuestionario individual sección 10 (Violencia doméstica), pregunta 1005 respondieron el código 1 (Si) en algunas de las alternativas a,b,c,d,e,f,g

Violencia sexual: mujeres que sufrieron violencia sexual, es decir, que en el cuestionario individual sección 10 (Violencia doméstica), pregunta 1005 respondieron el código 1 (Si) en algunas de las alternativas h,i.

El factor para realizar las estimaciones es: PESO= V005V/ 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$TMV = \frac{TMV}{TM} \times 100$$

Donde:

TMV: Mujeres que sufrieron violencia psicológica, física y/o sexual.

TM: Mujeres de 15 a 49 años de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural y departamento.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>

Datos:
RECH23, REC0111, RE516171, RE223132, REC91, REC58081.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 10. VIOLENCIA DOMÉSTICA

Violencia psicológica

1003	Ahora voy a preguntarle sobre situaciones por las que pasan algunas mujeres. Por favor dígame si las siguientes frases se aplican a la relación con su (último) esposo (compañero):			
A	¿Su esposo (compañero) se pone (ponía) celoso o molesto si usted conversa (conversaba) con otro hombre?	SI 1 NO 2 NO SABE 8	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
B	¿El la acusa (acusaba) frecuentemente de ser infiel?	SI 1 NO 2 NO SABE 8	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
C	¿El le impide (impedía) que visite o la visiten sus amistades?	SI 1 NO 2 NO SABE 8	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
D	¿El trata (trataba) de limitar las visitas/contactos a su familia?	SI 1 NO 2 NO SABE 8	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
E	¿El insiste (insistía) siempre en saber todos los lugares donde usted va (iba)?	SI 1 NO 2 NO SABE 8	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
F	¿El desconfía (desconfiaba) de usted con el dinero?	SI 1 NO 2 NO SABE 8	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
1004	Ahora, si usted me permite, necesito hacerle algunas preguntas sobre la relación de pareja con su (último) esposo (compañero). Su (último) esposo (compañero) alguna vez:			
A	¿Le ha dicho o le ha hecho cosas para humillarla delante de los demás?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
B	¿La ha amenazado con hacerle daño a usted o a alguien cercano a usted?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
C	¿La ha amenazado con irse de la casa, quitarle a las hijas e hijos o la ayuda económica?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3

Violencia física

PREG.	PREGUNTAS Y FILTROS		CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	
1005	Su (último) esposo (compañero) alguna vez:			
A	¿La empujó, sacudió o le tiró algo?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
B	¿La abofeteó o le retorció el brazo?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
C	¿La golpeó con el puño o con algo que pudo hacerle daño?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
D	¿La ha pateado o arrastrado?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
E	¿Trató de estrangularla o quemarla?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
F	¿La atacó/agredió con un cuchillo, pistola u otro tipo de arma?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
G	¿La amenazó con un cuchillo, pistola u otro tipo de arma?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3

Violencia sexual

PREG.	PREGUNTAS Y FILTROS		CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	
1005	Su (último) esposo (compañero) alguna vez:			
H	¿Ha utilizado la fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales aunque usted no quería?	SI 1 NO 2	→ ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
I	¿La obligó a realizar actos sexuales que usted no aprueba?	SI 1 NO 2	→ ¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P1003	P1003A P1003B P1003C P1003D P1003E P1003F	REC84DV
P1004	P1003A P1003B P1003C	
P1005	P1003A P1003B P1003C P1003D P1003E P1003F P1003G P1003H P1003I	

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

* Violencia psicológica y/o verbal

recode d101a (1=1) (else=0) into r101a.

recode d101b (1=1) (else=0) into r101b.

recode d101c (1=1) (else=0) into r101c.

recode d101d (1=1) (else=0) into r101d.

recode d101e (1=1) (else=0) into r101e.

recode d101f (1=1) (else=0) into r101f.

recode d103a (1,2,3=1) (else=0) into r103a.

recode d103b (1,2,3=1) (else=0) into r103b.

recode d103d (1,2,3=1) (else=0) into r103d.

variable labels r101a 'Es celoso o molesto'.

variable labels r101b 'Acusa de ser infiel'.

variable labels r101c 'Impide que visite o la visiten sus amistades/familia'.

variable labels r101e 'Insiste en saber donde va'.

```
variable labels r101f 'Desconfía con el dinero'.
variable labels r103a 'Situaciones humillantes'.
variable labels r103b 'Amenaza con hacerle daño'.
variable labels r103d 'Amenaza con irse de la casa/quitarle los hijos o la ayuda económica'.
```

```
compute viopsico=0.
if any(1, r101a to r103d) viopsico=1.
variable labels viopsico "Violencia psicológica".
value labels r101a to viopsico 1 "Si" 0 "No".
```

* Violencia física.

```
recode d105a (1,2,3,4=1)(else=0) into r105a.
recode d105b (1,2,3,4=1)(else=0) into r105b.
recode d105c (1,2,3,4=1)(else=0) into r105c.
recode d105d (1,2,3,4=1)(else=0) into r105d.
recode d105e (1,2,3,4=1)(else=0) into r105e.
recode d105f (1,2,3,4=1)(else=0) into r105f.
recode d105g (1,2,3,4=1)(else=0) into r105g.
variable labels r105a 'Empujo sacudio tiro algo'.
variable labels r105b 'Abofeteo o retorció el brazo'.
variable labels r105c 'Golpeo con el puño o algo que pudo dañarla'.
variable labels r105d 'Pate? o arrastro?'.
variable labels r105e 'Trato de estrangularla o quemarla'.
variable labels r105f 'Amenazo con cuchillo pistola u otra arma'.
variable labels r105g 'Ataco, agredio con cuchillo pistola u otra arma'.
```

```
compute viofisica=0.
if any( 1,r105a to r105g ) viofisica=1.
variable labels viofisica "Violencia física".
value labels r105a to viofisica 1 "Si" 0 "No".
```

* Violencia sexual.

```
recode d105h (1,2,3,4=1)(else=0) into r105h.
recode d105i (1,2,3,4=1)(else=0) into r105i.
variable labels r105h 'Obligo a tener relaciones aunque ella no quería'.
variable labels r105i 'Obligo a realizar actos sexuales que ella no aprueba'.
```

```
compute viosexual=0.
if any (1, r105h to r105i ) viosexual=1.
variable labels viosexual "Violencia sexual".
value labels r105h to viosexual 1 "Si" 0 "No".
```

* variable violencia.

```
compute violencia=0.
if ( viopsico=1 or viofisica=1 or viosexual=1) violencia=1.
value labels violencia 1 "Si" 0 "No".
```

```
COMPUTE filter_$=( baseviolencia=1 AND V012>=15 AND V012<=49).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
```

NOTA

Ámbito de control: Programa Violencia contra la mujer.

INDICADOR N°37

PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SUFRIERON VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL EJERCIDA POR EL ESPOSO O COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

DEFINICIÓN

Es el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que sufrieron violencia, física y/o sexual.

JUSTIFICACIÓN

La violencia familiar está constituida por todos los actos de agresión que se producen en el seno de un hogar, incluye tanto la violencia contra la mujer como el maltrato infantil y la violencia contra el hombre.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Se prioriza la entrevista presencial debido a lo sensible de la temática y metodología. En el cuestionario individual, dirigido a las mujeres de 15 a 49 años edad, la sección 10: violencia doméstica es respondida por aquella mujer seleccionada. Esta sección se realiza dentro de un clima de privacidad el cual es requerido debido a que las preguntas son muy sensibles e íntimas.

PRECISIONES TÉCNICAS

Para el cálculo del indicador se considera a las mujeres de 15 a 49 años de edad. Como numerador al total de mujeres unidas (convivientes o casadas) o alguna vez unidas (separadas o divorciadas) de 15 a 49 años de edad, que sufrieron violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses. Asimismo, como denominador al total de mujeres unidas (convivientes o casadas) o alguna vez unidas (separadas o divorciadas) de 15 a 49 años.

Violencia física: mujeres que sufrieron violencia física en los últimos 12 meses, es decir, que en el cuestionario individual sección 10 (Violencia doméstica), pregunta 1005 respondieron el código 1 (Mucha frecuencia) o 2 (Algunas veces) en algunas de las alternativas a, b, c, d, e, f, g.

Violencia sexual: mujeres que sufrieron violencia sexual, es decir, que en el cuestionario individual sección 10 (Violencia doméstica), pregunta 1005 respondieron el código 1 (Mucha frecuencia) o 2 (Algunas veces) en algunas de las alternativas h, i.

El factor para realizar las estimaciones es:

Si: Año de entrevista es 2020, entonces: PESO = V005V/ 1 000 000

Si: Año de entrevista es distinto al 2020, entonces: PESO= V005/ 1 000 000

MÉTODO DE CÁLCULO

El cálculo del indicador queda establecido por la siguiente fórmula:

$$PMV = \frac{TMV}{TM} \times 100$$

Donde:

TMV: Mujeres de 15 a 49 años de edad que sufrieron violencia física y/o sexual.

TM: Mujeres de 15 a 49 años de edad.

PERIODICIDAD DE MEDICIÓN

Anual: Nacional, área de residencia, región natural.

FUENTE DE DATOS

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES

BASE DE DATOS

Página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática: <http://inei.inei.gob.pe/microdatos/>


Datos:

REC84DV, REC0111, REC91, RE516171

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para el cálculo del indicador se tomarán en consideración las siguientes preguntas de la ENDES:

SECCIÓN 10. VIOLENCIA DOMÉSTICA



Violencia física

PREG.	PREGUNTAS Y FILTROS		CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	
1005	Su (último) esposo (compañero) alguna vez:			
A	¿La empujó, sacudió o le tiró algo?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
B	¿La abofeteó o le retorció el brazo?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
C	¿La golpeó con el puño o con algo que pudo hacerle daño?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
D	¿La ha pateado o arrastrado?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
E	¿Trató de estrangularla o quemarla?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
F	¿La atacó/agredió con un cuchillo, pistola u otro tipo de arma?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
G	¿La amenazó con un cuchillo, pistola u otro tipo de arma?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3

Violencia sexual

PREG.	PREGUNTAS Y FILTROS		CATEGORÍAS Y CÓDIGOS	
1005	Su (último) esposo (compañero) alguna vez:			
H	¿Ha utilizado la fuerza física para obligarla a tener relaciones sexuales aunque usted no quería?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3
I	¿La obligó a realizar actos sexuales que usted no aprueba?	SI 1 NO 2	¿En los últimos 12 meses, esto sucedió con mucha frecuencia, algunas veces o nunca?	MUCHA FRECUENCIA 1 ALGUNAS VECES 2 NUNCA 3

Equivalencias de las preguntas del cuestionario y a las bases de datos:

Nº de pregunta en el cuestionario	Nombre de las variables en la base de datos	Base de datos
P1005	P1005A P1005B P1005C P1005D P1005E P1005F P1005G	REC84DV
	P1005H P1005I	

SINTAXIS

Programa empleado: SPSS

***Violencia física**

```
recode d105a (1,2=1)(else=0) into t105a.  
recode d105b (1,2=1)(else=0) into t105b.  
recode d105c (1,2=1)(else=0) into t105c.  
recode d105d (1,2=1)(else=0) into t105d.  
recode d105e (1,2=1)(else=0) into t105e.  
recode d105f (1,2=1)(else=0) into t105f.  
recode d105g (1,2=1)(else=0) into t105g.
```

```
variable labels t105a 'Empujo sacudió tiró algo'.  
variable labels t105b 'Abofeteo o retorció el brazo'.  
variable labels t105c 'Golpeó con puño o algo que pudo dañarla'.  
variable labels t105d 'Pateó o arrastró'.  
variable labels t105e 'Trató de estrangularla o quemarla'.  
variable labels t105f 'Amenazó con cuchillo pistola u otra arma'.  
variable labels t105g 'Atacó, agredió con cuchillo pistola u otra arma'.
```

```
compute viofisica12=0.  
if any( 1,T105a to T105g ) viofisica12=1.  
variable labels viofisica12 "Violencia física".  
value labels T105a to viofisica12  
1 "Si"  
0 "No".
```

*** Violencia sexual.**

```
recode d105h (1,2=1) (else=0) into t105h.  
recode d105i (1,2=1) (else=0) into t105i.  
variable labels t105h 'Obligó a tener relaciones, aunque ella no quería'.  
variable labels t105i 'Obligó a realizar actos sexuales que ella no aprueba'.
```

```
compute viosexual12=0.  
if any (1, T105h to T105i) viosexual12=1.  
variable labels viosexual12 "Violencia sexual".  
value labels T105h to viosexual12  
1 "Si" 0 "No".
```

*** variable violencia física y/o sexual.**

```
compute violenciaFS12=0.  
if (viofisica12=1 or viosexual12=1) violenciaFS12=1.  
value labels violenciaFS12  
1 "Si" 0 "No".
```

```
variable labels violenciaFS12 "Violencia física y/o sexual".  
value labels violenciaFS12  
1 'Si' 0 'No'.
```

NOTA

Ámbito de control: Programa Violencia contra la mujer

