

## 1. Regressão Linear Univariada

- Carregue os dados contidos no arquivo ex1data2.txt.

O arquivo contém 97 linhas e 2 colunas de dados. Cada coluna se refere a uma variável. Neste problema, deve-se desenvolver um modelo onde a variável da coluna 2 será estimada a partir da variável da coluna 1.

**Apresentar:** Figura com os dados

**Comentários:** Um modelo de regressão linear parece ser adequado para os dados em questão? Comente.

- Implemente o algoritmo do gradiente descendente estocástico para encontrar os coeficientes da regressão.

Para este algoritmo utilize  $\alpha = 0.001$  e utilize 1000 épocas de treinamento. Para cada época de treinamento, calcule o erro quadrático médio (EQM). Plote o gráfico “épocas x EQM”

**Apresentar:** Valor final dos coeficientes e gráfico épocas x EQM.

**Comentários:** Através do gráfico “épocas x EQM” é possível verificar que o algoritmo está “aprendendo”? Comente.

## 2. Regressão Linear Múltipla

- Carregue os dados contidos no arquivo ex1data2.txt.

O arquivo contém 47 linhas e 3 colunas de dados. Cada coluna se refere a uma variável. Neste problema, deve-se desenvolver um modelo onde a variável da coluna 3 será estimada a partir das variáveis das colunas 1 e 2. Os dados apresentados referem-se a um problema de estimação do preço de casas. As variáveis 1 e 2 são a área da casa e o número de quartos, respectivamente. A variável 3 é o preço do imóvel.

- Implemente o algoritmo do gradiente descendente estocástico para encontrar os coeficientes da regressão.

Para este algoritmo utilize  $\alpha = 0.01$  e utilize 100 épocas de treinamento. Para cada época de treinamento, calcule o erro quadrático médio (EQM). Plote o gráfico “épocas x EQM”

**Apresentar:** Valor final dos coeficientes e gráfico épocas x EQM.

**Comentários:** Através do gráfico “épocas x EQM” é possível verificar que o algoritmo está “aprendendo”? Comente.

- Encontre os coeficientes da regressão utilizando o método dos mínimos quadrados.

**Apresentar:** Valor final dos coeficientes

**Comentários:** Os valores obtidos pelos dois métodos são iguais? Comente.

### 3. Regularização

- Carregue os dados contidos no arquivo ex1data3.txt.

O arquivo contém 47 linhas e 6 colunas de dados. Cada coluna se refere a uma variável. Neste problema, deve-se desenvolver um modelo onde a variável da coluna 6 será estimada a partir das demais variáveis. Os dados apresentados referem-se a um problema de estimação do preço de casas. As variáveis 1, 2, 3, 4 e 5 são características dos imóveis e serão utilizadas como entrada do problema de regressão. A variável 6 é o preço do imóvel.

- Divida o conjunto de dados entre treino e teste. Para este problema, os primeiros 30 dados serão utilizados para treino e o restante será usado para teste.

- Encontre os coeficientes da regressão utilizando o método dos mínimos quadrados regularizado para os seguintes valores de  $\lambda = [0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5]$ . Utilize o conjunto de treinamento.

**Apresentar:** Valores finais dos coeficientes

**Comentários:** Quais variáveis parecem ser menos relevantes para a regressão?

- Encontrar o valor do EQM para os dados de treinamento e de teste para cada um dos valores de  $\lambda$ .

**Apresentar:** Dois gráficos. EQM x  $\lambda$  no conjunto de treinamento e EQM x  $\lambda$  no conjunto de teste

**Comentários:** Como os valores dos coeficientes variam com  $\lambda$  ? Explique o motivo.

Comente o crescimento/decrescimento dos erros presente nas figuras EQM x  $\lambda$