## Ýkl chu

## {k **=** & 1

- , I oh , e&1 ऐन्गुलर लीफ स्पाट रोग प्रतिरोधी, लम्बी बेल वाली किस्म, फलियां 13—14 सैं.मी. लम्बी, गोल, 8 से 10 भूरे रंग के चमकीले बीज प्रति फली, 65 दिन में तैयार, हरी फलियों की औसत उपज 100—125 किंवटल प्रति हैक्टेयर (8—10 किंवटल प्रति बीघा), सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म।
- i lfe; j बौनी किस्म, हरे रंग की कोमल, चपटी, 13 सैं.मी. लम्बी फली, 55 दिन में पककर तैयार, हरी फलियों की औसत उपज 75—100 किंवटल प्रति हैक्टेयर (6—8 किंवटल प्रति बीघा), निचले तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म।
- विश्वामां बौनी किस्म, 14 सैं.मी. लम्बी फली, थोड़ी मुड़ी हुई, 40—50 दिन में पककर तैयार, हरी फलियों की औसत उपज 75—100 किंवटल प्रति हैक्टेयर (6—8 किंवटल प्रति बीघा), निचले तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म।
- d\$V\$\text{clh olMj} लम्बी, बेल वाली किस्म, फिलयां 20 सैं.मी. लम्बी, मुड़ी हुई, कोमल, 65 दिन में तैयार, हरी फिलयों की औसत उपज 100—125 किंवटल प्रति हैक्टेयर (8—10 किंवटल प्रति बीघा), निचले तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म।