

انجینئری حساب

(جلد اول)

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

عنوان

ix

دیاچہ

xi

میری پہلی کتاب کا دیاچہ

| | | |
|-----|-------|--|
| 1 | 1 | درجہ اول سادہ تفرقی مساوات |
| 2 | 1.1 | نمونہ کشی |
| 14 | 1.2 | $y' = f(x, y)$ کا جیو میٹریائی مطلب۔ میدان کی سمت اور ترکیب پولر۔ |
| 23 | 1.3 | قابل علیحدگی سادہ تفرقی مساوات |
| 39 | 1.4 | قطعی سادہ تفرقی مساوات اور جزو مکمل |
| 51 | 1.5 | خطی سادہ تفرقی مساوات۔ مساوات برنولی |
| 68 | 1.6 | عمودی خطوط کی نسلیں |
| 72 | 1.7 | ابتدائی قیمت تفرقی مساوات: حل کی وجودیت اور یکنائیت |
| 79 | 2 | درجہ دوم سادہ تفرقی مساوات |
| 79 | 2.1 | متجانس خطی دو درجہ تفرقی مساوات |
| 95 | 2.2 | مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات |
| 110 | 2.3 | تفرقی عامل |
| 114 | 2.4 | اسپرنگ سے جڑی کمیت کی آزادانہ ارتعاش |
| 130 | 2.5 | پولر کوئی مساوات |
| 138 | 2.6 | حل کی وجودیت اور یکنائی؛ وروئسی |
| 147 | 2.7 | غیر متجانس سادہ تفرقی مساوات |
| 159 | 2.8 | جبری ارتعاش۔ گمک |
| 165 | 2.8.1 | برقرار حال حل کا حیط۔ عملی گمک |
| 169 | 2.9 | برقی ادوار کی نمونہ کشی |
| 180 | 2.10 | مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کا حل |

| | | |
|-----|-------|--|
| 187 | 3 | بلند درجی خطی سادہ تفرقی مساوات |
| 187 | 3.1 | متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات |
| 198 | 3.2 | مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات |
| 207 | 3.3 | غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات |
| 210 | 3.4 | مقدار معلوم بدلنے کے طریقے سے غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات کا حل |
| 219 | 4 | نظام تفرقی مساوات |
| 220 | 4.1 | قالب اور سمتیہ کے بنیادی حقائق |
| 229 | 4.2 | سادہ تفرقی مساوات کے نظام بطور انجینئری مسائل کے نمونے |
| 243 | 4.3 | نظریہ نظام سادہ تفرقی مساوات اور ورسکی |
| 244 | 4.3.1 | خطی نظام |
| 248 | 4.4 | مستقل عددی سروالے نظام۔ سطح مرحلہ کی ترکیب |
| 265 | 4.5 | نقطہ فاصل کے جانچ پڑتال کا مسئلہ معیار۔ استحکام |
| 273 | 4.6 | کفنی تراکیب برائے غیر خطی نظام |
| 282 | 4.6.1 | سطح حرکت پر ایک درجی مساوات میں متبادلہ |
| 290 | 4.7 | سادہ تفرقی مساوات کے غیر متجانس خطی نظام |
| 291 | 4.7.1 | نامعلوم عددی سر کی ترکیب |
| 299 | 5 | طافقی تسلسل سے سادہ تفرقی مساوات کا حل۔ اعلیٰ تفاعل |
| 300 | 5.1 | ترکیب طافقی تسلسل |
| 315 | 5.2 | لیونڈر مساوات۔ لیونڈر کثیر رکنی |
| 332 | 5.3 | مبسوط طافقی تسلسل۔ ترکیب فرونیوس |
| 337 | 5.3.1 | عملی استعمال |
| 351 | 5.4 | مساوات۔ بیسل اور بیسل تفاعل |
| 366 | 5.5 | بیسل تفاعل کی دوسری قسم۔ عمومی حل |
| 372 | 5.6 | قائمہ الزاویہ تفاعل کا سلسلہ |
| 378 | 5.7 | مسئلہ شیورم لیوویل |
| 385 | 5.8 | قائمیت لیونڈر کثیر رکنی اور بیسل تفاعل |
| 395 | 6 | لاپلاس متبادلہ |
| 396 | 6.1 | لاپلاس بدل۔ الٹ لاپلاس بدل۔ خطیت |
| 405 | 6.2 | تفرقات اور نکلمات کے لاپلاس بدل۔ سادہ تفرقی مساوات |
| 417 | 6.3 | s محور پر منتقلی، t محور پر منتقلی، اکائی سیڑھی تفاعل |
| 437 | 6.4 | ڈیراک ڈیلٹائی تفاعل۔ اکائی ضرب تفاعل۔ جزوی کسری پھیلاؤ |
| 454 | 6.5 | الچھاؤ |
| 463 | 6.6 | لاپلاس بدل کی مکمل اور تفرق۔ متغیر عددی سروالے سادہ تفرقی مساوات |
| 471 | 6.7 | تفرقی مساوات کے نظام |

| | | |
|-----|-------|--|
| 479 | 6.8 | لاپلاس بدل کے عمومی کیلے |
| 483 | 7 | خطی الجبرا: سمتیات |
| 483 | 7.1 | غیر سمتیات اور سمتیات |
| 485 | 7.2 | سمتیہ کے اجزاء |
| 491 | 7.3 | سمتیات کا مجموعہ، غیر سمتی کے ساتھ ضرب |
| 499 | 7.4 | سمتی فضا۔ خطی تابعیت اور غیر تابعیت |
| 505 | 7.5 | اندرونی ضرب (ضرب نقطہ) |
| 518 | 7.6 | اندرونی ضرب فضا |
| 520 | 7.7 | سمتی ضرب |
| 522 | 7.8 | اجزاء کی صورت میں سمتی ضرب |
| 533 | 7.9 | غیر سمتی سہ ضرب اور دیگر متعدد ضرب |
| 541 | 8 | خطی الجبرا: قالب، سمتیہ، مقطع۔ خطی نظام |
| 542 | 8.1 | قالب اور سمتیات۔ مجموعہ اور غیر سمتی ضرب |
| 552 | 8.2 | قابلی ضرب |
| 558 | 8.2.1 | تبدیلی محل |
| 570 | 8.3 | خطی مساوات کے نظام۔ گاوسی اسقاط |
| 582 | 8.3.1 | صف زینہ دار صورت |
| 590 | 8.4 | خطی غیر تابعیت۔ درجہ قالب۔ سمتی فضا |
| 604 | 8.5 | خطی نظام کے حل: وجودیت، یکتا |
| 610 | 8.6 | دو درجہ اور تین درجہ مقطع قالب |
| 613 | 8.7 | مقطع۔ قاعدہ کریبر |
| 629 | 8.8 | معکوس قالب۔ گاوس جارڈن اسقاط |
| 644 | 8.9 | سمتی فضا، اندرونی ضرب، خطی تبادلہ |
| 661 | 9 | خطی الجبرا: امتیازی قدر مسائل قالب |
| 662 | 9.1 | امتیازی قدر مسائل قالب۔ امتیازی اقدار اور امتیازی سمتیات کا حصول |
| 672 | 9.2 | امتیازی مسائل کے چند استعمال |
| 680 | 9.3 | تشاکلی، مخرف تشاکلی اور قائمہ الزاویہ قالب |
| 687 | 9.4 | امتیازی اساس، وتری بنانا، دو درجہ صورت |
| 700 | 9.5 | مخلوط قالب اور مخلوط صورتیں |
| 711 | 10 | سمتی تفرقی علم الاحصاء۔ سمتی تفاعل |
| 711 | 10.1 | غیر سمتی میدان اور سمتی میدان |
| 713 | 10.2 | سمتی علم الاحصاء |
| 720 | 10.3 | منحنی |
| 726 | 10.4 | لمبائی قوس |
| 733 | 10.5 | مماس، انحناء اور مروڑ |
| 738 | 10.6 | سمتی رفتار اور اسراع |

| | | |
|-----|-------|---|
| 745 | 10.7 | زنجرى ترکیب اور متعدد متغیرات کے تفاعل کا اوسط قیمت مسئلہ |
| 751 | 10.8 | سمتی تفرق، غیر سمتی میدان کی ڈھلوان |
| 764 | 10.9 | تبادل محدودی نظام اور تبادل ارکان سمتیات |
| 769 | 10.10 | سمتی میدان کی پھیلاؤ |
| 777 | 10.11 | سمتی تفاعل کی گردش |
| 781 | 11 | سمتی تکملى علم الاحصاء تکمل کے مسئلے |
| 782 | 11.1 | خطی تکمل |
| 787 | 11.2 | خطی تکمل کا حل |
| 796 | 11.3 | دوہرہ تکمل |
| 810 | 11.4 | دوہرہ تکمل کا خطی تکمل میں تبادلہ |
| 820 | 11.5 | سطحیں |
| 825 | 11.6 | مماسی سطح۔ بنیادی صورت اول۔ رقبہ |
| 837 | 11.7 | سطحی تکمل |
| 845 | 11.8 | تہرہ تکمل۔ گاؤس کا مسئلہ پھیلاؤ |
| 850 | 11.9 | مسئلہ پھیلاؤ کے نتائج اور استعمال |
| 861 | 11.10 | مسئلہ سٹوکس |
| 866 | 11.11 | مسئلہ سٹوکس کے نتائج اور عملی استعمال |
| 869 | 11.12 | راہ سے آزاد خطی تکمل |
| 883 | 12 | فوریئر تسلسل |
| 884 | 12.1 | دوری تفاعل، تکوینی تسلسل |
| 889 | 12.2 | فوریئر تسلسل۔ یولر کلیات |
| 902 | 12.3 | اختیاری دوری عرصہ والے تفاعل |
| 907 | 12.4 | جفت اور طاق تفاعل |
| 916 | 12.5 | نصف حلقہ الساع |
| 923 | 12.6 | فوریئر عددی سرکا بغیر تکمل حصول |
| 931 | 12.7 | جبری ارتعاش |
| 936 | 12.8 | تقریب بذریعہ تکوینی کثیر رکنی۔ مکعب خلل |
| 940 | 12.9 | فوریئر تکمل |
| 953 | 13 | جزوی تفرقی مساوات |
| 953 | 13.1 | بنیادی تصورات |
| 958 | 13.2 | نمونہ کشی: ارتعاش پذیر تار۔ یک بعدی مساوات موج |
| 960 | 13.3 | علیحدگی متغیرات (ترکیب ضرب) |
| 973 | 13.4 | مساوات موج کا دالو بیچ حل |
| 979 | 13.5 | یک بعدی بہاؤ حرارت |
| 987 | 13.6 | لاقتناہی لمبائی کی سلاخ میں بہاؤ حرارت |

| | |
|----------------|---|
| 993 | 13.7 نمونہ کشی: ارتعاش پذیر جھلی۔ دوابعادی مساوات موج |
| 996 | 13.8 مستطیل جھلی |
| 1006 | 13.9 قطبی محدود میں لاپلاس |
| 1010 | 13.10 دائری جھلی۔ مساوات بیسل |
| 1018 | 13.11 مساوات لاپلاس۔ نظریہ محلی قوہ |
| 1024 | 13.12 کروی محدود میں مساوات لاپلاس۔ مساوات لیہ منڈر |
| 1030 | 13.13 لاپلاس تبادلہ برائے جزوی تفرقی مساوات |
| 1037 | 14 مخلوط اعداد۔ مخلوط تحلیل تفاعل |
| 1038 | 14.1 مخلوط اعداد |
| 1047 | 14.2 مخلوط اعداد کی قطبی صورت۔ تکنیکی عدم مساوات |
| 1054 | 14.3 مخلوط سطح میں منحنیات اور خطے |
| 1059 | 14.4 مخلوط تفاعل۔ حد۔ تفرق۔ تحلیل تفاعل |
| 1067 | 14.5 کوشی ریمان مساوات۔ لاپلاس مساوات |
| 1078 | 14.6 ناطق تفاعل۔ جذر |
| 1084 | 14.7 قوت نمائی تفاعل |
| 1089 | 14.8 تکنیکی اور بذلولی تفاعل |
| 1095 | 14.9 لوگار تھم۔ عمومی طاقت |
| 1103 | 15 محافظ زاویہ نقشہ کشی |
| 1104 | 15.1 نقشہ کشی |
| 1116 | 15.2 محافظ زاویہ نقشہ |
| 1125 | 15.3 خطی کسری تبادلہ |
| 1129 | 15.4 مخصوص خطی کسری تبادلہ |
| 1138 | 15.5 نقشہ زیر دیگر تفاعل |
| 1149 | 15.6 ریمان سطحیں |
| 1157 | 16 مخلوط مکملات |
| 1157 | 16.1 مخلوط مستوی میں خطی مکمل |
| 1168 | 16.2 مخلوط خطی مکمل کی خواص |
| 1172 | 16.3 کوشی کا مسئلہ مکمل |
| 1184 | 16.4 خطی مکمل کی قیمت کا حصول بذریعہ غیر قطعی مکمل |
| 1189 | 16.5 کوشی کا کلیہ مکمل |
| 1194 | 16.6 تحلیل تفاعل کے تفرق |
| 1201 | 17 ترتیب اور تسلسل |
| 1201 | 17.1 ترتیب |
| 1208 | 17.2 تسلسل |
| 1213 | 17.3 کوشی اصول مرکزیت برائے ترتیب اور تسلسل |

| | | |
|----------------|------|---|
| 1220 | 17.4 | یک سر حقیقی ترتیب۔ لیسنز آزمائش برائے حقیقی تسلسل |
| 1225 | 17.5 | تسلسل کی مرکزیت اور انفرج کی آزمائشیں |
| 1236 | 17.6 | تسلسل پر اعمال |

| | | |
|----------------|------|---|
| 1243 | 18 | 18 طاقی تسلسل، ٹیلر تسلسل اور لوغوں تسلسل |
| 1243 | 18.1 | طاقی تسلسل |
| 1256 | 18.2 | طاقی تسلسل کی روپ میں تفاعل |
| 1263 | 18.3 | ٹیلر تسلسل |
| 1268 | 18.4 | بنیادی تفاعل کے ٹیلر تسلسل |
| 1274 | 18.5 | طاقی تسلسل حاصل کرنے کے عملی تراکیب |
| 1281 | 18.6 | یکساں استرار |
| 1293 | 18.7 | لوغوں تسلسل |
| 1303 | 18.8 | لامتناہی پرتھلیل پذیری۔ صفر اور قدرت |

| | | |
|----------------|------|------------------------------|
| 1315 | 19 | 19 مکمل بذریعہ ترکیب بقیہ |
| 1315 | 19.1 | بقیہ |
| 1322 | 19.2 | مسئلہ بقیہ |
| 1327 | 19.3 | حقیقی مکمل بذریعہ مسئلہ بقیہ |
| 1335 | 19.4 | حقیقی مکمل کے دیگر اقسام |

| | | |
|----------------|----|---|
| 1343 | 20 | 20 مخلوط تحلیل تفاعل اور نظریہ مخفی قوہ |
|----------------|----|---|

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 1345 | ا | ا اضافی ثبوت |
|----------------|---|--------------|

| | | |
|----------------|-----|--------------------------|
| 1349 | ب | ب منید معلومات |
| 1349 | 1.ب | 1.ب اعلی تفاعل کے مساوات |

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومتِ پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کرتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ہونے والے تکنیکی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی الفاظ کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں برقی انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری ای۔ میل پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

اس کتاب میں تمام غلطیاں مجھ سے ہی سر زد ہوئی ہیں البتہ انہیں درست کرنے میں بہت لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور مکمل ہونے پر ان حضرات کے تاثرات یہاں شامل کئے جائیں گے۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

28 اکتوبر 2011

باب 20

مخلوط تحلیل تفاعل اور نظریہ مخفی قوه

ضمیمہ ۱

اضافی ثبوت

صفحہ 139 پر مسئلہ 2.2 بیان کیا گیا جس کا ثبوت یہاں پیش کرتے ہیں۔

ثبوت : یکتائی (مسئلہ 2.2)
تصور کریں کہ کھلے وقفے I پر ابتدائی قیمت مسئلہ

$$(0.1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1$$

کے دو عدد حل $y_1(x)$ اور $y_2(x)$ پائے جاتے ہیں۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ I پر ان کا فرق

$$y(x) = y_1(x) - y_2(x)$$

مکمل صفر کے برابر ہے۔ یوں $y_1(x) \equiv y_2(x)$ ہو گا جو یکتائی کا ثبوت ہے۔

چونکہ مساوات 1.1 خطی اور متجانس ہے لہذا I پر $y(x)$ بھی اس کا حل ہو گا اور چونکہ y_1 اور y_2 دونوں یکساں ابتدائی معلومات پر پورا اترتے ہیں لہذا y درج ذیل ابتدائی معلومات پر پورا اترے گا۔

$$(0.2) \quad y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0$$

ہم تفاعل

$$(0.3) \quad z = y^2 + y'^2$$

اور اس کے تفرق

$$(1.4) \quad z' = 2yy' + 2y'y''$$

پر غور کرتے ہیں۔ تفرقی مساوات ۱.۱ کو

$$y'' = -py' - qy$$

لکھتے ہوئے اس کو z' میں پر کرتے ہیں۔

$$(1.5) \quad z' = 2yy' + 2y'(-py' - qy) = 2yy' - 2py'^2 - 2qyy'$$

اب چونکہ y اور y' حقیقی تفاعل ہیں لہذا ہم

$$(1.6) \quad (y \mp y')^2 = y^2 \mp 2yy' + y'^2 \geq 0$$

یعنی

$$(1.7) \quad \text{(الف)} \quad 2yy' \leq y^2 + y'^2 = z, \quad \text{(ب)} \quad -2yy' \leq y^2 + y'^2 = z,$$

لکھ سکتے ہیں جہاں مساوات ۱.۳ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مساوات ۱.۷-ب کو $-z \leq 2yy'$ لکھتے ہوئے مساوات ۱.۷ کے دونوں حصوں کو $z \leq |2yy'|$ لکھا جاسکتا ہے۔ یوں مساوات ۱.۵ کے آخری جزو کے لئے

$$-2qyy' \leq |-2qyy'| = |q| |2yy'| \leq |q| z$$

لکھا جاسکتا ہے۔ اس نتیجے کے ساتھ ساتھ $-p \leq |p|$ استعمال کرتے ہوئے اور مساوات ۱.۷-الف کو مساوات ۱.۵ کے $2yy'$ جزو میں استعمال کرتے ہوئے

$$z' \leq z + 2|p|y'^2 + |q|z$$

ملتا ہے۔ اب چونکہ $y'^2 \leq y^2 + y'^2 = z$ ہے لہذا اس سے

$$z' \leq (1 + |p| + |q|)z$$

ملتا ہے۔ اس میں $h = 1 + |p| + |q|$ لکھتے ہوئے

$$(1.8) \quad z' \leq hz \quad I \text{ پر تمام } x$$

حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح مساوات ۱.۵ اور مساوات ۱.۷ سے درج ذیل بھی حاصل ہوتا ہے۔

$$(1.9) \quad \begin{aligned} -z' &= -2yy' + 2py'^2 + 2qyy' \\ &\leq z + 2|p|z + |q|z = hz \end{aligned}$$

مساوات ۱.8 اور مساوات ۱.9 کے غیر مساوات درج ذیل غیر مساوات کے مترادف ہیں

$$(0.10) \quad z' - hz \leq 0, \quad z' + hz \geq 0$$

جن کے بائیں ہاتھ کے جزو تکمل درج ذیل ہیں۔

$$F_1 = e^{-\int h(x) dx}, \quad F_2 = e^{\int h(x) dx}$$

چونکہ $h(x)$ استمراری ہے لہذا اس کا تکمل پایا جاتا ہے۔ چونکہ F_1 اور F_2 مثبت ہیں لہذا انہیں مساوات ۱.10 کے ساتھ ضرب کرنے سے

$$(z' - hz)F_1 = (zF_1)' \leq 0, \quad (z' + hz)F_2 = (zF_2)' \geq 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ I پر zF_1 بڑھ نہیں رہا اور zF_2 گھٹ نہیں رہا۔ مساوات ۱.2 کے تحت $z(x_0) = 0$ ہے لہذا $x \leq x_0$ کی صورت میں

$$(0.11) \quad zF_1 \geq (zF_1)_{x_0} = 0, \quad zF_2 \leq (zF_2)_{x_0}$$

ہو گا اور اسی طرح $x \geq x_0$ کی صورت میں

$$(0.12) \quad zF_1 \leq 0, \quad zF_2 \geq 0$$

ہو گا۔ اب انہیں مثبت قیمتوں F_1 اور F_2 سے تقسیم کرتے ہوئے

$$(0.13) \quad z \leq 0, \quad z \geq 0 \quad I \text{ پر تمام } x \text{ کے لئے}$$

ملتا ہے جس کا مطلب ہے کہ I پر $z = y^2 + y'^2 \equiv 0$ ہے۔ یوں I پر $y \equiv 0$ یعنی $y_1 \equiv y_2$ ہے جو درکار ثبوت ہے۔

□

ضمیمہ ب

مفید معلومات

ب.1 اعلیٰ تفاعل کے مساوات

قوت نمائی تفاعل e^x (شکل 1.1-ب-الف)

$$e = 2.718\ 281\ 828\ 459\ 045\ 235\ 360\ 287\ 471\ 353$$

$$(ب.1) \quad e^x e^y = e^{x+y}, \quad \frac{e^x}{e^y} = e^{x-y}, \quad (e^x)^y = e^{xy}$$

قدرتی لوگارٹھم (شکل 1.1-ب-ب)


$$(ب.2) \quad \ln(xy) = \ln x + \ln y, \quad \ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y, \quad \ln(x^a) = a \ln x$$

e^x کا الٹ $\ln x$ ہے۔ اس کے علاوہ $e^{\ln x} = x$ اور $e^{-\ln x} = e^{\ln \frac{1}{x}} = \frac{1}{x}$ ہیں۔


اساس دس کا لوگارٹھم $\log_{10} x$ یا $\log x$

$$(ب.3) \quad \log x = M \ln x, \quad M = \log e = 0.434\ 294\ 481\ 903\ 251\ 827\ 651\ 128\ 918\ 917$$

$$(ب.4) \quad \ln x = \frac{1}{M} \log x, \quad \frac{1}{M} = 2.302\ 585\ 092\ 994\ 045\ 684\ 017\ 991\ 454\ 684$$



شکل 1. ب: قوت نمائی تفاعل اور قدرتی لوگار تھم تفاعل



شکل 2. ب: سائن نمائندگی

10^x کا الٹ $\log x$ ہے۔ اس کے علاوہ $10^{\log x} = x$ اور $10^{-\log x} = 10^{\log \frac{1}{x}} = \frac{1}{x}$ ہیں۔

سائن اور کوسائن تفاعل (شکل 2. ب-الف اور ب)۔ احصائے تکملات میں زاویہ کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے۔ یوں $\sin x$ اور $\cos x$ کا دوری عرصہ 2π ہو گا۔ $\sin x$ طاق ہے یعنی $\sin(-x) = -\sin x$ ہو گا جبکہ $\cos x$ جفت ہے یعنی $\cos(-x) = \cos x$ ہو گا۔

$$1^\circ = 0.017453292519943 \text{ rad}$$

$$1 \text{ radian} = 57^\circ 17' 44.80625'' = 57.2957795131^\circ$$

(ب.5)

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

(ب.6)

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y \quad \sin(x-y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$$

$$\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$$

(ب.7)

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$$

(ب.8)

$$\sin x = \cos \left(x - \frac{\pi}{2} \right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$$

$$\cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right)$$

(ب.9)

$$\sin(\pi - x) = \sin x, \quad \cos(\pi - x) = -\cos x$$

(ب.10)

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x), \quad \sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

(ب.11)

$$\sin x \sin y = \frac{1}{2}[-\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

$$\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$$

$$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$$

(ب.12)

$$\sin u + \sin v = 2 \sin \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2}$$

$$\cos u + \cos v = 2 \cos \frac{u+v}{2} \cos \frac{u-v}{2}$$

$$\cos v - \cos u = 2 \sin \frac{u+v}{2} \sin \frac{u-v}{2}$$

(ب.13)

$$A \cos x + B \sin x = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(x \mp \delta), \quad \tan \delta = \frac{\sin \delta}{\cos \delta} = \pm \frac{B}{A}$$

(ب.14)

$$A \cos x + B \sin x = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(x \mp \delta), \quad \tan \delta = \frac{\sin \delta}{\cos \delta} = \mp \frac{A}{B}$$


(ٹینجٹ، کوٹینجٹ، سیکنٹ، کوسیکنٹ (شکل 3. ب-الف، ب)

(ب.15)

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \quad \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$$

(ب.16)

$$\tan(x+y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}, \quad \tan(x-y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$$



شکل 3. ب: ٹینجٹ اور کو ٹینجٹ

ہذلولی تفاعل (ہذلولی سائن $\sinh x$ وغیرہ۔ شکل 4. ب-الف، ب)

$$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \quad \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$

$$\cosh x + \sinh x = e^x, \quad \cosh x - \sinh x = e^{-x}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

$$\sinh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x - 1), \quad \cosh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1)$$



$$\sinh(x \mp y) = \sinh x \cosh y \mp \cosh x \sinh y$$

$$\cosh(x \mp y) = \cosh x \cosh y \mp \sinh x \sinh y$$

$$\tanh(x \mp y) = \frac{\tanh x \mp \tanh y}{1 \mp \tanh x \tanh y}$$

گیما تفاعل (شکل 5. ب) $\Gamma(\alpha)$ کی تعریف درج ذیل تکمل ہے

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-t} t^{\alpha-1} dt \quad (\alpha > 0)$$

(ب) ٹھوس خط $\tanh x$ ہے جبکہ نقطہ دار خط $\coth x$ ہے۔(الف) ٹھوس خط $\sinh x$ ہے جبکہ نقطہ دار خط $\cosh x$ ہے۔

شکل 4. ب: ہڈولی سائن، ہڈولی تافل۔

جو صرف مثبت ($\alpha > 0$) کے لئے معنی رکھتا ہے (یا اگر ہم مخلوط α کی بات کریں تب یہ α کی ان قیمتوں کے لئے معنی رکھتا ہے جن کا حقیقی جزو مثبت ہو)۔ مکمل بالخصوص سے درج ذیل اہم تعلق حاصل ہوتا ہے۔

$$\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha) \quad (23. \text{ب})$$

مساوات 22. ب سے $\Gamma(1) = 1$ ملتا ہے۔ یوں مساوات 23. ب استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(2) = 1$ حاصل ہو گا جسے دوبارہ مساوات 23. ب میں استعمال کرتے ہوئے $\Gamma(3) = 2 \times 1$ ملتا ہے۔ اسی طرح بار بار مساوات 23. ب استعمال کرتے ہوئے α کی کسی بھی عدد صحیح مثبت قیمت k کے لئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$\Gamma(k + 1) = k! \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \quad (24. \text{ب})$$


مساوات 23. ب کے بار بار استعمال سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے

$$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{\alpha} = \frac{\Gamma(\alpha + 2)}{\alpha(\alpha + 1)} = \dots = \frac{\Gamma(\alpha + k + 1)}{\alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2) \dots (\alpha + k)}$$

جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم α کی منفی قیمتوں کے لئے گیمما تافل کی درج ذیل تعریف پیش کرتے ہیں

$$\Gamma(\alpha) = \frac{\Gamma(\alpha + k + 1)}{\alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2) \dots (\alpha + k)} \quad (\alpha \neq 0, -1, -2, \dots) \quad (25. \text{ب})$$

جہاں k کی ایسی کم سے کم قیمت چنی جاتی ہے کہ $\alpha + k + 1 > 0$ ہو۔ مساوات 22. ب اور مساوات 25. ب مل کر α کی تمام مثبت قیمتوں اور غیر عددی صحیحی منفی قیمتوں کے لئے گیمما تافل دیتے ہیں۔



شکل 5. ب: گیما تفاعل

گیما تفاعل کو حاصل ضرب کی حد بھی فرض کیا جاسکتا ہے یعنی

$$(ب.26) \quad \Gamma(\alpha) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! n^\alpha}{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2) \cdots (\alpha+n)} \quad (\alpha \neq 0, -1, \dots)$$

مساوات 25. ب اور مساوات 26. ب سے ظاہر ہے کہ مخلوط α کی صورت میں $\alpha = 0, -1, -2, \dots$ پر گیما تفاعل کے قطب پائے جاتے ہیں۔

α کی بڑی قیمت کے لئے گیما تفاعل کی قیمت کو درج ذیل کلیہ سٹرلنگ سے حاصل کیا جاسکتا ہے جہاں e قدرتی لوگار تھم کی اساس ہے۔

$$(ب.27) \quad \Gamma(\alpha+1) \approx \sqrt{2\pi\alpha} \left(\frac{\alpha}{e}\right)^\alpha$$

آخر میں گیما تفاعل کی ایک اہم اور مخصوص (درج ذیل) قیمت کا ذکر کرتے ہیں۔

$$(ب.28) \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

نا مکمل گیما تفاعل

$$(ب.29) \quad P(\alpha, x) = \int_0^x e^{-t} t^{\alpha-1} dt, \quad Q(\alpha, x) = \int_x^\infty e^{-t} t^{\alpha-1} dt \quad (\alpha > 0)$$

$$(ب.30) \quad \Gamma(\alpha) = P(\alpha, x) + Q(\alpha, x)$$

بیٹا تفاعل

$$(ب.31) \quad B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt \quad (x > 0, y > 0)$$

بیٹا تفاعل کو گیما تفاعل کی صورت میں بھی پیش کیا جاسکتا ہے۔

$$(ب.32) \quad B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

تفاعل خلل (شکل 6. ب)

$$(ب.33) \quad \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

مساوات 33. ب کے تفرق $\operatorname{erf}' x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ کی مکارن تسلسل

$$\operatorname{erf}' x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(x - \frac{x^3}{1!3} + \frac{x^5}{2!5} - \frac{x^7}{3!7} + \dots \right)$$

کا تکمیل لینے سے تفاعل خلل کی تسلسل صورت حاصل ہوتی ہے۔


$$(ب.34) \quad \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(x - \frac{x^3}{1!3} + \frac{x^5}{2!5} - \frac{x^7}{3!7} + \dots \right)$$

$\operatorname{erf} \infty = 1$ ہے۔ مکملہ تفاعل خلل


$$(ب.35) \quad \operatorname{erfc} x = 1 - \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$$

فرسنل تکملات (شکل 7. ب)

$$(ب.36) \quad C(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt, \quad S(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt$$



شکل 6.ب: تفاعل خلل۔



شکل 7.ب: فرسل عملیات

$$S(\infty) = \sqrt{\frac{\pi}{8}} \text{ اور } C(\infty) = \sqrt{\frac{\pi}{8}}^1 \text{ ہیں۔ مکملہ تفاعل}$$

$$(ب.37) \quad c(x) = \frac{\pi}{8} - C(x) = \int_x^\infty \cos(t^2) dt$$

$$(ب.38) \quad s(x) = \frac{\pi}{8} - S(x) = \int_x^\infty \sin(t^2) dt$$


تکمل سائن (شکل 8.ب)

$$(ب.39) \quad \text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

Si $\infty = \frac{\pi}{2}$ کے برابر ہے۔ تکملہ تفاعل

$$(ب.40) \quad \text{si}(x) = \frac{\pi}{2} - \text{Si}(x) = \int_x^\infty \frac{\sin t}{t} dt$$

complementary functions¹



شکل 8. ب: عمل سائن

تکمل کو سائن

$$(ب.41) \quad \text{si}(x) = \int_x^\infty \frac{\cos t}{t} dt \quad (x > 0)$$

تکمل قوت نمائی

$$(ب.42) \quad \text{Ei}(x) = \int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t} dt \quad (x > 0)$$

تکمل لوگارتمی

$$(ب.43) \quad \text{li}(x) = \int_0^x \frac{dt}{\ln t}$$

