

## برقی ادوار

خالد خان یوسفزئی  
کامیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اسلام آباد  
khalidyousafzai@comsats.edu.pk



# عنوان

v	میری پہلی کتاب کا دیباچہ
1	1 درجہ اول سادہ تفرقی مساوات
2	1.1 نمونہ کشی
13	1.2 $y' = f(x, y)$ کا جیومیٹریائی مطلب۔ میدان کی سمت اور ترکیب یولر۔
22	1.3 قابل علیحدگی سادہ تفرقی مساوات
39	1.4 قطعی سادہ تفرقی مساوات اور جزو مکمل
52	1.5 خطی سادہ تفرقی مساوات۔ مساوات برنولی
69	1.6 عمودی خطوط کی تسلیں
73	1.7 ابتدائی قیمت تفرقی مساوات: حل کی وجودیت اور یکنائیت
79	2 درجہ دوم سادہ تفرقی مساوات
79	2.1 متجانس خطی دو درجہ تفرقی مساوات
89	2.2 ایک حل معلوم ہونے کی صورت میں اساس دریافت کرنا۔ تخفیف درجہ
96	2.3 مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات
111	2.4 تفرقی عامل
115	2.5 اسپرنگ سے جڑی کیفیت کی آزادانہ ارتعاش



## میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومتِ پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کر سکتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ حاصل کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ممکن کی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ ممکن کی الفاظ کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری ای۔ میل پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔

اس کتاب میں تمام غلطیاں مجھ سے ہی ڈلی ہیں البتہ اسے درست بنانے میں بہت لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور مکمل ہونے پر ان حضرات کے تاثرات یہاں شامل کئے جائیں گے۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

28 اکتوبر 2011

## باب 2

### درجہ دوم سادہ تفرقی مساوات

کئی اہم میکانی اور برقی مسائل کو خطی دو درجی تفرقی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ خطی دو درجی تفرقی مساوات تمام خطی تفرقی مساوات کی نمائندگی کرتا ہے۔ چونکہ دو درجی مساوات کا حل نسبتاً آسان ہوتا ہے لہذا اس باب میں اسی پر پہلے غور کرتے ہیں۔ اگلے باب کا موضوع تین درجی مساوات ہے۔

تفرقی مساوات کو خطی اور غیر خطی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ غیر خطی تفرقی مساوات کے حل کا حصول مشکل ثابت ہوتا ہے جبکہ خطی مساوات حل کرنے کے کئی عمدہ ترکیب پائے جاتے ہیں۔ اس باب میں عمومی حل اور ابتدائی معلومات کی صورت میں مخصوص حل کا حصول دکھایا جائے گا۔

#### 2.1 متجانس خطی دو درجی تفرقی مساوات

یک درجی مساوات پر پہلے باب میں غور کیا گیا۔ اس باب میں دو درجی مساوات پر غور کیا جائے گا۔ یہ مساوات میکانی اور برقی ارتعاش<sup>1</sup>، متحرک امواج، منتقلی حرارتی توانائی اور طبیعیات کے دیگر شعبوں میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

---

<sup>1</sup>oscillations

ایسا دو درجی تفرقی مساوات جس کو

$$(2.1) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$$

صورت میں لکھا جاسکے خطی<sup>2</sup> کہلاتا ہے ورنہ اس کو غیر خطی<sup>3</sup> کہتے ہیں۔

اس مساوات کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں  $y$ ،  $y'$  اور  $y''$  کی طاقت اکائی ہے یعنی تینوں خطی ہیں البتہ  $p(x)$ ،  $q(x)$  اور  $r(x)$  متغیرہ  $x$  کے کوئی بھی تفاعل ہو سکتے ہیں۔ دو درجی مساوات کا پہلا جزو  $f(x)y''$  ہونے کی صورت میں مساوات کو  $f(x)$  سے تقسیم کرتے ہوئے اس کو مساوات 2.1 کی معیاری صورت<sup>4</sup> میں لکھیں جہاں  $y''$  پہلا جزو ہے۔

متجانس اور غیر متجانس دو درجی مساوات کی تعریف ہو بہو ایک درجی متجانس اور غیر متجانس مساوات کی تعریف کی طرح ہے جس پر حصہ 1.5 میں تبصرہ کیا گیا۔ یقیناً  $r \equiv 0$  [جہاں زیر غور تمام  $x$  پر  $r(x) = 0$  ہو؛ اس کو مکمل صفر<sup>5</sup> پڑھیں۔] کی صورت میں مساوات 2.1 درج ذیل لکھی جائے گی

$$(2.2) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

جو متجانس ہے۔ اگر  $r(x) \neq 0$  ہو تب مساوات 2.1 غیر متجانس<sup>6</sup> کہلائے گا۔

متجانس خطی تفرقی مساوات کی مثال درج ذیل ہے

$$xy'' + 2y' + y = 0, \quad \text{جو کو معیاری صورت میں لکھتے ہیں} \quad y'' + \frac{2y'}{x} + \frac{y}{x} = 0$$

جبکہ غیر متجانس خطی تفرقی مساوات کی مثال

$$y'' + x^2y = \sec x$$

ہے۔ آخر میں غیر خطی مساوات کی تین مثال پیش کرتے ہیں۔

$$(y'')^3 + xy = \sin x, \quad y'' + xy' + 4y^2 = 0, \quad yy'' - xy' = 0$$

linear<sup>2</sup>  
nonlinear<sup>3</sup>  
standard form<sup>4</sup>  
identically zero<sup>5</sup>  
nonhomogenous<sup>6</sup>



تفاعل  $p$  اور  $q$  مساوات 2.2 کے عددی سر<sup>7</sup> کہلاتے ہیں۔

دودرجی مساوات کے حل کی تعریف عین ایک درجی مساوات کے حل کی مانند ہے۔ تفاعل  $y = h(x)$  کو کھلے وقفہ  $I$  پر اس صورت خطی (یا غیر خطی) دودرجی تفرقی مساوات کا حل تصور کیا جاتا ہے جب اس پورے فاصلے پر  $y''$  اور  $h'$ ،  $h(x)$  کی جگہ  $h''$  پائے جاتے ہوں اور تفرقی مساوات میں  $y$  کی جگہ  $y'$ ،  $h$  کی جگہ  $h'$  اور  $y''$  کی جگہ  $h''$  پر کرنے سے مساوات کے دونوں اطراف بالکل یکساں صورت اختیار کرتے ہوں۔ چند مثال جلد پیش کرتے ہیں۔

### متجانس خطی تفرقی مساوات

اس باب کے پہلے حصے میں متجانس خطی مساوات پر غور کیا جائے گا جبکہ بقایا باب میں غیر متجانس خطی مساوات پر غور کیا جائے گا۔

خطی تفرقی مساوات حل کرنے کے نہایت عمدہ تراکیب پائے جاتے ہیں۔ متجانس مساوات کے حل میں اصول خطیت<sup>8</sup> یا اصول نفاذ<sup>9</sup> کلیدی کردار ادا کرتا ہے جس کے تحت متجانس مساوات کے مختلف حل کو آپس میں جمع کرنے یا انہیں مستقل سے ضرب دینے سے دیگر حل حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

مثال 2.1: اصول نفاذ

تمام  $x$  پر درج ذیل متجانس خطی تفرقی مساوات کے حل  $y_1 = \cos 2x$  اور  $y_2 = \sin 2x$  ہیں۔

$$(2.3) \quad y'' + 4y = 0$$

ان حل کی درستگی ثابت کرنے کی خاطر انہیں دیے گئے مساوات میں پر کرتے ہیں۔ پہلے  $y_1 = \cos 2x$  کو درست حل ثابت کرتے ہیں۔ چونکہ  $(\cos 2x)'' = -4 \cos 2x$  کے برابر ہے لہذا

$$y'' + 4y = (\cos 2x)'' + 4(\cos 2x) = -4 \cos 2x + 4 \cos 2x = 0$$

coefficients<sup>7</sup>

linearity principle<sup>8</sup>

superposition principle<sup>9</sup>

ملتا ہے۔ اسی طرح  $y_2 = \sin 2x$  کو پر کرتے ہوئے

$$y'' + 4y = (\sin 2x)'' + 4(\sin 2x) = -4 \sin 2x + 4 \sin 2x = 0$$

ملتا ہے۔ ہم دیے گئے حل سے نئے حل حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں ہم  $\cos 2x$  کو کسی مستقل مثلاً 2.73 سے ضرب دیتے ہوئے اور  $\sin 2x$  کو -1.25 سے ضرب دیتے ہوئے ان کا مجموعہ

$$y_3 = 2.73 \cos 2x - 1.25 \sin 2x$$

لیتے ہوئے توقع کرتے ہیں کہ یہ بھی دیے گئے تفرقی مساوات کا حل ہو گا۔ آئیں نئے حل کو تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے اس کی درستگی ثابت کریں۔

$$\begin{aligned} y'' + 4y &= (2.73 \cos 2x - 1.25 \sin 2x)'' + 4(2.73 \cos 2x - 1.25 \sin 2x) \\ &= 4(-2.73 \cos 2x + 1.25 \sin 2x) + 4(2.73 \cos 2x - 1.25 \sin 2x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

اس مثال میں ہم نے دیے گئے حل  $y_1$  اور  $y_2$  سے نیا حل

$$(2.4) \quad y_3 = c_1 y_1 + c_2 y_2, \quad (c_1 \text{ اور } c_2 \text{ اختیاری مستقل ہیں})$$

حاصل کیا۔ اس کو  $y_1$  اور  $y_2$  کا خطی میل<sup>10</sup> کہتے ہیں۔ اس مثال سے ہم مسئلہ خطی میل بیان کرتے ہیں جسے عموماً اصول خطیت یا اصول نفاذ کہا جاتا ہے۔

مسئلہ 2.1: مسئلہ خطی میل  
کھلے وقفہ I پر متجانس خطی دو درجی تفرقی مساوات کے دو عدد حل کا خطی میل بھی I پر اس مساوات کا حل ہو گا۔ بالخصوص ان حل کو مستقل مقدار سے ضرب دینے سے بھی مساوات کے حل حاصل ہوتے ہیں۔

ثبوت: تصور کریں کہ متجانس مساوات 2.2 کے دو حل  $y_1$  اور  $y_2$  پائے جاتے ہیں لہذا

$$(2.5) \quad \begin{aligned} y_1'' + p y_1' + q y_1 &= 0 \\ y_2'' + p y_2' + q y_2 &= 0 \end{aligned}$$

ہو گا۔ خطی میل سے نیا حل  $y_3 = c_1 y_1 + c_2 y_2$  حاصل کرتے ہیں۔ اس کا ایک درجی تفرق اور دو درجی تفرق درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} y_3' &= c_1 y_1' + c_2 y_2' \\ y_3'' &= c_1 y_1'' + c_2 y_2'' \end{aligned}$$

$y_3$ ،  $y_3'$  اور  $y_3''$  کو متجانس مساوات کے بائیں ہاتھ میں پر کرتے ہیں

$$\begin{aligned} y_3'' + p y_3' + q y_3 &= (c_1 y_1'' + c_2 y_2'') + p(c_1 y_1' + c_2 y_2') + q(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= c_1 (y_1'' + p y_1' + q y_1) + c_2 (y_2'' + p y_2' + q y_2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

جہاں مساوات 2.5 سے آخری قدم پر دونوں قوسین صفر کے برابر پر کئے گئے ہیں۔ یوں مساوات کا بائیں ہاتھ اور دایاں ہاتھ برابر ہیں لہذا ثابت ہوتا ہے کہ  $y_3$  بھی مساوات 2.2 کا حل ہے۔

یہاں یاد رہے کہ مسئلہ 2.1 صرف متجانس مساوات کے لئے قابل استعمال ہے۔ غیر متجانس مساوات کے دیگر حل اس مسئلے سے حاصل نہیں کئے جاسکتے ہیں۔

مثال 2.2: تصور کریں کہ  $y_1$  اور  $y_2$  غیر متجانس مساوات 2.1 کے حل ہیں۔ ثابت کریں کہ  $y_3 = c_1 y_1 + c_2 y_2$  اس متجانس مساوات کا حل نہیں ہے جہاں  $c_1$  اور  $c_2$  مستقل مقدار ہیں۔

حل:  $y_1$  اور  $y_2$  غیر متجانس مساوات کے حل ہیں لہذا انہیں متجانس مساوات میں پر کرنے سے مساوات کے دونوں اطراف برابر حاصل ہوتے ہیں یعنی

$$\begin{aligned} y_1'' + p y_1' + q y_1 &= r \\ y_2'' + p y_2' + q y_2 &= r \end{aligned} \quad (2.6)$$

$y_3$  کو مساوات کے بائیں ہاتھ میں پر کرتے ہیں

$$\begin{aligned} y_3'' + p y_3' + q y_3 &= (c_1 y_1 + c_2 y_2)'' + p(c_1 y_1 + c_2 y_2)' + q(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= (c_1 y_1'' + c_2 y_2'') + p(c_1 y_1' + c_2 y_2') + q(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= c_1 (y_1'' + p y_1' + q y_1) + c_2 (y_2'' + p y_2' + q y_2) \\ &= (c_1 + c_2) r \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر مساوات 2.6 کا استعمال کیا گیا۔ اس سے  $(c_1 + c_2)r$  حاصل ہوتا ہے جبکہ متجانس مساوات کا دایاں ہاتھ  $r$  کے برابر ہے لہذا  $y_3$  متجانس مساوات پر پورا نہیں اترتا۔ یوں  $y_3$  متجانس مساوات کا حل نہیں ہے۔

مشق 2.1: غیر متجانس خطی مساوات

درج ذیل خطی غیر متجانس مساوات میں  $y = 2 - \cos x$  اور  $y = 2 - \sin x$  کو پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ مساوات کے حل ہیں۔ ثابت کریں کہ ان کا مجموعہ مساوات کا حل نہیں ہے۔ اسی طرح ثابت کریں کہ  $3(2 - \cos x)$  یا  $-7(2 - \sin x)$  بھی مساوات کے حل نہیں ہیں۔

$$y'' + y = 2$$

مشق 2.2: درج ذیل مساوات میں  $y = 1$  اور  $y = x^3$  پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ یہ دونوں تفرقی مساوات کے حل ہیں۔ ثابت کریں کہ ان کا مجموعہ تفرقی مساوات کا حل نہیں ہے نا ہی  $y = -x^3$  حل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حل کو  $-1$  سے بھی ضرب دے کر نیا حل نہیں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

$$yy'' - 2x^2y' = 0$$

## ابتدائی قیمت مسائل۔ اساس۔ عمومی حل

باب 1 میں ابتدائی قیمت درجہ اول سادہ تفرقی مساوات پر غور کیا گیا۔ درجہ اول سادہ تفرقی مساوات اور ابتدائی معلومات  $y(x_0) = y_0$  مل کر ابتدائی قیمت تفرقی مساوات کہلاتے ہیں۔ ابتدائی قیمت کو استعمال کرتے ہوئے درجہ اول سادہ تفرقی مساوات کے عمومی حل کا واحد اختیاری مستقل  $c$  حاصل کرتے ہوئے مخصوص یکتا حل حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی تصور کو دو درجی سادہ تفرقی مساوات تک بڑھاتے ہیں۔

دو درجی متجانس خطی ابتدائی قیمت مسئلے سے مراد متجانس مساوات 2.2 اور درج ذیل ابتدائی معلومات ہیں۔

$$(2.7) \quad y(x_0) = K_0, \quad y'(x_0) = K_1$$

$K_0$  اور  $K_1$  کھلے وقفہ پر نقطہ  $x_0$  پر بالترتیب نقطہ عمومی حل اور حل کے تفرق (یعنی ڈھلوان) کی قیمتیں ہیں۔

مساوات 2.7 میں دیے گئے ابتدائی قیمتوں سے عمومی حل

$$(2.8) \quad y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

کے اختیاری مستقل  $c_1$  اور  $c_2$  کی قیمتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ یہاں  $y_1$  اور  $y_2$  مساوات 2.7 کے حل ہیں۔ یوں مخصوص حل حاصل کیا جاتا ہے جو نقطہ  $(x_0, K_0)$  سے گزرتا ہے اور جس کی ڈھلوان اس نقطے پر  $K_1$  ہوتی ہے۔


مثال 2.3: درج ذیل ابتدائی قیمت دو درجی سادہ تفرقی مساوات کو حل کریں۔

$$y'' + 4y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = -3$$

حل: پہلا قدم: اس مساوات کے حل  $y_1 = \cos 2x$  اور  $y_2 = \sin 2x$  ہیں (مثال 2.1 سے رجوع کریں) لہذا اس کا موزوں عمومی حل

$$(2.9) \quad y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

ہو گا۔ (موزوں حل پر اس مثال کے فوراً بعد بات کرتے ہیں۔)



شکل 2.1: مثال 2.3 کا مخصوص حل۔

دوسرا قدم: مخصوص حل حاصل کرتے ہیں۔ عمومی حل کا تفرق  $y' = -2 \sin 2x + 2c_2 \cos x$  ہے۔ ابتدائی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے

$$y(0) = c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0 = c_1 = 5$$

$$y'(0) = -2 \sin 0 + 2c_2 \cos 0 = 2c_2 = -3, \quad c_2 = -1.5$$

حاصل ہوتے ہیں لہذا مخصوص حل

$$y = 5 \cos 2x - 1.5 \sin 2x$$

ہو گا۔ شکل 2.1 میں مخصوص حل دکھایا گیا ہے۔ نقطہ  $x = 0$  پر اس کی قیمت  $y(0) = 5$  ہے جبکہ اسی نقطے پر خط کی ڈھلوان (مماس)  $y'(0) = 0.5$  ہے۔ مماس  $x$  محور کو  $x = \frac{5}{3} = 3.33$  پر قطع کرتا ہے۔

درج بالا مثال میں  $y_1$  اور  $y_2$  ایسے تفاعل تھے جن سے حاصل عمومی حل ابتدائی معلومات پر پورا اترتا تھا۔ آئیں اب دو آپس میں راست تناسب حل لیتے ہوئے عمومی حل لکھیں، مثلاً  $y_1 = \cos 2x$  اور  $y_2 = k \cos 2x$  لیتے ہوئے

$$y = c_1 \cos 2x + c_2 k \cos 2x = (c_1 + c_2 k) \cos 2x = c_3 \cos 2x$$

عمومی حل لکھتے ہیں۔ اس مساوات میں ایک عدد اختیاری مستقل  $c_3$  پایا جاتا ہے جو دونوں ابتدائی قیمتوں پر پورا اترنے کے لئے ناکافی ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی حل لکھتے ہوئے ایسے موزوں حل کا خطی میل لیا جاتا ہے جو آپس میں راست تناسبی نہ ہوں۔

آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہو گا کہ عمومی حل میں استعمال ہونے والے موزوں حل  $y_1$  اور  $y_2$  انفرادی طور پر دونوں ابتدائی معلومات پر پورا نہیں اتر سکتے البتہ ان کا خطی میل دونوں ابتدائی معلومات پر پورا اترتا ہے۔ یہی عمومی حل کی اہمیت کی وجہ ہے۔

عمومی حل، اساس اور مخصوص حل کے تعریف  
کھلے وقفہ  $I$  پر سادہ تفرقی مساوات 2.2 کا عمومی حل مساوات 2.9 دیتا ہے جہاں  $I$  پر  $y_1$  اور  $y_2$  مساوات 2.2 کے (آپس میں) غیر تناسبی حل اور  $c_1$ ،  $c_2$  اختیاری مستقل ہیں۔ فاصلہ  $I$  پر  $y_1$  اور  $y_2$  مساوات 2.2 کی اساس<sup>11</sup> حل کہلاتے ہیں۔

کھلے وقفہ  $I$  پر سادہ تفرقی مساوات 2.2 کا مخصوص حل مساوات 2.9 میں  $c_1$  اور  $c_2$  کی جگہ مخصوص قیمتیں پر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

کھلے وقفہ کی تعریف حصہ 1.1 میں دی گئی ہے۔  $y_1$  اور  $y_2$  اس صورت تناسبی تصور کئے جاتے ہیں جب پورے  $I$  پر

$$(2.10) \quad (a) \quad y_1 = ky_2 \quad \text{یا} \quad (b) \quad y_2 = ly_1$$

ہو، جہاں  $k$  اور  $l$  اعداد ہیں جو صفر بھی ہو سکتے ہیں۔ (یہاں توجہ رکھیں:  $a$  اس صورت  $b$  کے مترادف ہے جب  $k \neq 0$  ہو۔)

آئیں اساس کی تعریف ذرہ مختلف اور عمومی اہمیت کے حامل طریقے سے بیان کریں۔ وقفہ  $I$  پر معین  $y_1$  اور  $y_2$  وقفہ  $I$  پر اس صورت خطی طور غیر تابع<sup>12</sup> کہلاتے ہیں جب پورے وقفے پر

$$(2.11) \quad k_1 y_1 + k_2 y_2 = 0$$

سے مراد

$$(2.12) \quad \begin{aligned} k_1 &= 0 \\ k_2 &= 0 \end{aligned}$$

ہو۔  $k_1$  اور  $k_2$  میں سے کم از کم ایک کی قیمت صفر کے برابر نہ ہونے کی صورت میں مساوات 2.11 پر پورا اترتے ہوئے حل  $y_1$  اور  $y_2$  خطی طور تابع<sup>13</sup> کہلاتے ہیں۔ اگر  $k_1 \neq 0$  ہو تب ہم مساوات 2.11 کو

<sup>11</sup> basis  
<sup>12</sup> linearly independent  
<sup>13</sup> linearly dependent

$k_1$  سے تقسیم کرتے ہوئے  $y_1 = \frac{k_2}{k_1} y_2$  لکھ سکتے ہیں جو تناسبی رشتہ ہے۔ اسی طرح  $k_2 \neq 0$  کی صورت میں  $y_2 = \frac{k_1}{k_2} y_1$  لکھا جاسکتا ہے جو تناسبی رشتہ کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے برعکس خطی طور پر غیر تابع صورت میں ہم مساوات 2.11 کو  $k_1$  (یا  $k_2$ ) سے تقسیم نہیں کر سکتے لہذا تناسبی رشتہ حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس طرح اساس کی (درج ذیل) قدر مختلف تعریف حاصل ہوتی ہے۔

اساس کی قدر مختلف تعریف  
کھلے وقفے  $I$  پر مساوات 2.11 کا خطی طور پر غیر تابع حل مساوات 2.11 کے حل کا اساس ہے۔

اگر کسی کھلے وقفے  $I$  پر مساوات کے عددی سر  $p$  اور  $q$  استمراری تفاعل ہوں تب اس وقفے پر مساوات کے کا عمومی حل پایا جاتا ہے۔ مساوات 2.7 میں دیے ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے اس عمومی حل سے مخصوص حل حاصل ہو گا۔ وقفہ  $I$  پر مساوات کے تمام حل یہی عمومی مساوات دے گا لہذا ایسی صورت میں مساوات کا کوئی نادر<sup>14</sup> حل نہیں پایا جاتا (نادر حل کو عمومی حل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہاں سوال 1.16 سے رجوع کریں)۔ ان تمام حقائق کی وضاحت جلد کی جائے گی۔

مثال 2.4: اساس، عمومی اور مخصوص حل  
 $\cos 2x$  اور  $\sin 2x$  تمام  $x$  پر مثال 2.3 کے تفرقی مساوات  $y'' + 4y = 0$  کے حل کی اساس ہیں۔ ایسا اس لئے ہے کہ  $\frac{\cos 2x}{\sin 2x} \neq c$  اور  $\frac{\sin 2x}{\cos 2x} \neq 0$  ہیں جہاں  $c$  مستقل ہے۔ اس مثال میں ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے عمومی حل سے مخصوص حل  $y = 5 \cos 2x - 1.5 \sin 2x$  حاصل کیا گیا تھا۔

مثال 2.5: پر کرتے ہوئے ثابت کریں کہ  $y_1 = e^{2x}$  اور  $y_2 = e^{-2x}$  سادہ تفرقی مساوات  $y'' - 4y = 0$  کے حل ہیں۔ یوں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں۔

$$y'' - 4y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$$



حل: چونکہ  $y_2'' - 4y_2 = (e^{-2x})'' - 4e^{-2x} = 4e^{2x} - 4e^{2x} = 0$  اور  $y_1'' - 4y_1 = (e^{2x})'' - 4e^{2x} = 4e^{2x} - 4e^{2x} = 0$  ہیں لہذا  $y_1$  اور  $y_2$  دیے گئے تفرقی مساوات کے حل ہیں۔ چونکہ  $\frac{e^{2x}}{e^{-2x}} \neq c$  ہے جہاں  $c$  مستقل کو ظاہر کرتا ہے لہذا دونوں حل غیر متناسب ہیں اور یوں  $e^{2x}$  اور  $e^{-2x}$  پر حل کا اساس ہے۔ اساس کو استعمال کرتے ہوئے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$$

عمومی حل اور عمومی حل کے تفرق میں ابتدائی قیمتیں پر کرتے ہوئے مستقل  $c_1$  اور  $c_2$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y(0) = c_1 e^0 + c_2 e^0 = c_1 + c_2 = 2, \quad y' = 2c_1 e^{2x} - 2c_2 e^{-2x}, \quad y'(0) = 2c_1 - 2c_2 = 1$$

دو عدد بمزاد مساوات<sup>15</sup>  $c_1 + c_2 = 2$  اور  $2c_1 - 2c_2 = 1$  کو آپس میں حل کرتے ہوئے  $c_1 = \frac{3}{4}$  اور  $c_2 = \frac{5}{4}$  ملتے ہیں جس سے مخصوص حل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = \frac{3}{4} e^{2x} + \frac{5}{4} e^{-2x}$$

## 2.2 ایک حل معلوم ہونے کی صورت میں اساس دریافت کرنا۔ تخفیف درجہ

بعض اوقات ایک حل با آسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا خطی طور غیر تابع حل یک درجی سادہ تفرقی مساوات کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کو تخفیف درجہ<sup>16</sup> کی ترکیب<sup>17</sup> کہتے ہیں۔ اس ترکیب کی مثال دیکھنے کے بعد اس کی عمومی اطلاق پر غور کرتے ہیں۔

<sup>15</sup> simultaneous equations

<sup>16</sup> reduction of order

<sup>17</sup> یہ ترکیب یوسف لونی لگرینج (1736-1813) نے دریافت کی۔

مثال 2.6: ایک حل جانتے ہوئے تخفیف درجہ۔ اساس  
درج ذیل سادہ تفرقی مساوات کے اساس حل دریافت کریں۔

$$x^2 y'' - xy' + y = 0$$

کل: دیے گئے مساوات کے معائنے سے ایک حل  $y_1 = x$  لکھا جاسکتا ہے چونکہ یوں  $y_1'' = 0$  ہو گا لہذا  
تفرقی مساوات کا پہلا جزو صفر ہو جاتا ہے اور  $y_1' = 1$  ہو گا جس سے مساوات کے دوسرے اور تیسرے اجزاء کا  
مجموعہ صفر ہو جاتا ہے۔ اس ترکیب میں دوسرے حل کو  $y_2 = uy_1$  لکھ کر دیے گئے تفرقی مساوات میں

$$y_2 = uy_1 = ux, \quad y_2' = u'x + u, \quad y_2'' = u''x + 2u'$$

پر کرتے ہیں۔

$$x^2(u''x + 2u') - x(u'x + u) + ux = 0$$

درج بالا کو ترتیب دیتے ہوئے  $xu$  اور  $-xu$  آپس میں کٹ جاتے ہیں اور  $x^3u'' + x^2u' = 0$  رہ جاتا  
ہے جس کو  $x^2$  سے تقسیم کرتے ہوئے

$$xu'' + u' = 0$$

ملتا ہے۔ اس میں  $u' = v$  پر کرتے ہوئے ایک درجی مساوات حاصل ہوتی ہے جس کو علیحدگی متغیرات کے ترکیب  
سے حل کرتے ہیں۔

$$xv' + v = 0, \quad \frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x}, \quad v = \frac{1}{x}$$

اس میں واپس  $v = u'$  پر کرتے ہوئے مکمل سے  $u$  حاصل کرتے ہیں۔

$$v = u' = \frac{1}{x}, \quad u = \ln|x|$$

یوں  $y_2 = x \ln|x|$  حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ  $y_1$  اور  $y_2$  کا حاصل تقسیم مستقل نہیں ہے لہذا یہ حل  
خطی طور غیر تابع ہیں اور یوں اساس حل  $y_1 = x$  ،  $y_2 = x \ln|x|$  ہے۔ دونوں بار مکمل لیتے ہوئے مکمل کا  
مستقل نہیں لکھا گیا چونکہ ہمیں اساس درکار ہے۔ عمومی مساوات لکھتے وقت مستقل لکھنا ضروری ہو گا۔

2.2. ایک حل معلوم ہونے کی صورت میں اساس دریافت کرنا۔ تخفیف درجہ

اس مثال میں ہم نے تخفیف درجہ کی ترکیب متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

$$(2.13) \quad y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

پر استعمال کی۔ درج بالا مساوات کو معیاری صورت میں لکھا گیا ہے جہاں پہلا جزو  $y''$  ہے جس کا عددی سر اکائی کے برابر ہے۔ نیچے اخذ کلیات مساوات کی معیاری صورت کے لئے حاصل کئے گئے ہیں۔ تصور کریں کہ کھلے وقفہ  $I$  پر ہمیں مساوات 2.13 کا ایک عدد حل  $y_1$  معلوم ہے اور ہم حل کا اساس جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی خاطر ہمیں  $I$  پر خطی طور غیر تابع دوسرا حل  $y_2$  درکار ہے۔ دوسرا حل حاصل کرنے کی خاطر ہم

$$y = y_2 = uy_1, \quad y' = y_2' = u'y_1 + uy_1', \quad y'' = y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$$

کو مساوات 2.13 میں پر کرتے ہوئے

$$(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + p(u'y_1 + uy_1') + q(uy_1) = 0$$

$u''$ ،  $u'$  اور  $u$  کے عددی سر اکٹھے کرتے ہیں۔

$$u''y_1 + u'(2y_1' + py_1') + u(y_1'' + py_1' + qy_1) = 0$$

چونکہ  $y_1$  مساوات 2.13 کا حل ہے لہذا آخری قوسین صفر کے برابر ہے لہذا

$$u''y_1 + u'(2y_1' + py_1') = 0$$

حاصل ہوتا ہے۔ اس کو  $y_1$  سے تقسیم کرتے ہوئے  $u' = v$  پر کرنے سے تخفیف شدہ<sup>18</sup> ایک درجی مساوات حاصل ہوتی ہے۔

$$v' + \left( \frac{2y_1'}{y_1} + p \right) v = 0$$

علیحدگی متغیرات کے بعد مکمل لینے سے

$$\frac{dv}{v} = - \left( \frac{2y_1'}{y_1} + p \right) dx, \quad \ln|v| = -2\ln|y_1| - \int p dx$$

یعنی

$$(2.14) \quad v = \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p dx}$$

ماتا ہے۔ چونکہ  $v = u'$  کے برابر ہے لہذا دوسرا حل

$$(2.15) \quad y_2 = y_1 u = y_1 \int v dx$$

ہو گا۔ حاصل تقسیم  $\frac{y_2}{y_1} = u = \int p dx$  مستقل مقدار نہیں ہو سکتا چونکہ  $v > 0$  ہے لہذا  $y_1$  اور  $y_2$  اساس حل ہیں۔

متجانس خطی دو درجی مساوات سے ایک درجی مساوات کا حصول ہم دیکھ چکے۔ آئیں تخفیف درجہ کے دو مثال دیکھیں جو خطی مساوات اور غیر خطی مساوات پر لاگو کی جاسکتی ہیں۔

مثال 2.7: دو درجی خطی یا غیر خطی مساوات  $F(x, y, y', y'')$  میں  $y$  صریحاً نہیں پایا جاتا۔ اس سے ایک درجی مساوات حاصل کریں۔

حل: چونکہ  $y$  صریحاً نہیں پایا جاتا لہذا اس کو  $F(x, y', y'')$  لکھ سکتے ہیں جس میں  $z = y'$  پر کرتے ہوئے ایک درجی مساوات  $F(x, z, z')$  حاصل ہوتی ہے۔ ایک درجی مساوات کے حل کے مکمل سے  $y$  حاصل ہو گا۔

مثال 2.8: دو درجی خطی یا غیر خطی مساوات  $F(x, y, y', y'')$  میں  $x$  صریحاً نہیں پایا جاتا۔ اس سے ایک درجی مساوات حاصل کریں۔

حل: چونکہ  $x$  صریحاً نہیں پایا جاتا لہذا اس کو  $F(y, y', y'')$  لکھ سکتے ہیں۔ ہم  $z = y' = \frac{dy}{dx}$  لیتے ہیں۔ یوں زنجیری تفریق<sup>19</sup> سے

$$\frac{dz}{dy} = \frac{d^2 y}{dx^2} \frac{dx}{dy} = \frac{y''}{z}$$

یعنی

$$y'' = z \frac{dz}{dy}$$

لکھا جاسکتا ہے۔  $z$  اور  $z_y$  کو دیے مساوات میں پر کرتے ہوئے ایک درجی مساوات  $F(y, z, z_y)$  ملتی ہے جس کا آزاد متغیر  $y$  ہے۔

---

## سوالات

سوال 2.1 تا سوال 2.7 سے ایک درجی مساوات حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔

سوال 2.1:

$$y'' - y' = 0$$

جواب:  $y = c_1 e^x + c_2$ 

سوال 2.2:

$$xy'' + y' = 0$$

جواب:  $y = c_1 \ln|x| + c_2$ 

سوال 2.3:

$$xy'' - 2y' = 0$$

جواب:  $y = c_1 x^3 + c_2$ 

سوال 2.4:

$$yy'' - (y')^2 = 0$$

جواب:  $y = c_2 e^{c_1 x}$ 

سوال 2.5:

$$y'' - (y')^3 \cos y = 0$$

جواب:  $\cos y + c_1 y = x + c_2$ 

سوال 2.6:

$$y'' - (y')^2 \cos y = 1$$

جواب:  $y = \ln \sec(x + c_1) + c_2$ 

سوال 2.7:

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0, \quad y_1 = x^2$$

جواب:  $y = c_1 x^2 + c_2 x$ 

قابل تخفیف سادہ تفرقی مساوات کے استعمال سوالات 2.8 تا سوال 2.11 دیتے ہیں۔

سوال 2.8: منحنی

کارٹیسائی محد کے محور سے گزرتی منحنی  $y'' + y' = 0$  کی مرکز پر ڈھلوان اکائی کے برابر ہے۔ منحنی کی مساوات حاصل کریں۔

جواب:  $y = 1 - e^{-x}$ 

سوال 2.9: لیزم

دو مقررہ نقاط سے لٹکی ہوئی زنجیری ڈوری سے بننے والا خم لیزم<sup>20</sup> کہلاتا ہے جسے مساوات  $y'' = k\sqrt{1 + y'^2}$  کے حل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مستقل  $k$  کی قیمت ڈوری کی تناؤ اور کمیت پر منحصر ہے۔ ڈوری نقطہ  $(1, 0)$  اور  $(-1, 0)$  سے لٹکی ہوئی ہے۔  $k = 1$  تصور کرتے ہوئے لیزم کی مساوات حاصل کریں۔

catenary<sup>20</sup>

2.2. ایک حل معلوم ہونے کی صورت میں اساس دریافت کرنا۔ تخفیف درجہ

جواب: زنجیر کے وسط یعنی  $x = 0$  پر ڈھلوان صفر کے برابر ہے۔ یوں  $y = -1 + \cosh x$  حاصل ہوتا ہے۔

سوال 2.10: حرکت

ایک چھوٹی جسامت کی چیز سیدھی لکیر پر یوں حرکت کرتی ہے کہ اس کی اسراع اور رفتار میں فرق ایک مثبت مستقل  $k$  کے برابر رہتی ہے۔ فاصلہ  $y(t)$  ابتدائی رفتار  $u$  اور ابتدائی فاصلہ  $y_0$  پر کس طرح منحصر ہے؟

$$y = (k + u)e^t + (y_0 - u) - k(t + 1) \quad \text{جواب:}$$

سوال 2.11: حرکت

ایک چھوٹی جسامت کی چیز سیدھی لکیر پر یوں حرکت کرتی ہے کہ اس کی اسراع کی قیمت رفتار کی قیمت کے مربع کے برابر رہتی ہے۔ فاصلے کی عمومی مساوات حاصل کریں۔

$$t = c_1 - \ln(t + c_2) \quad \text{جواب:}$$

سوال 2.12 تا سوال 2.15 میں ثابت کریں کہ دیے گئے تفاعل خطی طور غیر تابع ہیں اور یوں یہ حل کی اساس ہیں۔ ان ابتدائی قیمت سوالات کے حل لکھیں۔

سوال 2.12:

$$y'' + 9y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = -2; \quad \cos 3x \sin 3x$$

$$y = 5 \cos 3x - \frac{2}{3} \sin 3x \quad \text{جواب:}$$

سوال 2.13:

$$y'' - 2y' + y = 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1; \quad e^x, xe^x$$

$$y = e^{x-1}(x - 1) \quad \text{جواب:}$$

سوال 2.14:

$$x^2 y'' - x y' + y = 0, \quad y(1) = 3.2, \quad y'(1) = -1.5; \quad x, x \ln x$$

$$y = \frac{16}{5}x - \frac{47}{10}x \ln x \quad \text{جواب:}$$

سوال 2.15:

$$y'' + 2y' + 3y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -3; \quad e^{-x} \cos \sqrt{2}x, e^{-x} \sin \sqrt{2}x$$

$$y = e^{-x}(2 \cos \sqrt{2}x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2}x) \quad \text{جواب:}$$

## 2.3 مستقل عددی سروالے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

اب ایسے دو درجی متجانس تفرقی مساوات پر بات کرتے ہیں جن کے عددی سر  $a$  اور  $b$  مستقل مقدار ہیں۔

$$(2.16) \quad y'' + ay' + b = 0$$

یہ مساوات میکانی اور برقی ارتعاش میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قوت نمائی تفاعل  $y = e^{-kx}$  کے تفرق سے  $y' + ky = 0$  یعنی  $y' = -ke^{-kx} = -ky$  تفرقی مساوات حاصل ہوتا ہے۔ یوں  $y' + ky = 0$  کا حل  $y = e^{-kx}$  ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا مساوات 2.16 کا حل

$$(2.17) \quad y = e^{\lambda x}$$

ممکن ہے یا نہیں۔ یہ جاننے کی خاطر  $y = e^{\lambda x}$  اور اس کے تفرق

$$y' = \lambda e^{\lambda x}, \quad y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$$

کو مساوات 2.16 میں پر کرتے ہیں۔

$$(\lambda^2 + a\lambda + b)e^{\lambda x} = 0$$

کسی بھی محدود قیمت کے  $\lambda$  اور  $x$  کے لئے  $e^{\lambda x}$  صفر نہیں ہوگا لہذا اس مساوات کے دونوں اطراف صرف اس صورت برابر ہو سکتے ہیں جب  $\lambda$  امتیازی مساوات<sup>21</sup>

$$(2.18) \quad \lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

کا جذر ہو۔ اس دو درجی الجبرائی مساوات<sup>22</sup> کو حل کرتے ہیں۔

$$(2.19) \quad \lambda_1 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

یوں مساوات 2.16 کے حل

$$(2.20) \quad y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}$$

ہوں گے۔ انہیں مساوات 2.16 میں پر کرتے ہوئے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہی تفرقی مساوات کے حل ہیں۔

دو درجی الجبرائی مساوات 2.18 کے جذر کی تین ممکنہ قیمتیں ہیں جو  $a^2 - 4b$  کی علامت (±) پر منحصر ہیں۔

characteristic equation<sup>21</sup>  
quadratic equation<sup>22</sup>



2.3. مستقل عددی سروا لے متبانیس خطی سادہ تفرقی مساوات

• پہلی صورت: دو منفرد حقیقی جذر  $a^2 - 4c > 0$

• دوسری صورت: دوہرا حقیقی جذر  $a^2 - 4c = 0$

• تیسری صورت: جوڑی دار مخلوط جذر  $a^2 - 4c < 0$

آئیں ان تین صورتوں پر باری باری غور کریں۔

پہلی صورت: دو منفرد حقیقی جذر

اس صورت میں، چونکہ  $y_1$  اور  $y_2$  کسی بھی وقفے  $I$  پر معین ہیں (اور حقیقی ہیں) اور ان کا حاصل تقسیم مستقل قیمت نہیں ہے لہذا کسی بھی وقفے پر مساوات 2.16 کے حل کا اساس

$$(2.21) \quad y_1 = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2 = e^{\lambda_2 x}$$

ہو گا۔ یوں تفرقی مساوات کا عمومی حل درج ذیل ہو گا۔

$$(2.22) \quad y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$$

مثال 2.9: دو حقیقی منفرد جذر

مساوات  $y'' - 4y = 0$  کا حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کا امتیازی مساوات  $\lambda^2 - 4 = 0$  ہے جس کے جذر  $\lambda_1 = +2$  اور  $\lambda_2 = -2$  دو منفرد قیمتیں ہیں۔ یوں حل کا اساس  $y_1 = e^{2x}$  اور  $y_2 = e^{-2x}$  ہے جن سے تفرقی مساوات کا عمومی حل  $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$  لکھا جاسکتا ہے۔

مثال 2.10: ابتدائی قیمت مسئلہ۔ دو حقیقی منفرد جذر درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں۔

$$y'' + y' - 6 = 0, \quad y(0) = -4, \quad y'(0) = 5$$

حل: امتیازی مساوات لکھتے ہیں

$$\lambda^2 + \lambda - 6 = 0$$

جس کے جذر

$$\lambda_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 + 24}}{2} = 2, \quad \lambda_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 + 24}}{2} = -3,$$

ہیں۔ ان سے اساس حل  $y_1 = e^{2x}$ ،  $y_2 = e^{-3x}$  ملتا ہے جس سے عمومی حل حاصل ہوتا ہے۔

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x}$$

ابتدائی قیمتیں پر کرتے ہوئے مستقل حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ  $y' = 2c_1 e^{2x} - 3c_2 e^{-3x}$  ہے لہذا

$$y(0) = c_1 + c_2 = -4$$

$$y'(0) = 2c_1 - 3c_2 = 5$$

لکھا جائے گا۔ ان ہمزاد مساوات کو حل کرتے ہوئے  $c_1 = -\frac{7}{5}$  اور  $c_2 = -\frac{13}{5}$  ملتا ہے جن سے مخصوص حل لکھتے ہیں۔


$$y = -\frac{7}{5} e^{2x} - \frac{13}{5} e^{-3x}$$

مخصوص حل کو شکل 2.2 میں دکھایا گیا ہے جو ابتدائی قیمتوں پر پورا اترتا ہے۔

دوسری صورت: دوہرا حقیقی جذر

اگر  $a^2 - 4c = 0$  ہو تب مساوات 2.19 سے  $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a}{2}$  ملتا ہے جو واحد حل

$$y_1 = e^{-\frac{a}{2}x}$$



شکل 2.2: مثال 2.10 کا مخصوص حل۔

دیتا ہے۔ ہمیں اساس کے لئے دو حل درکار ہیں۔ دوسرا حل تخفیف درجہ کی ترکیب سے حاصل کیا جائے گا۔ اس ترکیب پر بحث ہو چکی ہے۔ یوں ہم دوسرا حل  $y_2 = uy_1$  تصور کرتے ہیں۔ مساوات 2.16 میں

$$y_2 = uy_1, \quad y_2' = u'y_1 + uy_1', \quad y_2'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1''$$

پر کرتے

$$(u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'') + a(u'y_1 + uy_1') + b(uy_1) = 0$$

ہوئے  $u''$ ،  $u'$  اور  $u$  کے عددی سراکٹھے کرتے ہیں۔

$$(2.23) \quad u''y_1 + u'(2y_1' + ay_1) + u(y_1'' + ay_1' + by_1) = 0$$

چونکہ  $y_1$  تفرقی مساوات کا حل ہے لہذا آخری قوسین صفر کے برابر ہے۔ اب پہلی قوسین پر غور کرتے ہیں۔ چونکہ  $y_1 = e^{-\frac{a}{2}x}$  لہذا  $y_1' = -\frac{a}{2}y_1$  ہو گا۔ ان قیمتوں کو پہلی قوسین میں پر کرتے

$$2y_1' + ay_1 = 2(-\frac{a}{2}y_1) + ay_1 = 0$$

ہوئے یہ قوسین بھی صفر کے برابر حاصل ہوتی ہے۔ یوں مساوات 2.23 سے  $u''y_1 = 0$  یعنی  $u'' = 0$  حاصل ہوتا ہے۔ دو مرتبہ مکمل لیتے ہوئے  $u = c_1x + c_2$  ملتا ہے۔ دوسرا خطی طور غیر تابع حل  $y_2 = uy_1$  حاصل کرتے ہوئے ہم  $c_1 = 1$  اور  $c_2 = 0$  چن سکتے ہیں جن سے  $u = x$  اور  $y_2 = xy_1$  حاصل ہوتے ہیں۔ چونکہ  $y_1$  اور حاصل کردہ  $y_2 = xy_1$  کا حاصل تقسیم مستقل مقدار نہیں ہے لہذا یہ دونوں خطی

طور غیر تابع ہیں اور انہیں اساس لیا جا سکتا ہے۔ یوں دوہرے جذر کی صورت میں کسی بھی وقفے پر مساوات 2.16 کے حل کا اساس

$$y_1 = e^{-\frac{a}{2}x}, \quad y_2 = xe^{-\frac{a}{2}x}$$

اور عمومی حل درج ذیل ہو گا۔

$$(2.24) \quad y = (c_1 + c_2x)e^{-\frac{a}{2}x}$$

مثال 2.11: دوہرے جذر کی صورت میں عمومی حل  
سادہ تفرقی مساوات  $y'' + 10y' + 25 = 0$  کا امتیازی مساوات  $\lambda^2 + 10\lambda + 25 = 0$  ہے جس کو  $(\lambda + 5)^2 = 0$  لکھ کر دوہرا جذر  $\lambda_1 = \lambda_2 = -5$  حاصل ہوتا ہے۔ یوں تفرقی مساوات کے حل کا اساس  $y_1 = e^{-5x}$ ،  $y_2 = xe^{-5x}$  اور اس کا عمومی حل  $y = (c_1 + c_2x)e^{-5x}$  ہے۔

مثال 2.12: دوہرے جذر کی صورت میں مخصوص حل کا حصول  
دیے گئے تفرقی مساوات کا مخصوص حل دریافت کریں۔

$$y'' + 0.2y' + 0.01y = 0, \quad y(0) = 10, \quad y'(0) = -4$$

حل: امتیازی مساوات  $\lambda^2 + 0.2\lambda + 0.01 = 0$  یعنی  $(\lambda + 0.1)^2 = 0$  سے  $\lambda_1 = \lambda_2 = -0.1$  دوہرا جذر حاصل ہوتا ہے جس سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$y = (c_1 + c_2x)e^{-0.1x}$$

عمومی حل کا جذر لکھتے ہیں جو مخصوص حل کے حصول میں درکار ہے۔

$$y' = c_2e^{-0.1x} - 0.1(c_1 + c_2x)e^{-0.1x}$$



شکل 2.3: مثال 2.12 کا مخصوص حل۔

عمومی حل اور عمومی حل کے تفرق میں ابتدائی قیمتیں پر کرتے ہوئے  $c_1$  اور  $c_2$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y(0) = c_1 = 10$$

$$y'(0) = c_2 - 0.1c_1 = -4, \quad c_2 = -3$$

یوں مخصوص حل درج ذیل ہو گا۔

$$y = (10 - 3x)e^{-0.1x}$$

مخصوص حل کو شکل 2.3 میں دکھایا گیا ہے۔

تیسری صورت: مخلوط جوڑی دار جذر

اتمازی مساوات 2.18 میں  $a^2 - 4c$  کی قیمت منفی ہونے کی صورت میں مخلوط جوڑی دار جذر  $\lambda = -\frac{a}{2} \mp i\omega$  ملتے ہیں جہاں  $\omega^2 = b - \frac{a^2}{4}$  کے برابر ہے۔ ان سے مخلوط اساس لکھتے ہیں۔

$$(2.25) \quad y_{m1} = e^{(-\frac{a}{2} + i\omega)x}, \quad y_{m2} = e^{(-\frac{a}{2} - i\omega)x}$$

اس مخلوط اساس سے حقیقی اساس حاصل کیا جائے گا۔ ایسا کرنے کی خاطر ریاضی کے چند کلیات پر غور کرتے ہیں۔ تفاعل  $e^z$ ، جہاں  $z = x + iy$  مخلوط عدد ہے جبکہ  $x$  اور  $y$  حقیقی اعداد ہیں، کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy}$$

$e^{iy}$  کی مکلازن تسلسل<sup>23</sup> لکھ کر حقیقی اجزاء اور خیالی اجزاء کو علیحدہ علیحدہ قوسین میں اکٹھے کرتے ہیں۔ یہاں  $i^2 = -1$ ،  $i^3 = -i$ ،  $i^4 = 1$  لئے گئے ہیں۔

$$\begin{aligned} e^{iy} &= 1 + \frac{iy}{1!} + \frac{(iy)^2}{2!} + \frac{(iy)^3}{3!} + \frac{(iy)^4}{4!} + \frac{(iy)^5}{5!} \dots \\ &= \left(1 - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^4}{4!} - + \dots\right) + i \left(\frac{y}{1!} - \frac{y^3}{3!} + \frac{y^5}{5!} - + \dots\right) \\ &= \cos y + i \sin y \end{aligned}$$

آخری قدم پر آپ تسلی کر لیں کہ پہلی قوسین  $\cos y$  کی مکلازن تسلسل دیتی ہے جبکہ دوسری قوسین  $\sin y$  کی مکلازن تسلسل دیتی ہے۔ آپ اس کتاب میں آگے پڑھیں گے کہ درج بالا تسلسل میں اجزاء کی ترتیب بدلی جاسکتی ہے۔ یوں ہم یولر مساوات<sup>24</sup>

$$(2.26) \quad e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ

$$(2.27) \quad e^{-iy} = \cos(-y) + i \sin(-y) = \cos y - i \sin y$$

مساوات 2.26 اور مساوات 2.27 کو جمع اور تفریق کرتے ہوئے درج ذیل کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$(2.28) \quad \cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \quad \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$$

ہو گا۔ یہ سب جاننے کے بعد آئیں مساوات 2.25 میں دیے مخلوط اساس پر دوبارہ غور کریں۔

$$y_{m1} = e^{(-\frac{a}{2} + i\omega)x} = e^{-\frac{a}{2}x} e^{i\omega x} = e^{-\frac{a}{2}x} (\cos \omega x + i \sin \omega x)$$

$$y_{m2} = e^{(-\frac{a}{2} - i\omega)x} = e^{-\frac{a}{2}x} e^{-i\omega x} = e^{-\frac{a}{2}x} (\cos \omega x - i \sin \omega x)$$

چونکہ اساس کے اجزاء کو مستقل (حقیقی یا خیالی یا مخلوط) سے ضرب دے کر جمع کرتے ہوئے نیا حل حاصل کیا جاسکتا ہے لہذا ہم درج بالا دونوں اجزاء کو مستقل  $\frac{1}{2}$  سے ضرب دے کر جمع کرتے ہوئے ایک نیا اور حقیقی حل  $y_1$

دریافت کرتے ہیں۔

$$y_1 = \frac{1}{2}y_{m1} + \frac{1}{2}y_{m2} = e^{-\frac{a}{2}x} \cos \omega x$$

اسی طرح مخلوط اساس کے پہلے جزو کو مستقل  $\frac{1}{2i}$  اور دوسرے جزو کو مستقل  $-\frac{1}{2i}$  سے ضرب دیتے ہوئے جمع کر کے نیا اور حقیقی حل  $y_2$  حاصل کرتے ہیں۔

$$y_2 = \frac{1}{2i}y_{m1} - \frac{1}{2i}y_{m2} = e^{-\frac{a}{2}x} \sin \omega x$$

درج بالا حاصل کردہ حقیقی تفاعل

$$(2.29) \quad y_1 = e^{-\frac{a}{2}x} \cos \omega x \quad y_2 = e^{-\frac{a}{2}x} \sin \omega x$$

کو از خود حل کا اساس تصور کیا جاسکتا ہے۔ یہاں غور کریں کہ ہم نے مخلوط جذر  $\lambda = (-\frac{a}{2} \pm i\omega)x$  سے حقیقی اساس (مساوات 2.29) حاصل کیا ہے۔ اس حقیقی اساس کو استعمال کرتے ہوئے عمومی حل لکھتے ہیں۔

$$(2.30) \quad y = e^{-\frac{a}{2}x} (c_1 \cos \omega x + c_2 \sin \omega x)$$

مثال 2.13: مخلوط جذر، ابتدائی قیمت مسئلہ  
درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلے کو حل کریں۔

$$y'' + 0.36y' + 9.0324y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3$$

حل: امتیازی مساوات  $\lambda^2 + 0.36\lambda + 9.0324 = 0$  کے مخلوط جذر  $\lambda = -0.18 \pm i3$  ہیں لہذا عمومی حل

$$y = e^{-0.18x} (c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$$

ہو گا۔ مخصوص حل حاصل کرنے کی خاطر  $c_1$  اور  $c_2$  درکار ہیں جنہیں عمومی مساوات میں ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ پہلے ابتدائی معلومات سے

$$y(0) = e^0 (c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0) = 0, \quad c_1 = 0$$



شکل 2.4: مثال 2.13 کا مخصوص حل۔

ماتا ہے۔ عمومی حل کے تفرق

$$y' = -0.5e^{-0.5x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x) + e^{-0.5x}(-3c_1 \sin 3x + 3c_2 \cos 3x)$$

میں دوسری ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے

$$y' = -0.5e^0(0 \cos 0 + c_2 \sin 0) + e^0(0 \sin 0 + 3c_2 \cos 0) = 3, \quad c_2 = 1$$

ماتا ہے۔ یوں مخصوص حل درج ذیل ہو گا۔

$$y = e^{-0.18x} \sin 3x$$

شکل 2.4 میں مخصوص حل دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ، نقطہ دار لکیروں سے، سائن نما منحنی کے مثبت چوٹیوں کو چھوتا ہوا غلاف<sup>25</sup>  $e^{-0.18x}$  اور منفی چوٹیوں کو چھوتا ہوا غلاف<sup>26</sup>  $-e^{-0.18x}$  بھی دکھائے گئے ہیں۔ مخصوص حل (x کو t لیتے ہوئے) قصری ارتعاش<sup>26</sup> کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر y فاصلے کو ظاہر کرتی ہو تب یہ میکانی قصری ارتعاش ہوگی اور اگر y برقی رویا برقی دباؤ ہو تب یہ برقی قصری ارتعاش ہوگی۔

<sup>25</sup>envelope  
<sup>26</sup>damped oscillations



جدول 2.1: تین صورتوں کی تفصیل

صورت	مساوات 2.18 کے جذر	مساوات 2.16 کی اساس	مساوات 2.16 کا عمومی حل
پہلی	منفرد حقیقی $\lambda_1, \lambda_2$	$e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}$	$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$
دوسری	دوہرہ جذر $\lambda = -\frac{a}{2}$	$x e^{-\frac{a}{2} x}, e^{-\frac{a}{2} x}$	$y = (c_1 + c_2 x) e^{-\frac{a}{2} x}$
تیسری	جوڑی دار مخلوط $\lambda = -\frac{a}{2} \pm i\omega$	$e^{-\frac{a}{2} x} \cos \omega x, e^{-\frac{a}{2} x} \sin \omega x$	$y = e^{-\frac{a}{2} x} (c_1 \cos \omega x + c_2 \sin \omega x)$

مثال 2.14: مخلوط جذر

سادہ تفرقی مساوات

$$y'' + \omega^2 y = 0, \quad (\omega \text{ غیر صفر مستقل ہے})$$

کا عمومی حل درج ذیل ہے۔

$$y = c_1 \cos \omega x + c_2 \sin \omega x$$

جدول 2.1 میں درج بالا تین صورتوں کی تفصیل اکٹھی کی گئی ہے۔ یہ تین اقسام میکانی ارتعاش یا برقی ارتعاش کو ظاہر کرتی ہیں۔ آپ تفرقی مساوات کی قوت یہاں سے جان سکتے ہیں۔ آپس میں بالکل مختلف میدانوں (مثلاً میکانی اور برقی) کے مسائل ایک طرز کی تفرقی مساوات سے ظاہر کئے جاسکتے ہیں۔

## سوالات

سوال 2.16 تا سوال 2.24 کے عمومی حل حاصل کریں۔ انہیں واپس تفرقی مساوات میں پر کرتے ہوئے ان کی درستگی ثابت کریں۔

سوال 2.16:

$$y'' + 4y = 0$$

جواب:  $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$

سوال 2.17:

$$4y'' - 9y = 0$$

جواب:  $y = c_1 e^{\frac{3}{2}x} + c_2 e^{-\frac{3}{2}x}$

سوال 2.18:

$$y'' + 5y' + 6y = 0$$

جواب:  $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-3x}$

سوال 2.19:

$$y'' + 2\pi y' + \pi^2 y = 0$$

جواب:  $y = (c_1 + c_2 x) e^{-\pi x}$

سوال 2.20:

$$y'' - 6y' + 9y = 0$$

جواب:  $y = (c_1 + c_2 x) e^{3x}$

سوال 2.21:

$$4y'' - 12y' + 9y = 0$$

جواب:  $y = (c_1 + c_2 x) e^{\frac{3}{2}x}$

سوال 2.22:

$$4y'' + 4y' - 3y = 0$$

جواب:  $y = c_1 e^{\frac{x}{2}} + c_2 e^{-\frac{3}{2}x}$

سوال 2.23:

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

جواب:  $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{2x}$

2.3. مستقل عددی سرولے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

سوال 2.24:

$$9y'' - 30y' + 25y = 0$$

جواب:  $y = (c_1 + c_2x)e^{\frac{5}{3}x}$

سوال 2.25 تا سوال 2.29 میں اساس سے تفرقی مساوات  $y'' + ay' + by = 0$  حاصل کریں۔

سوال 2.25:

$$e^{0.2x}, \quad e^{-0.5x}$$

جواب:  $y'' + 0.3y' - 0.1y = 0$

سوال 2.26:

$$e^{-0.66x}, \quad e^{-0.32x}$$

جواب:  $y'' + 0.98y' + 0.2112y = 0$

سوال 2.27:

$$\cos(4\pi x), \quad \sin(4\pi x)$$

جواب:  $y'' + 16\pi^2y = 0$

سوال 2.28:

$$e^{(-2+i3)x}, \quad e^{(-2-i3)x}$$

جواب:  $y'' + 4y'' + 13y = 0$

سوال 2.29:

$$e^{-1.7x} \cos 6.2x, \quad e^{-1.7x} \sin 6.2x$$

جواب:  $y'' + 3.4y'' + 41.33y = 0$

سوال 2.30 تا سوال 2.37 ابتدائی قیمت سوالات ہیں۔ ان کے مخصوص حل دریافت کریں۔

سوال 2.30:

$$y'' + 2y = 0, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = 2$$

جواب:  $y = 5 \cos \sqrt{2}x + \sqrt{2} \sin \sqrt{2}x$

سوال 2.31:

$$y'' - 25y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -3$$

جواب:  $y = 0.7e^{5x} + 1.3e^{-5x}$

سوال 2.32:

$$y'' - y'' - 6y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$$

جواب:  $y = \frac{1}{5}(e^{3x} - e^{-2x})$

سوال 2.33:

$$4y'' + 4y'' + 37y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3$$

جواب:  $y = e^{-\frac{x}{2}} \sin 3x$

سوال 2.34:

$$9y'' + 12y'' + 49y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$$

جواب:  $y = e^{-\frac{2}{3}x} (2 \cos \sqrt{5}x + \frac{1}{3\sqrt{5}} \sin \sqrt{5}x)$

سوال 2.35:

$$y'' - 6y'' + 25y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.1$$

جواب:  $y = \frac{1}{40}e^{3x} \sin 4x$

سوال 2.36:

$$y'' + y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

2.3. مستقل عددی سرواے متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات

جواب:  $y = \cos x + \sin x$

سوال 2.37:

$$8y'' - 2y' - y = 0, \quad y(0) = 2.2, \quad y'(0) = 3.4$$

جواب:  $y = \frac{79}{15}e^{\frac{x}{2}} - \frac{46}{15}e^{-\frac{x}{4}}$

عمومی حل کے حصول میں خطی طور غیر تابع تفاعل نہایت اہم ہیں۔ صرف ایسے تفاعل سے اساس حاصل ہوتا ہے۔ دیے وقفے پر سوال 2.38 تا سوال 2.42 میں دیے تفاعل میں خطی طور تابع اور غیر تابع کی نشاندہی کریں۔

سوال 2.38:

$$\cos kx, \quad \sin kx, \quad -\infty < x < \infty$$

جواب: چونکہ  $\frac{\sin kx}{\cos kx}$  کی قیمت  $x$  تبدیل کرنے سے تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ تفاعل خطی طور غیر تابع ہیں۔

سوال 2.39:

$$e^{kx}, \quad e^{-kx} \quad -\infty < x < \infty$$

جواب: خطی طور غیر تابع

سوال 2.40:

$$x, \quad x^2 \quad x > 1$$

جواب: خطی طور غیر تابع

سوال 2.41:

$$x \ln x, \quad x^2 \ln x \quad x > 1$$

جواب: خطی طور غیر تابع



شکل 2.5: سوال 2.43 کے منحنی حل۔

سوال 2.42:

$$x \ln x, \quad x \ln x^2 \ln x \quad x > 1$$

جواب: خطی طور تابع

سوال 2.43: غیر مستحکم صورت حال

ابتدائی قیمت مسئلہ  $y'' - 4y = 0$  میں ابتدائی قیمتیں  $y(0) = 1$  اور  $y'(0) = -2$  لیتے ہوئے مخصوص حل حاصل کریں۔ مخصوص حل کو دوبارہ ابتدائی معلومات  $y(0) = 1.001$  اور  $y'(0) = -1.998$  کے لئے حاصل کریں۔

جوابات:  $y = e^{-2x}$  اور  $y = \frac{1}{1000}e^{2x} + e^{-2x}$ ؛ شکل 2.5 میں دونوں حل دکھائے گئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی قیمتوں میں انتہائی کم فرق حل پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ یہ غیر مستحکم<sup>27</sup> صورت کو ظاہر کرتی ہے۔ زلزلے میں غیر مستحکم عمارتیں انہیں وجوہات پر ڈھیر ہوتی ہیں۔ فضا میں ہوا کا دباؤ، درجہ حرارت اور نمی کی تناسب بھی غیر مستحکم صورت پیدا کرتے ہوئے تباہ کن آندھیوں کا سبب بنتی ہیں۔

سوال 2.44: استمراری مساوات کے جذر  $\lambda_1 = -2$  اور  $\lambda_2 = 3$  ہیں۔ مساوات 2.16 حاصل کریں۔

$$y'' - y' - 6y = 0 \quad \text{جواب:}$$

instability<sup>27</sup>

سوال 2.45: استمراری مساوات کے جذر  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$  ہیں۔ مساوات 2.16 میں  $a$  اور  $b$  حاصل کریں۔ یوں جذر جانتے ہوئے تفرقی مساوات حاصل کی جاسکتی ہے۔

$$b = \lambda_1 \lambda_2, \quad a = -\lambda_1 - \lambda_2$$

سوال 2.46: تفرقی مساوات  $y'' + ky' = 0$  کو موجودہ طریقے سے حل کریں۔ اسی کو تخفیف درجہ کی ترکیب سے بھی حل کریں۔ دونوں جواب کیوں یکساں ہونا ضروری ہے۔

$$y = c_1 + c_2 e^{-kx} \text{؛ یکتائیت۔}$$

سوال 2.47: دوہرا جذر کو منفرد  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$  کی وہ صورت تصور کی جاسکتی ہے جب  $\lambda_2 \rightarrow \lambda_1$  ہو۔  $\lambda_2 = \lambda_1 + \Delta\lambda$  لیتے اور ایک حل  $e^{\lambda_1 x}$  لیتے ہوئے اساس کا دوسرا رکن  $x e^{\lambda_1 x}$  تلاش کریں۔

حل: دوسرا حل  $e^{\lambda_2 x} = e^{(\lambda_1 + \Delta\lambda)x} = e^{\lambda_1 x} e^{\Delta\lambda x}$  ہے۔  $e^{\Delta\lambda x}$  کا مکملارن تسلسل لیتے ہوئے  $\Delta\lambda \rightarrow 0$  کی بنا صرف پہلے دو ارکان لیتے ہیں۔ یوں  $1 + \Delta\lambda x \approx 1 + \frac{\Delta\lambda x}{1!} + \frac{(\Delta\lambda x)^2}{2!} + \dots$  ہو گا اور  $e^{\Delta\lambda x} = 1 + \frac{\Delta\lambda x}{1!} + \frac{(\Delta\lambda x)^2}{2!} + \dots$  ہو گا اور  $e^{\lambda_2 x} = e^{\lambda_1 x} + \Delta\lambda x e^{\lambda_1 x}$  لکھا جاسکتا ہے۔ اب چونکہ  $e^{\lambda_1 x}$  پہلے سے اساس کا حصہ ہے لہذا اساس کا دوسرا رکن  $x e^{\lambda_1 x}$  ہو گا جہاں  $\Delta\lambda$  کو مستقل تصور کرتے ہوئے رد کیا جاتا ہے

## 2.4 تفرقی عامل

آپ  $y = \sin x$  یا  $y = \frac{df(x)}{dx}$  کے عمل سے بخوبی واقف ہیں۔ پہلی مثال میں کسی مقدار یا تفاعل  $x$  پر عامل  $\sin$  عمل کرتے ہوئے ایک نیا تفاعل دیتا ہے۔ یوں  $x = \frac{\pi}{2}$  پر  $\sin \frac{\pi}{2} = 1$  حاصل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عامل  $\sin$  تفاعل  $x$  کے نقطہ  $x = \frac{\pi}{2}$  سے مبدل تفاعل  $y$  کا نقطہ  $y = 1$  دیتا ہے۔ اسی طرح عامل  $\frac{d}{dx}$  تفاعل  $x^3$  پر عمل کرتے ہوئے تفاعل  $3x^2$  دیتا ہے۔

یہ بتلاتا چلوں کہ ریاضیات اور طبیعیات میں عامل کا استعمال نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں بالخصوص کوانٹم میکانیٹ<sup>29</sup> کا ذکر کرنا لازم جہاں عامل کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔

<sup>28</sup>operator  
<sup>29</sup>quantum mechanics

اس کتاب میں ہم صرف تفرقی عامل  $D^{30}$  پر بحث کریں گے جہاں  $D = \frac{d}{dx}$  ہے۔ یوں ایک درجی تفرقی

$$(2.31) \quad Dy = y' = \frac{dy}{dx}$$

لکھا جائے گا۔ اسی طرح دو درجی تفرقی  $D^2y = D(Dy) = y''$  اور تین درجی تفرقی  $D^3y = y'''$  لکھا جائے گا۔ اس طرح  $D \sin x = \cos x$  اور  $D^2 \sin x = -\sin x$  ہو گا۔

خطی متجانس مساوات  $y'' + ay' + by = 0$  جہاں  $a$  اور  $b$  مستقل مقدار ہیں میں دو درجی تفرقی عامل

$$L = P(D) = D^2 + aD + bI$$

متعارف کرتے ہیں جہاں  $I$  مماثلی عامل  $^{31}$  ہے جس کی تعریف  $Iy = y$  ہے۔ اس طرح دیے گئے تفرقی مساوات کو درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(2.32) \quad Ly = P(D)y = (D^2 + aD + bI)y = 0$$

$L$  خطی عامل اور  $P$  کثیر رکنی  $^{32}$  ہے۔ یوں اگر  $Lw$  اور  $Ly$  پائے جاتے ہوں (یعنی  $w$  اور  $y$  دو مرتبہ قابل تفرق ہوں) تب  $L(cy + kw)$  بھی پایا جاتا ہے جہاں  $c$  اور  $k$  کوئی مستقل ہیں۔ مزید درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(2.33) \quad L(cy + kw) = cLy + kLw$$

چونکہ  $De^{\lambda x} = \lambda e^{\lambda x}$  اور  $D^2e^{\lambda x} = \lambda^2 e^{\lambda x}$  ہیں لہذا

$$(2.34) \quad \begin{aligned} Le^{\lambda x} &= (D^2 + aD + bI)e^{\lambda x} \\ &= (\lambda^2 + a\lambda + b)e^{\lambda x} = P(\lambda)e^{\lambda x} = 0 \end{aligned}$$

ہو گا۔ حصہ 2.3 میں بھی ہم نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ  $e^{\lambda x}$  صرف اور صرف اس صورت اس تفرقی مساوات کا حل ہو گا اگر  $\lambda$  امتیازی مساوات  $P(\lambda) = 0$  کا جذر ہو۔

یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ  $P(\lambda)$  عام الجبرائی کثیر رکنی ہے جس کی تجزی  $^{33}$  کی جاسکتی ہے۔  $\lambda$  کی جگہ  $D$  پر کرنے سے کثیر رکنی عامل حاصل ہوتا ہے۔

<sup>30</sup>differential operator  
<sup>31</sup>identity operator  
<sup>32</sup>polynomial  
<sup>33</sup>factorization



مثال 2.15: تفرقی مساوات کا حل بذریعہ تجزی  
کثیر رکنی  $P(D) = D^2 + 4D - 21I$  کی تجزی سے  $P(D) = 0$  کو حل کریں۔

حل:  $I^2 = 1$  لیتے ہوئے  $D^2 + 4D - 21I = (D - 3)(D + 7)$  لکھا جاسکتا ہے۔ اب  $(D - 3)y = y' - 3y = 0$  کا حل  $y_1 = e^{3x}$  اور  $(D + 7)y = y' + 7y = 0$  کا حل  $y_2 = e^{-7x}$  ہے۔ یہ جوابات کسی بھی وقفے پر حل کی اساس ہیں۔ انہیں تفرقی مساوات حاصل کریں۔  
 $(D - 3)(D + 7)y = (D - 3)(y' + 7y) = y'' + 7y' - 3y' - 21y = y'' + 4y' - 21y = 0$

مساوات 2.32 میں کثیر رکنی کے عددی سر مستقل مقدار ہیں۔ ایسی صورت میں تفرقی عامل کے استعمال سے تفرقی مساوات حل کرنا نہایت آسان ثابت ہوتا ہے۔ عددی سر مستقل نہ ہونے کی صورت میں تفرقی عامل کا استعمال نہایت پیچیدہ ثابت ہوتا ہے جس پر اس کتاب میں تبصرہ نہیں کیا جائے گا۔

### سوالات

سوال 2.48 تا سوال 2.52 دیے تفاعل پر دیا تفرقی عامل لاگو کریں۔

سوال 2.48:

$$D + 2I; \quad x^3, \quad \cos 5x, \quad e^{-kx}, \quad \cosh x$$

جوابات:  $3x^2 + 2x^3$  ،  $-5 \sin 5x + 2 \cos 5x$  ،  $(2 - k)e^{-kx}$  ،  $\sinh x + 2 \cosh x$

سوال 2.49:

$$D^2 - 3D; \quad 2x^4 - x, \quad 2 \sinh 2x - \cos 5x$$

جوابات:  $24x^2 - 24x^3 + 3$  ،  $-15 \sin 5x - 12 \cosh 2x + 25 \cos 5x + \sinh 2x$

سوال 2.50:

$$(D + 2I)^2; \quad e^{3x}, \quad xe^{2x}$$

جوابات:  $25e^{3x}$  ،  $(12x + 8)e^{2x}$ 

سوال 2.51:

$$(D - 3I)^2; \quad e^{2x}, \quad xe^{3x}$$

جوابات:  $e^{2x}$  ، 0

سوال 2.52:

$$(D + I)(D - 2I); \quad e^{2x}, \quad xe^{2x}$$

جوابات:  $-2e^{2x}$  ،  $2(1 - x)e^{2x}$ 

سوال 2.53 تا سوال 2.57 کی تجزی حاصل کرتے ہوئے حل کریں۔

سوال 2.53:

$$(D^2 - 9I)y = 0$$

جواب:  $y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-3x}$ 

سوال 2.54:

$$(D^2 + 4D + 4I)y = 0$$

جواب: دوہرا جذر پایا جاتا ہے لہذا دوسرا حل  $xe^{2x}$  لیتے ہوئے  $y = (c_1 + c_2 x)e^{2x}$  ملتا ہے۔

سوال 2.55:

$$(D^2 + 4D + 13I)y = 0$$

جواب:  $y = e^{-2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$ 

سوال 2.56:


$$(4D^2 + 4D - 17I)y = 0$$

جواب:  $y = e^{\frac{x}{2}}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$ 

سوال 2.57:

$$(9D^2 + 12D + 4I)y = 0$$

جواب: دوہرا جذر پایا جاتا ہے۔  $y = (c_1 + c_2 x)e^{-\frac{2}{3}x}$



شکل 2.6: اسپرنگ اور کمیت کا غیر قسری نظام۔

## 2.5 اسپرنگ سے جڑی کمیت کی آزادانہ ارتعاش

مستقل قیت کے عددی سروالے خطی سادہ تفرقی مساوات میکانی ارتعاش میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حصے میں اسپرنگ سے جڑی کمیت کی حرکت پر غور کیا جائے گا۔ اس نظام کو اسپرنگ اور کمیت کا نظام کہا جائے گا جسے شکل 2.6 میں دکھایا گیا ہے۔

ایک عام اسپرنگ جو لمبائی میں اضافہ اور کمی کو روکتا ہو کو شکل 2.6 میں مستحکم سلاخ سے لٹکایا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کی چلی سر سے کمیت  $m$  کی لوہے کا گیند لٹکانے سے اسپرنگ کی لمبائی میں  $s_0$  اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ساکن نظام میں اسپرنگ کے نچلے سر کو  $y = 0$  تصور کیا جاتا ہے۔ ہم نیچے رخ کو مثبت رخ تصور کرتے ہیں۔ یوں نیچے رخ قوت کو مثبت اور اوپر رخ قوت کو منفی تصور کیا جائے گا۔ اسی طرح مقام  $y = 0$  سے نیچے رخ فاصلہ  $y$  مثبت ہو گا۔ مزید اسپرنگ کی کمیت کو گیند کی کمیت سے اتنا کم تصور کیا جاتا ہے کہ اسپرنگ کی کمیت کو درج ذیل تبصرے میں رد کیا جاسکتا ہے۔

ساکن حالت میں اسپرنگ پر نیچے رخ قوت  $mg$  عمل کرتا ہے جس سے اسپرنگ کی لمبائی میں  $s_0$  اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  ثقلی اسراع اور  $mg$  گیند کا وزن ہے۔ اسپرنگ کی لمبائی میں اضافے کی وجہ

سے، قانون ہک<sup>34</sup> کے تحت<sup>35</sup>، اسپرنگ اوپر رخ بحالی قوت<sup>36</sup>  $F_0 = -ks_0$  پیدا کرتا ہے جہاں  $k$  اسپرنگ مستقلہ<sup>37</sup> ہے جس کو  $\text{kg s}^{-2}$  یعنی  $\text{Nm}^{-1}$  میں ناپا جاتا ہے۔ بحالی قوت اسپرنگ کی لمبائی میں تبدیلی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ قوت  $mg$  مثبت رخ ہے لہذا اس کو مثبت لکھا گیا ہے جبکہ قوت  $-ks_0$  منفی رخ ہے لہذا اس کو منفی لکھا گیا ہے۔ ان قوتوں کا مجموعہ صفر  $mg - ks_0 = 0$  کے برابر ہوتا ہے۔ اگر ان قوتوں کا مجموعہ صفر کے برابر نہ ہوتا تو گیند ساکن نہ ہوتا بلکہ نیوٹن کے قانون  $F = my''$  کے تحت حرکت کرتا۔ طاقتور اسپرنگ کے مستقلہ  $k$  کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ان دونوں قوتوں کی مقدار گیند کی حرکت سے تبدیل نہیں ہوتی لہذا ان کا مجموعہ ہر وقت صفر کے برابر ہو گا۔ یوں گیند کی حرکت میں ان دونوں قوتوں کا کوئی کردار نہیں ہے لہذا ان پر مزید بات نہیں کی جائے گی۔

فرض کریں کہ گیند کو نیچے رخ کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے۔ شکل 2.6 میں گیند کو ساکن مقام سے لحاقی طور  $y$  فاصلے پر دکھایا گیا ہے۔ اس لمحہ اسپرنگ اضافی بحالی قوت  $F_1 = -ky$  پیدا کرتا ہے جس کے تحت گیند نیوٹن کے قانون

(2.35)

$$F_1 = ma = my''$$

کے تحت حرکت کرے گا جہاں  $y'' = \frac{d^2 y}{dt^2}$  ہے۔

### بلا تقصیر حرکت کی سادہ تفرقی مساوات

ہر نظام تقصیری ہوتا ہے ورنہ حرکت کبھی بھی نہ رکتی۔ نہایت کم تقصیری نظام جس کے حرکت کا مطالعہ نسبتاً کم دورانیے کے لئے کیا جائے میں تقصیر کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ یوں اس کو بلا تقصیر تصور کیا جاسکتا ہے۔ شکل 2.6 کا نظام بلا تقصیر نظام کی عمدہ مثال ہے۔ نیوٹن کے قانون کو بروئے کار لیتے ہوئے اس نظام کی تفرقی مساوات لکھتے ہیں۔

(2.36)

$$my'' + ky = 0$$

یہ مستقل عددی سروالا خطی متجانس سادہ تفرقی مساوات ہے جس کا امتیازی مساوات  $\lambda^2 + \frac{k}{m} = 0$  ہے۔ امتیازی مساوات کے جوڑی دار مخلوط جذر  $\lambda = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}} = \pm i\omega_0$  ہیں جن سے عمومی حل لکھتے ہیں۔

(2.37)


$$y = A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Hooke's law<sup>34</sup>

<sup>35</sup> روبرٹ ہک (1635-1703) انگلستان کے ماہر طبیعیات تھے۔

restoring force<sup>36</sup>

spring constant<sup>37</sup>



شکل 2.7: مساوات 2.37 کے عمومی اشکال۔

اس حرکت کو ہارمونی ارتعاش<sup>38</sup> کہتے ہیں جس کی تعدد<sup>39</sup>  $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$  ہرٹز<sup>40</sup> ہے۔<sup>41</sup> تعدد  $f_0$  کو نظام کی قدرتی تعدد<sup>42</sup> کہتے ہیں۔ چونکہ ایک سیکنڈ میں  $f_0$  چکر (پھیرے) پورے ہوتے ہیں لہذا ایک چکر  $\frac{1}{f_0}$  عرصے میں پورا ہو گا۔ اس دورانیے کو  $T$  سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کو دوری عرصہ<sup>43</sup> کہتے ہیں۔

$$(2.38) \quad T = \frac{1}{f_0}$$

$$\delta = \tan^{-1} \frac{B}{A} \quad \text{اور} \quad C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$(2.39) \quad y = C \cos(\omega_0 t - \delta)$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں  $C$  حیثہ<sup>44</sup> اور  $\delta$  زاویائی فرق<sup>45</sup> کہلاتے ہیں۔

مساوات 2.37 (یعنی مساوات 2.39) کو شکل 2.7 میں دکھایا گیا ہے۔ دکھائے گئے تینوں منحنی میں ابتدائی فاصلہ  $y(0) = A$  ہے جبکہ ابتدائی رفتار  $y'(0) = \omega_0 B$  خط الف میں مثبت، ب میں صفر اور پ میں منفی ہے۔

<sup>38</sup> harmonic oscillation<sup>39</sup> frequency<sup>40</sup> Hertz<sup>41</sup> ہائز (1857-1894) جرمنی کے ماہر طبیعیات تھے جنہوں نے برقیاتی امواج دریافت کئے۔<sup>42</sup> natural frequency<sup>43</sup> time period<sup>44</sup> amplitude<sup>45</sup> phase angle

مثال 2.16: ایک اسپرنگ سے  $2 \text{ kg}$  کمیت لٹکانے سے اسپرنگ کی لمبائی میں  $61.25 \text{ cm}$  کا اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اس اسپرنگ سے کتنی کمیت لٹکانے سے ایک ہرٹز  $1 \text{ Hz}$  کا ارتعاش حاصل کیا جاسکتا ہے؟ ساکن حالت سے کمیت کو  $10 \text{ cm}$  نیچے کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے۔ کمیت کی حرکت دریافت کریں۔

حل: قانون ہک کے تحت  $mg = 0.6125k$  سے  $k = \frac{2 \times 9.8}{0.6125} = 32 \text{ N m}^{-1}$  حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہرٹز کی تعدد کے لئے  $2\pi f_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  سے  $m = \frac{k}{(2\pi f_0)^2} = \frac{32}{(2\pi \times 1)^2} = 0.811 \text{ kg}$  حاصل ہوتا ہے۔

مساوات 2.37 میں  $y(0) = 0.10 \text{ m}$  اور  $y'(0) = 0$  پر کرتے ہوئے  $A = 0.1$  اور  $B = 0$  حاصل ہوتا ہے لہذا حرکت کی مساوات  $y = 0.1 \cos 2\pi t$  ہوگی۔  $y$  کی قیمت میٹر میں ہوگی۔

### قصری نظام کا سادہ تفرقی مساوات


شکل 2.8 میں اسپرنگ اور کمیت کے نظام میں قوت روک  $F_3 = -cy'$  کا اضافہ کیا گیا ہے جو ہر لمحہ حرکت کے الٹ رخ عمل کرتی ہے۔ یوں  $my'' = -ky - cy'$  لکھا جائے گا جس سے قصری نظام کی سادہ تفرقی مساوات

$$(2.40) \quad my'' + cy' + ky = 0$$

حاصل ہوتی ہے۔ گیند کے ساتھ چادر منسلک کی گئی ہے جو ایک طرف سے بند نلکی میں حرکت کرتی ہے۔ اس سے قوت روک پیدا ہوتا ہے۔ تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ کم رفتار پر ایسی قوت رفتار کے راست تناسب ہوتی ہے۔  $c$  قصری مستقل<sup>46</sup> کہلاتا ہے۔ قصری مستقل از خود مثبت مستقل ہے۔ یوں نیچے رخ رفتار، یعنی مثبت رفتار، کی صورت میں قصری قوت منفی، یعنی اوپر رخ، ہوگی۔

قصری نظام کی مساوات خطی متجانس ہے جس سے امتیازی مساوات ( $m$  سے تقسیم شدہ) لکھتے ہیں۔

$$\lambda^2 + \frac{c}{m}\lambda + \frac{k}{m} = 0$$



شکل 2.8: اسپرنگ اور کمیت کا قسری نظام۔

اس دو درجی الجبرائی مساوات کے جذر لکھتے ہیں۔

$$(2.41) \quad \lambda_1 = -\alpha + \beta, \quad \lambda_2 = -\alpha - \beta \quad \text{جہاں} \quad \alpha = \frac{c}{2m}, \quad \beta = \frac{\sqrt{c^2 - 4mk}}{2m}$$

تقصیر کی مقدار پر  $c^2 - 4mk$  کی قیمت منحصر ہے جو تین مختلف صورتیں پیدا کرتی ہے۔

• پہلی صورت: زیادہ نقصیر<sup>47</sup> دو منفرد حقیقی جذر  $c^2 > 4mk$

• دوسری صورت: فاصل نقصیر<sup>48</sup> دو ہر حقیقی جذر  $c^2 = 4mk$

• تیسری صورت: کم نقصیر<sup>49</sup> جوڑی دار مخلوط جذر  $c^2 < 4mk$

اس قسم کی تین صورتیں ہم صفحہ 96 پر پہلے دیکھ چکے ہیں۔

<sup>47</sup>over damping  
<sup>48</sup>critical damping  
<sup>49</sup>under damping

## تین صورتوں کے حل

## پہلی صورت

## زیادہ تقصیر

پہلی صورت میں قسری قوت اتنا زیادہ ہے کہ  $c^2 > 4mk$  ہے جس سے دو منفرد حقیقی جذر  $\lambda_1$  اور  $\lambda_2$  حاصل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مساوات 2.40 کا عمومی حل درج ذیل ہو گا۔

$$(2.42) \quad y = c_1 e^{-(\alpha-\beta)t} + c_2 e^{-(\alpha+\beta)t}$$

چونکہ  $\alpha > 0$  ،  $\beta > 0$  اور  $\beta^2 = \alpha^2 - \frac{k}{m} < \alpha^2$  ہیں لہذا  $\alpha - \beta$  اور  $\alpha + \beta$  دونوں مثبت مقدار ہیں۔ یوں مساوات 2.42 میں دونوں قوت نمائی تفاعل کی طاقت منفی ہو گی اور دونوں تفاعل کی قیمتیں نہایت تیزی سے گھٹے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $t \rightarrow \infty$  پر  $y(\infty) \rightarrow 0$  ہو گا یعنی گیند ساکن ہو گا۔ زیادہ قسری نظام میں قسری قوت اس تیزی سے نظام سے توانائی خارج کرتا ہے کہ نظام ارتعاش کرنے کے قابل نہیں رہتا۔

مساوات 2.42 کو مختلف ابتدائی قیمتوں کے لئے شکل 2.9 میں دکھایا گیا ہے۔ شکل-الف میں ابتدائی فاصلہ مثبت ہے جبکہ شکل-ب میں ابتدائی فاصلہ منفی ہے۔ شکل-الف میں خط الف مثبت ابتدائی رفتار کے لئے کھینچا گیا ہے جبکہ خط ب صفر ابتدائی رفتار اور دو عدد خط پ کو منفی ابتدائی رفتار کے لئے کھینچا گیا ہے۔ شکل-ب میں خط الف منفی ابتدائی رفتار کے لئے کھینچا گیا ہے جبکہ خط ب صفر ابتدائی رفتار اور دو عدد خط پ کو مثبت ابتدائی رفتار کے لئے کھینچا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تقصیری نظام میں ارتعاش ممکن نہیں ہے اور نظام میں حرکت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔


## دوسری صورت

## فاصل تقصیر


زیادہ تقصیر اور کم تقصیر کے درمیان فاصل تقصیر کی صورت پائی جاتی ہے جہاں  $c^2 = 4mk$  ہوتا ہے۔ یوں  $\beta = 0$  اور امتیازی مساوات کا دوہرا جذر  $\lambda_1 = \lambda_2 = -\alpha$  پایا جاتا ہے۔ یوں مساوات 2.40 کا عمومی حل درج ذیل ہو گا۔

$$(2.43) \quad y = (c_1 c - 2t) e^{-\alpha t}$$






(ب) ابتدائی فاصلہ صفری ہے۔



(الف) ابتدائی فاصلہ مثبت ہے۔

شکل 2.9: تقصیری نظام میں حرکت بالمقابل وقت۔



شکل 2.10: فاصل تقصیری نظام میں حرکت بالمقابل وقت۔

یہ مساوات ساکن مقام  $y = 0$  سے صرف ایک مرتبہ گزر سکتی ہے۔ اس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ  $e^{-\alpha t}$  کبھی صفر یا منفی نہیں ہو سکتا جبکہ  $c_1 + c_2 t$  صرف ایک صفر دیتا ہے۔ اگر  $c_1$  اور  $c_2$  دونوں مثبت یا دونوں منفی ہوں تب  $c_1 + c_2 t$  کسی صورت صفر نہیں ہو سکتا اور  $y$  صفر سے کبھی نہیں گزرے گا۔

شکل 2.10 میں مساوات 2.43 کو مختلف ابتدائی قیمتوں کے لئے دکھایا گیا ہے۔ ابتدائی فاصلہ مثبت لیا گیا ہے، خط الف میں ابتدائی رفتار مثبت، خط ب میں صفر اور دو عدد خط پ میں ابتدائی رفتار منفی لی گئی ہے۔ یہ خطوط شکل 2.9-الف سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ موجودہ صورت منفرد حقیقی جذر کی وہ مخصوص صورت ہے جہاں دونوں جذر عین برابر ہوں۔

### تیسری صورت

#### کم تفصیر

یہ سب سے زیادہ دلچسپ صورت ہے جہاں تفسیری مستقل کی قیمت اتنی کم ہے کہ  $c^2 - 4mk < 0$  حاصل ہوتا ہے۔ یوں مساوات 2.41 میں  $\beta$  خیالی عدد ہو گا۔

$$(2.44) \quad \beta = \frac{\sqrt{4mk - c^2}}{2m} = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{c^2}{4m^2}} = i\omega \quad (\omega > 0)$$

اتیازی مساوات کے جذر جوڑی دار مخلوط اعداد ہوں گے


$$(2.45) \quad \lambda_1 = -\alpha + i\omega, \quad \lambda_2 = -\alpha - i\omega$$

اور مساوات 2.40 کا عمومی حل درج ذیل ہو گا

$$(2.46) \quad y = e^{-\alpha t} (A \cos \omega t + B \sin \omega t) = Ce^{-\alpha t} \cos(\omega t - \delta)$$

جہاں  $C = \sqrt{A^2 + B^2}$  اور  $\delta = \tan^{-1} \frac{B}{A}$  ہیں۔

یہ قصری ارتعاش<sup>50</sup> کو ظاہر کرتی ہے جس کو شکل 2.11 میں دکھایا گیا ہے۔ اس منحنی کی چوٹیاں، نقطہ دار لکیر سے دکھائی گئیں، تقابل  $y = Ce^{-\alpha t}$  اور  $y = -Ce^{-\alpha t}$  کے منحنی کو چھوتی ہے۔ ارتعاش کی تعدد  $\frac{\omega}{2\pi}$  ہے جو قصری مستقل  $c$  کم کرنے سے بڑھتی ہے۔ قصری مستقل کی قیمت صفر کرنے سے مساوات 2.39 کی ہارمونی ارتعاش حاصل ہوتی ہے جس کی قدرتی تعدد  $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$  ہو گی۔



شکل 2.11: تھری ارتعاش۔

مثال 2.17: تقصیری حرکت کے تین صورتیں

ایک اسپرنگ جس کا مستقل  $k = 32 \text{ N kg}^{-1}$  ہے سے  $m = 2 \text{ kg}$  کا گیند لٹکایا گیا ہے۔ اس نظام میں باری باری  $c = 20 \text{ kg s}^{-1}$ ،  $c = 16 \text{ kg s}^{-1}$  اور  $c = 5 \text{ kg s}^{-1}$  تقصیری اثر شامل کیا جاتا ہے۔ ابتدائی معلومات  $y(0) = 4 \text{ cm}$  اور  $y'(0) = 0$  ہیں۔ گیند کی حرکت دریافت کریں۔

حل: قوت روک نظام میں توانائی کے ضیاع کو ظاہر کرتی ہے جس سے مسلسل گھٹتی ارتعاش (پہلی صورت) یا غیر ارتعاشی حرکت (دوسری اور تیسری صورت) پیدا ہوتی ہے۔

پہلی صورت:  $m = 2$ ،  $k = 32$  اور  $c = 20$  درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ دیتی ہے

$$2y'' + 20y' + 32y = 0, \quad y(0) = 0.04 \text{ m}, \quad y'(0) = 0$$

جس کا امتیازی مساوات  $2\lambda^2 + 20\lambda + 32 = 0$  ہے۔ امتیازی مساوات  $2(\lambda + 8)(\lambda + 2) = 0$  کے جذر  $\lambda_1 = -2$  اور  $\lambda_2 = -8$  ہیں جن سے عمومی حل اور حل کا ایک درجی تفرق لکھتے ہیں۔

$$y = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-8t}, \quad y' = -2c_1 e^{-2t} - 8c_2 e^{-8t}$$

ان میں ابتدائی قیمتیں پر کرتے ہوئے  $c_1 + c_2 = 0.04$  اور  $-2c_1 - 8c_2 = 0$  ملتا ہے جنہیں حل کرنے سے  $c_1 = \frac{4}{75}$  اور  $c_2 = -\frac{1}{75}$  حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح حرکت کی مساوات درج ذیل ہوگی۔

$$y = \frac{4}{75} e^{-2t} - \frac{1}{75} e^{-8t}$$

یہ مسلسل گھٹتی ارتعاش ہے جو آخر کار  $t \rightarrow \infty$  پر  $y \rightarrow 0$  ہوگی یعنی بہت دیر بعد گیند ساکن ہوگا۔

دوسری صورت:  $c = 16$  کی صورت میں امتیازی مساوات  $2\lambda^2 + 16\lambda + 32 = 0$  یعنی  $2(\lambda + 4)^2 = 0$  ہوگا جس کا دوہرا جذر  $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$  ہے۔ یوں حرکت کی عمومی مساوات درج ذیل ہوگی

$$y = (c_1 + c_2 x)e^{-4t}$$

جس میں ابتدائی معلومات پر کرتے ہوئے  $c_1 = 0.04$  اور  $c_2 = 0.16$  حاصل ہوتے ہیں جن سے مخصوص حل لکھتے ہیں۔

$$y = (0.04 + 0.16t)e^{-4t}$$

تیسری صورت: تقصیری مستقل  $c = 5 \text{ kg s}^{-1}$  لیتے ہوئے تفرقی مساوات  $2y'' + 5y' + 32y = 0$  ہوگا جس سے امتیازی مساوات  $2\lambda^2 + 5\lambda + 32 = 0$  حاصل ہوتی ہے۔ امتیازی مساوات کے جوڑی دار مخلوط جذر  $-1.25 \pm 3.8i$  ہیں جن سے عمومی مساوات اور عمومی مساوات کا تفرق لکھتے ہیں۔

$$y = e^{-1.25t} (A \cos 3.8t + B \sin 3.8t)$$

$$y' = -1.25e^{-1.25t} (A \cos 3.8t + B \sin 3.8t) + 3.8e^{-1.25t} (-A \sin 3.8t + B \cos 3.8t)$$


ابتدائی معلومات کو  $y$  کی مساوات میں پر کرنے سے  $A = 0.04$  حاصل ہوتا ہے جبکہ انہیں  $y'$  کی مساوات میں پر کرنے سے  $-1.25A + 3.8B = 0$  یعنی  $B = -0.013$  حاصل ہوتا ہے لہذا مخصوص حل درج ذیل ہوگا۔

$$y = e^{-1.25t} (0.04 \cos 3.8t - 0.013 \sin 3.8t)$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلا تقصیری نظام کی قدرتی ارتعاش  $\omega_0 = \sqrt{\frac{32}{2}} = 4$  سے موجودہ تعدد  $\omega = 3.8$  کم ہے۔ شکل 2.12 میں اس مثال کی تینوں صورتوں کو دکھایا گیا ہے۔

اس حصے میں بیرونی قوتوں سے پاک اسپرنگ اور کمیت کے نظام کی آزاد حرکت<sup>51</sup> پر غور کیا گیا۔ ایسے نظام کو متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات ظاہر کرتی ہے۔ ہم اسی باب میں بیرونی جبری قوتوں کی موجودگی میں پائی جانے والی جبری حرکت<sup>52</sup> پر بھی غور کریں گے۔ ایسے نظام کو غیر متجانس خطی سادہ تفرقی مساوات ظاہر کرتی ہے۔

free motion<sup>51</sup>  
forced motion<sup>52</sup>



شکل 2.12: مثال 2.17 کی آزاد حرکت کی تین صورتیں۔

### سوالات

سوال 2.58 تا سوال 2.68 بلا تقصیر، ہارمونی ارتعاش کے سوالات ہیں۔

سوال 2.58: ابتدائی قیمت مسئلہ

بلا تقصیر ارتعاش کو مساوات 2.37 ظاہر کرتی ہے۔ ابتدائی فاصلہ  $y(0) = y_0$  اور ابتدائی رفتار  $y'(0) = v_0$  کی صورت میں مخصوص حل لکھیں۔

جواب:  $y = y_0 \cos \omega_0 t + \frac{v_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t$

سوال 2.59: تعدد


ایک اسپرنگ کی لمبائی 75 cm ہے۔ اس سے 0.25 kg کا گیند لٹکانے سے اسپرنگ کی لمبائی 85 cm ہو جاتی ہے۔ اس نظام کی تعدد  $f_0$  اور دوری عرصہ  $T$  کیا ہوں گے؟

جوابات:  $f_0 = 1.58 \text{ Hz}$  ،  $T = 0.63 \text{ s}$

سوال 2.60: تعدد

اسپرنگ اور کمیت کی نظام میں کمیت چارگٹا کرنے سے تعدد پر کیا اثر پڑتا ہے۔ مستقل اسپرنگ کی قیمت چارگٹا کرنے سے تعدد پر کیا اثر پڑتا ہے۔

جوابات: کمیت چارگٹا کرنے سے تعدد آدھی ہوتی ہے۔ مستقل اسپرنگ چارگٹا کرنے سے تعدد دگنی ہوتی ہے۔



(ب) سوال 2.64 کا نظام۔



(الف) سوال 2.62 کا نظام۔

شکل 2.13: متوازی اسپرنگ اور جھولا کے سوالات۔

سوال 2.61: ابتدائی رفتار اسپرنگ اور کمیت کے نظام میں ابتدائی رفتار صفر نہ ہونے کی صورت میں نظام کے تعدد اور رفتار پر کیا اثر ہوگا؟

جواب: نظام کی تعدد پر کوئی اثر نہیں ہوگا البتہ اس سے رفتار بڑھے گی۔


سوال 2.62: متوازی اسپرنگ چار کلو گرام کی گیند کو  $k_1 = 16 \text{ N m}^{-1}$  کی اسپرنگ سے لٹکایا جاتا ہے۔ نظام کی تعدد کیا ہوگی؟ اگر اسی گیند کو  $k_2 = 32 \text{ N m}^{-1}$  کی اسپرنگ سے لٹکایا جائے تب نظام کی تعدد کیا ہوگی؟ دونوں کی لمبائی برابر ہے۔ ان دونوں اسپرنگ کو متوازی جوڑا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نظام کی تعدد کیا ہوگی؟ شکل 2.13-الف کو دیکھیے۔

جوابات:  $0.32 \text{ Hz}$  ،  $0.45 \text{ Hz}$  ،  $0.55 \text{ Hz}$   $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1+k_2}{m}}$

سوال 2.63: سلسلہ وار اسپرنگ گزشتہ سوال کے دونوں اسپرنگ کو سلسلہ وار جوڑا جاتا ہے۔ نظام کی تفرقی مساوات لکھتے ہوئے تعدد حاصل کریں۔

جوابات:  $0.26 \text{ Hz}$  ،  $my'' + \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} y = 0$   $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}}$

سوال 2.64: جھولا ایک ہلکے دھاگے سے  $m$  کمیت کا گیند لٹکایا شکل 2.13-ب میں دکھایا گیا ہے۔ اس نظام کی تفرقی مساوات حاصل کریں۔ نہایت چھوٹے زاویے کی صورت میں  $\sin \theta \approx \theta$  لکھتے ہوئے مساوات کی سادہ صورت حاصل کریں جس کو حل کرتے ہوئے نظام کی تعدد حاصل کریں۔



شکل 2.14: آرشمیدی اصول؛ سوال 2.65

حل: گیند کا وزن  $mg$  ہے جو نیچے رخ قوت ہے۔ اس کا مماس  $mg \sin \theta$  ہے جو اسراع پیدا کرتا ہے۔  
 $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$  ،  $\theta = \cos \sqrt{\frac{g}{L}} t$  ،  $L\theta'' = g\theta$  ،  $L\theta'' = g \sin \theta$

سوال 2.65: اصول آرشمیدس  
 اصول آرشمیدس<sup>53</sup> کے تحت جب کسی جسم کو مائع میں ڈبو یا جائے تو اس پر قوت اچھال عمل کرتی ہے جس کی مقدار، جسم کے ڈبویے گئے حجم کے برابر، مائع کے وزن جتنی ہوتی ہے۔

ایک بیلن کو سیدھا پانی میں کھڑا کرنے سے اس کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ شکل 2.14 میں اس کو ساکن حالت میں دکھایا گیا ہے۔ بیلن کا رداس  $r = 20 \text{ cm}$  ہے۔ اگر بیلن کو نیچے دھکیل کر چھوڑا جائے تو یہ دو سیکنڈ کے دوری عرصے سے اوپر نیچے ارتعاشی حرکت کرتا ہے۔ بیلن کی کمیت  $M$  دریافت کریں۔ پانی کی کثافت  $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$  ہے۔


جوابات:  $M = g\rho\pi r^2 \left(\frac{T}{2\pi}\right)^2 = 9.8 \times 1000\pi 0.2^2 \left(\frac{2}{2\pi}\right)^2 = 124.8 \text{ kg}$

سوال 2.66: زنجیر کا میز سے پھسلنا  
 ایک پھسلنی میز پر زنجیر سیدھا پڑا ہوا ہے۔ ان کے مابین قوت رگڑ قابل نظر انداز ہے۔ اگر زنجیر کے ایک سر کو میز سے لٹکایا جائے تو پورا زنجیر پھسلنے پھسلنے نیچے گر پڑتا ہے۔ زنجیر کی کل لمبائی  $L$  اور کمیت  $m$  کلوگرام فی میٹر لیتے ہوئے اس مسئلے کا تفرقی مساوات لکھیں۔ اگر  $y(0) = 0$  اور  $y'(0) = v_0$  ہو تب مخصوص حل کیا ہو گا؟

جوابات:  $y = \frac{v_0}{2} \sqrt{\frac{L}{g}} \left( e^{\sqrt{\frac{g}{L}} t} - e^{-\sqrt{\frac{g}{L}} t} \right)$  ،  $mLy'' = mgy$

سوال 2.67: نالی میں پانی کی ارتعاش  
 شکل 2.15 میں  $M = 9 \text{ kg}$  پانی زیر ثقلی قوت نالی میں ارتعاش کرتا ہے۔ نالی کا اندرونی رداس  $r = 1.5 \text{ cm}$  ہے۔ ارتعاش کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

Archimedian principle<sup>53</sup>



شکل 2.15: نالی میں پانی ارتعاشی حرکت کرتا ہے؛ سوال 2.67

جوابات:  $T = 5.06 \text{ s}$  ،  $My'' = -2\pi r^2 \rho g y$

سوال 2.68: باریک غیر لچکدار تار سے  $I_0$  جمودی معیار اثر<sup>54</sup> کا جسم لٹکایا جاتا ہے۔ جسم بغیر دائیں بائیں ہلتے ہوئے زاویائی ارتعاش کرتا ہے۔ اس نظام کو  $I_0 \theta'' + K\theta = 0$  تفرقی مساوات ظاہر کرتی ہے جہاں زاویہ  $\theta$  کو متوازن حال سے ناپا جاتا ہے۔ ابتدائی زاویہ  $\theta_0 = \frac{\pi}{4}$  ریڈین یعنی  $45^\circ$  اور ابتدائی رفتار صفر ہے۔ لیتے ہوئے مساوات حل کریں۔  $\frac{K}{I_0} = 9 \text{ s}^{-2}$

جواب:  $\theta = \frac{\pi}{4} \cos 3t$

سوالات 2.69 تا سوال 2.69 میں قسری حرکت پایا جاتا ہے۔

سوال 2.69:

<sup>54</sup>moment of inertia