

テンソル同時分解の拡張による オミクスデータの統合

阿部興¹・島村徹平²


2023 年 6 月 3 日

¹東京医科歯科大学難治疾患研究所

²名古屋大学医学系研究科・東京医科歯科大学難治疾患研究所

動機：分析対象

モダリティ



- オミクス (omics) データを統合して分析したい
 - 積極的理由：データを補い合い普遍的な特徴を抽出
 - 消極的理由：対応のあるサンプルなので非独立
- 難しさ
 - semi-paired なデータが多い
 - モダリティごとに分布が変わる


動機：分析手法



tidy format

sample	feature	annotation	
1	1		
2	1		
⋮	⋮	⋮	
5	4		
1	2	•	
⋮	⋮	⋮	
5	2	•	
1	3	†	
⋮	⋮	⋮	
5	7	†	

ξ y



tidy format

sample	modality	feature	
1	1	⋮	
2	1	⋮	
⋮	⋮	⋮	
9	1	⋮	
1	2	⋮	
⋮	⋮	⋮	
6	2	⋮	
1	3	⋮	
⋮	⋮	⋮	
9	3	⋮	

ξ y

tidy-format の利便性をそのままに行列分解ができないか？

3 階のテンソルの場合

Data:

$$Y = (y_{ijk}), \quad y = (y_n) = \text{vec}(Y)$$

CP 分解 :

$$y_{ijk} \approx \sum_l v_{il}^{(1)} v_{jl}^{(2)} v_{kl}^{(3)}.$$

提案法 :

$$y_n \approx \sum_l \prod_{d=1}^D v_{dl}^{x_{nd}} \quad (1)$$

ここで,

$$V = (v_{dl}) = \begin{pmatrix} v^{(1)} \\ v^{(2)} \\ v^{(3)} \end{pmatrix}$$

内積としての解釈

$$\begin{aligned}
 \sum_{l=1}^L \prod_{d=1}^D v_{dl}^{x_{nd}} &= v_{11}^{x_{n1}} v_{21}^{x_{n2}} \cdots v_{D1}^{x_{nD}} + \cdots + v_{1L}^{x_{n1}} v_{2L}^{x_{n2}} \cdots v_{DL}^{x_{nD}} \\
 &= \underbrace{\left(v_{d1}^{x_{nd}} \quad \cdots \quad v_{dL}^{x_{nd}} \right)}_{\text{inner product}} \cdot \begin{pmatrix} \prod_{d' \neq d} v_{d'1}^{x_{nd'}} \\ \vdots \\ \prod_{d' \neq d} v_{d'L}^{x_{nd'}} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

アンサンブルとしての解釈

$$\begin{aligned} & \sum_{l=1}^L \prod_{d=1}^D v_{dl}^{x_{nd}} \\ &= \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L L \exp \left(\underbrace{\sum_{d=1}^D x_{nd} \cdot \log v_{dl}}_{\text{let } f_{nl}} \right) \\ &= \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L L f_{nl} \quad (\text{mean of the log-linear predictor}) \end{aligned}$$

モデル（準備）

式 1 ($y_n \approx \sum_l \prod_{d=1}^D v_{dl}^{x_{nd}}$) より

$$y_n \mid V, \lambda \sim \mathcal{N} \left(y_n \mid \sum_{l=1}^L \prod_{d=1}^D v_{dl}^{x_{nd}}, \lambda^{-1} \right) \quad (2)$$

$$v_{dl} \sim \mathcal{N}(v_{dl} \mid 0, \tau^{-1}) \quad (3)$$

$$\lambda \sim \mathcal{G}(\lambda \mid a, b)$$

- さらに修正・拡張
 - 解釈性のため：非負制約
 - マルチオミクスデータの分析のため：分布を変える

事前分布：非負制約

$$\begin{aligned} v_{dl} &\sim \mathcal{TN}(v_{dl}|0, \tau^{-1}) \\ &\propto \mathcal{N}(v_{dl}|0, \tau^{-1}) \mathbb{1}_{(0, \infty)}(v_{dl}) \end{aligned}$$

ここで, $\mathbb{1}_{(0, \infty)}(v_{dl})$ は指示関数.

中間変数

- y_n が実数（連続値）：

$$A(x) = x.$$

- y_n が非負：

$$A(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}.$$

- y_n が 2 値 (0 or 1)：

$$A(x) = \mathbb{1}_{(0,\infty)}(x).$$

- y_n が非負の整数：

$$A(x) = \begin{cases} \lceil x \rceil, & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}.$$

切断, Rectified, 離散化




Fig: 左: 潜在変数の事前分布. 右: 観測されるデータのモデル. 一点 0 で確率を持つ (eg. 重さ, 計数)

モデル

$$y_n = A_{m(n)}(z_n), \quad z_n \sim \mathcal{N} \left(\sum_{l=1}^L \prod_{d=1}^D v_{dl}^{x_{nd}}, \lambda^{-1} \right) \quad (4)$$

ここで $m(n)$ is a function which maps index n to mode $m(n)$.

対数尤度

$$\begin{aligned}\ell(v_{dl}) &= \sum_{n=1}^N \log p(z|V, X) = \sum_{n=1}^N \left(-\frac{\lambda}{2} \left\{ z_n - \sum_{l=1}^L \prod_{d=1}^D v_{dl}^{x_{nd}} \right\}^2 \right) + C \\ &= -\frac{h_{dl}}{2} \left(v_{dl}^2 - 2v_{dl} \frac{\eta_{dl}}{h_{dl}} \right) + C,\end{aligned}$$

ここで,

$$\eta_{dl} = \sum_n x_{nd} \prod_{d' \neq d} v_{dl}^{x_{nd}} \left(z_n - \sum_{l' \neq l} \prod_{d' \neq d} v_{dl'}^{x_{nd}} \right) \quad (5)$$

$$h_{dl} = \sum_n \lambda x_{nd} \prod_{d' \neq d} v_{dl}^{2x_{nd}}. \quad (6)$$

C は v_{dl} に依存しない定数.

変分 EM アルゴリズム (一般論)

データ: $\mathcal{D} = (\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_n)$

\mathcal{D} 全体に影響する **global** な潜在変数: V

\mathcal{D}_n に影響する **local** な潜在変数: z_n

$$\begin{aligned} D_{KL}(q||p) &= \int q(z) \log \frac{q(z)}{p(z_n|\mathcal{D}, w)} dz \\ &= E_q[\log q(z)] - E_q[\log p(z_n|\mathcal{D}, w)] \end{aligned}$$

$q(z) \propto \exp(E_q[\log p(z_n|\mathcal{D}, w)])$ のとき最小.

変分 EM アルゴリズム

E-step: $q(z) \propto \exp(E_q[\log p(z_n|\mathcal{D}, w)])$ を更新

M-step: $q(v_{dl}) \propto \exp(E_q[\log p(z_n|\mathcal{D}, w)])$ を更新

local な潜在変数 z_n に対しては変分事後分布からサンプリング; 特に \tilde{z}_n と書く

- rectified

$$q(-z_n) = \begin{cases} \mathcal{TN}(-z_n | -f_n, \sigma_n^2) & y_n = 0, \\ z_n = y_n \text{ with probability } 1 & y_n > 0 \end{cases} \quad (7)$$

- binary

$$q(-z_n) = \begin{cases} \mathcal{TN}(-z_n | -f_n, \sigma_n^2) & y_n = 0, \\ \mathcal{TN}(z_n | f_n, \sigma_n^2) & y_n = 1 \end{cases} \quad (8)$$

- nonnegative integer

$$q(-z_n) = \begin{cases} \mathcal{TN}(-z_n | -f_n, \sigma_n^2) & y_n = 0, \\ \mathcal{TN}(z_n | f_n, \sigma_n^2) & y_n = 1 \end{cases} \quad (9)$$

$$q(v_{dl}) = \begin{cases} \mathcal{N}(\mu_{dl}, \sigma_{dl}) & \text{if the prior of } v_{dl} \text{ is not truncated} \\ \mathcal{TN}(\mu_{dl}, \sigma_{dl}) & \text{if the prior of } v_{dl} \text{ is truncated,} \end{cases} \quad (10)$$

ここで,

$$\begin{aligned} \mu_{dl} &= \frac{\langle \eta_{dl} \rangle}{\langle h_{dl} \rangle + \tau / \langle \lambda \rangle}, \\ \sigma^2 &= (\tau + \langle h_{dl} \rangle)^{-1}. \end{aligned}$$

λ の変分事後分布は,

$$q(\lambda) = \mathcal{G}(N/2\eta_{dl}, (h_{dl} + \tau)/2). \quad (11)$$

大規模メタアナリシス (学習済み word2vec のように配布), 因果推論 (g-formula), 時空間相関