

Rezolúció elsőrendben

Gyakorlat

Logika

2021/2022 1. félév

Literál: egy atomi formula, vagy annak a negáltja pl.:

$P(x), \neg P(x), \neg P(f(g(h(x, a), b)))$

Prenex formula: Kvantált formula, ahol a kvantorok a formula elejébe vannak tömörítve. pl.: $\forall x \exists y \forall z (P(x) \wedge Q(x, y) \vee R(z))$

Skolem formula: Olyan Prenex formula, amiben csak univerzális kvantor van. pl.: $\forall x \forall y \forall z (P(x) \wedge Q(x, y) \vee R(z))$

Elsőrendű klóz: Olyan zárt Skolem formula, aminek a magja literálok diszjunkciós lánc. pl.: $\forall x \forall y \forall z (P(x) \vee \neg Q(x, y) \vee \neg R(z))$

Rezolúció elsőrendben

Adott a következő két elsőrendű klóz:

$$P(x) \vee Q(x, y) \text{ és } \neg P(g(h(z)))$$

Hogyan rezolváljunk?

1. $P(x) \vee Q(x, y)$
2. $\neg P(g(h(z)))$
3. ? [res(1,2)]

A komplement literálpár alapjait egymáshoz kell illeszteni, hogy rezolválni tudjuk őket.

Elsőrendű rezolúció - 1. példa

Legáltalánosabb illesztési algoritmus

$$K = \{\neg P(g(x, y)), Q(g(z, z), \bar{a}) \vee P(z), \neg Q(g(v, g(\bar{a}, \bar{b})), w)\}$$

1. $\neg P(g(x, y))$ $[\in K]$
2. $Q(g(z, z), \bar{a}) \vee P(z)$ $[\in K]$
3. $Q(g(g(x, y), g(x, y)), \bar{a})$ $[res(1, 2)] \quad (z||g(x, y))$

$$k = 0 \quad W_0 = \{P(g(x, y)), P(z)\}$$

$$D_0 = \{g(x, y), z\} \quad \sigma_0 = (z||g(x, y))$$

$$k = 1 \quad W_1 = \{P(g(x, y)), P(g(x, y))\}$$

$$\text{kész:} \quad \sigma = (z||g(x, y))$$

Elsőrendű rezolúció - 1. példa

Legáltalánosabb illesztési algoritmus

$$K = \{\neg P(g(x, y)), Q(g(z, z), \bar{a}) \vee P(z), \neg Q(g(v, g(\bar{a}, \bar{b})), w)\}$$

1. $\neg P(g(x, y))$ $[\in K]$
2. $Q(g(z, z), \bar{a}) \vee P(z)$ $[\in K]$
3. $Q(g(g(x, y), g(x, y)), \bar{a})$ $[res(1, 2)] \quad (z||g(x, y))$
4. $\neg Q(g(v, g(\bar{a}, \bar{b})), w)$ $[\in K]$
5. \square $[res(3, 4)] \quad (v||g(x, y)) (x||\bar{a}) ((y||\bar{b}) (w||\bar{a}))$

$k = 0$ $D_0 = \{g(x, y), v\}$	$W_0 = \{Q(g(g(x, y), g(x, y)), \bar{a}), Q(g(v, g(\bar{a}, \bar{b})), w)\}$ $\sigma_0 = (v g(x, y))$
$k = 1$ $D_1 = \{x, \bar{a}\}$	$W_1 = \{Q(g(g(x, y), g(x, y)), \bar{a}), Q(g(g(x, y), g(\bar{a}, \bar{b})), w)\}$ $\sigma_1 = (x \bar{a})$
$k = 2$ $D_2 = \{y, \bar{b}\}$	$W_2 = \{Q(g(g(\bar{a}, y), g(\bar{a}, y)), \bar{a}), Q(g(g(\bar{a}, y), g(\bar{a}, \bar{b})), w)\}$ $\sigma_2 = (y \bar{b})$
$k = 3$ $D_3 = \{\bar{a}, w\}$	$W_3 = \{Q(g(g(\bar{a}, b), g(\bar{a}, b)), \bar{a}), Q(g(g(\bar{a}, b), g(\bar{a}, b)), w)\}$ $\sigma_3 = (w \bar{a})$
$k = 4$ kész	$W_4 = \{Q(g(g(\bar{a}, \bar{b}), g(\bar{a}, \bar{b})), \bar{a}), Q(g(g(\bar{a}, \bar{b}), g(\bar{a}, \bar{b})), \bar{a})\}$ $\sigma = (v g(x, y))(x \bar{a})(y \bar{b})(w \bar{a})$

Elsőrendű rezolúció 2. példa

Készítsünk egy elsőrendű rezolúciós levezetést a következő klózalmazhoz:

$$K = \{Q(v) \vee P(z, f(\bar{a})), \neg Q(x), \neg P(f(\bar{a}), f(w)) \vee \neg P(y, y)\}$$

- | | | | |
|----|--|------------------------|--|
| 1. | $Q(v) \vee P(z, f(\bar{a}))$ | $[\in K]$ | |
| 2. | $\neg Q(x)$ | $[\in K]$ | |
| 3. | $P(z, f(\bar{a}))$ | $[(\text{res}(1, 2))]$ | $(x \parallel v)$ |
| 4. | $\neg P(f(\bar{a}), f(w)) \vee \neg P(y, y)$ | $[\in K]$ | |
| 5. | \square | $[\text{res}(3, 4)]$ | 4. faktora : $(y \parallel f(\bar{a}))(w \parallel \bar{a})$
$(z \parallel f(\bar{a}))$ |

Klóz faktor:

$k = 0$	$W_0 = \{P(f(\bar{a}), f(w)), P(y, y)\}$
$D_0 = \{f(\bar{a}), y\}$	$\sigma_0 = (y \parallel f(\bar{a}))$
<hr/>	
$k = 1$	$W_1 = \{P(f(\bar{a}), f(w)), P(f(\bar{a}), f(\bar{a}))\}$
$D_1 = \{w, \bar{a}\}$	$\sigma_1 = (w \parallel \bar{a})$
<hr/>	
$k = 2$	$W_2 = \{P(f(\bar{a}), f(\bar{a})), P(f(\bar{a}), f(\bar{a}))\}$
kész	$\sigma = (y \parallel f(\bar{a})) (w \parallel \bar{a})$

Vizsgálat rezolúcióval:

1 Kérdés *kielégíthetlenség* vizsgálatává alakítása:

- ▶ $\{F_1, \dots, F_n\} \models G \Rightarrow \{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$ kielégíthetetlen?
- ▶ F logikai törvény $\Rightarrow \neg F$ kielégíthetetlen?

2 Klózhalmaz készítése

- ▶ Implikáció átírása: $A \supset B = \neg A \vee B$
- ▶ Negálás bevitele atomi formuláig:
 - ★ $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$
 - ★ $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$
 - ★ $\neg\neg A = A$
 - ★ $\neg\forall x A = \exists x \neg A$
 - ★ $\neg\exists x A = \forall x \neg A$
- ▶ Prenex formula előállítás - kvantorkiemelési szabályok
- ▶ Skolem formula előállítás - skolemizálás, egzisztenciális kvantor elhagyása.
- ▶ Elsőrendű klózek előállítás - plusz átalakítások, $A \wedge B \rightarrow \{A, B\}$

Vizsgálat rezolúcióval:

① Kérdés *kielégíthetlenség* vizsgálatává alakítása:

- ▶ $\{F_1, \dots, F_n\} \models G \Rightarrow \{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$ kielégíthetetlen?
- ▶ F tautológia $\Rightarrow \neg F$ kielégíthetetlen?

② Klózhalmaz készítése

- ▶ Implikáció átírása: $A \supset B = \neg A \vee B$
- ▶ Negálás bevitele atomi formuláig
- ▶ Prenex formula előállítás ($Q \in \{\forall, \exists\}, \circ \in \{\wedge, \vee\}$)
 - ★ $QxA[x] \circ B = Qx(A[x] \circ B)$
pl.: $\forall xP(x) \wedge Q(y, a) = \forall x(P(x) \wedge Q(y, a))$
 - ★ $\forall xA[x] \wedge \forall xB[x] = \forall x(A[x] \wedge B[x])$
pl.: $\forall xP(x) \wedge \forall xQ(x, x) = \forall x(P(x) \wedge Q(x, x))$
 - ★ $\exists xA[x] \vee \exists xB[x] = \exists x(A[x] \vee B[x])$
pl.: $\exists xP(x) \vee \exists xQ(x, x) = \exists x(P(x) \vee Q(x, x))$
 - ★ $Q_1xA[x] \circ Q_2xB[x] = Q_1xQ_2y(A[x] \circ B[x|y])$
pl.: $\forall xP(x) \vee \exists xQ(x, x) = \forall x\exists y(P(x) \vee Q(y, y))$
- ▶ Skolem formula előállítása - skolemizálás, egzisztenciális kvantor elhagyása.
- ▶ Elsőrendű klózek előállítása - plusz átalakítások, $A \wedge B \rightarrow \{A, B\}$

Vizsgálat rezolúcióval:

1 Kérdés kielégíthetlenség vizsgálatává alakítása:

- ▶ $\{F_1, \dots, F_n\} \models G \Rightarrow \{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$ kielégíthetetlen?
- ▶ F tautológia $\Rightarrow \neg F$ kielégíthetetlen?

2 Klózhalmaz készítése

- ▶ Implikáció átírása: $A \supset B = \neg A \vee B$
- ▶ Negálás bevitele atomi formuláig
- ▶ Prenex formula előállítás - kvantorkiemelési szabályok
- ▶ Skolem formula előállítása példákkal: (új konstans/függvény bevezetése!)
 - ★ $\exists x P(x) \Rightarrow P(\bar{a})$
 - ★ $\exists x \forall y Q(x, y) \Rightarrow \forall y Q(\bar{a}, y)$
 - ★ $\forall x \exists y Q(x, y) \Rightarrow \forall x Q(x, f(x))$
 - ★ $\forall x \exists y \forall z R(x, y, z) \Rightarrow \forall x \forall z R(x, f(x), z)$
 - ★ $\exists x \exists y \forall z R(x, y, z) \Rightarrow \forall z R(\bar{a}, \bar{b}, z)$
 - ★ $\forall x \forall y \exists z R(x, y, z) \Rightarrow \forall x \forall y R(x, y, g(x, y))$
 - ★ $\exists x \forall y \exists z R(x, y, z) \Rightarrow \forall y R(\bar{a}, y, g(y))$
- ▶ Elsőrendű klózek előállítása - plusz átalakítások, $A \wedge B \rightarrow \{A, B\}$

Vizsgálat rezolúcióval:

1 Kérdés *kielégíthetlenség* vizsgálatává alakítása:

- ▶ $\{F_1, \dots, F_n\} \models G \Rightarrow \{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$ kielégíthetetlen?
- ▶ F tautológia $\Rightarrow \neg F$ kielégíthetetlen?

2 Klózhalmaz készítése

- ▶ Implikáció átírása: $A \supset B = \neg A \vee B$
- ▶ Negálás bevitele atomi formuláig
- ▶ Prenex formula előállítása - kvantorkiemelési szabályok
- ▶ Skolem formula előállítása - skolemizálás, egzisztenciális kvantor elhagyása.
- ▶ Elsőrendű klózek előállítása
 - ★ $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
 - ★ $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
 - ★ KNF alak után: $A \wedge B \rightarrow \{A, B\}$

Elsőrendű rezolúció 3. példa

Bizonyítsuk elsőrendű rezolúcióval, hogy a következő szemantikus következmény teljesül:

$$\{\exists x(\forall z\forall v(\neg Q(v) \supset \neg P(z, x)) \wedge \forall vP(x, v))\} \models \exists xQ(x) \wedge \exists xP(x, x)$$

Alakítsuk kielégíthetlenség vizsgálattá visszakövetkeztetéssel:

$$\{\exists x(\forall z\forall v(\neg Q(v) \supset \neg P(z, x)) \wedge \forall vP(x, v)), \neg(\exists xQ(x) \wedge \exists xP(x, x))\}$$

Készítsünk változóiban tiszta klózalmazt:

$$\exists x(\forall z\forall v(\neg Q(v) \supset \neg P(z, x)) \wedge \forall vP(x, v)) = (\text{implikáció átírása})$$

$$\exists x(\forall z\forall v(\neg\neg Q(v) \vee \neg P(z, x)) \wedge \forall vP(x, v)) = (\text{negáció bevitele})$$

$$\exists x(\forall z\forall v(Q(v) \vee \neg P(z, x)) \wedge \forall vP(x, v)) = (\text{kvantor hatókörének kiterjesztése})$$

$$\exists x\forall z(\forall v(Q(v) \vee \neg P(z, x)) \wedge \forall vP(x, v)) = (\text{kvantor kiemelése})$$

$$\exists x\forall z\forall v((Q(v) \vee \neg P(z, x)) \wedge P(x, v)) \Rightarrow (\exists \text{ eliminálása})$$

$$\forall z\forall v((Q(v) \vee \neg P(z, \bar{a})) \wedge P(\bar{a}, v)) = (\text{KNF alakra hozás})$$

$$\forall z\forall v(Q(v) \vee \neg P(z, \bar{a})) \wedge \forall vP(\bar{a}, v) = (\text{változóiban tiszta KNF})$$

$$\forall z\forall v(Q(v) \vee \neg P(z, \bar{a})) \wedge \forall wP(\bar{a}, w)$$

$$K = \{Q(v) \vee \neg P(z, \bar{a}), P(\bar{a}, w), \dots\}$$

Elsőrendű alaprezolúció 3. példa

$\{\exists x(\forall z\forall v(\neg Q(v) \supset \neg P(z, x)) \wedge \forall vP(x, v)), \neg(\exists xQ(x) \wedge \exists xP(x, x))\}$
kielégíthetetlen?

$\neg(\exists xQ(x) \wedge \exists xP(x, x)) =$ (negáció bevitele)

$\neg\exists xQ(x) \vee \neg\exists xP(x, x) =$ (negáció bevitele)

$\forall x\neg Q(x) \vee \forall x\neg P(x, x) =$ (kvantorok kiemelése)

$\forall x\forall y(\neg Q(x) \vee \neg P(y, y))$

$K = \{Q(v) \vee \neg P(z, \bar{a}), P(\bar{a}, w), \neg Q(x) \vee \neg P(y, y) \}$

Elsőrendű rezolúció 3. példa

$$K = \{Q(v) \vee \neg P(z, \bar{a}), P(\bar{a}, w), \neg Q(x) \vee \neg P(y, y)\}$$

Rezolúciós levezetés:

1. $Q(v) \vee \neg P(z, \bar{a})$ $[\in K]$
2. $\neg Q(x) \vee \neg P(y, y)$ $[\in K]$
3. $\neg P(z, \bar{a}) \vee \neg P(y, y)$ $[res(1, 2)]$ $(v || x)$
4. $P(\bar{a}, w)$ $[\in K]$
5. \square $[res(3, 4)]$ 3. faktora: $(z || y)(y || \bar{a})$
rezolválás: $(w || \bar{a})$

Sikerült levezetni az üres klózt \rightarrow

a klózhalmoz kielégíthetetlen \rightarrow

a szemantikus következmény teljesül.

Elsőrendű rezolúció 4. példa

Bizonyítsuk elsőrendű rezolúcióval, hogy a következő szemantikus következmény teljesül:

$$\{\neg\exists x(\exists yP(x,y) \supset \forall y\exists z\neg Q(y,z))\} \models \exists x\exists y(P(x,y) \wedge Q(x,y))$$

Alakítsuk kielégíthetlenség vizsgálattá visszakövetkeztetéssel:

$$\{ \neg\exists x(\exists yP(x,y) \supset \forall y\exists z\neg Q(y,z)), \neg\exists x\exists y(P(x,y) \wedge Q(x,y)) \}$$

Készítsünk változóiban tiszta klózhalmazt:

$$\neg\exists x(\exists yP(x,y) \supset \forall y\exists z\neg Q(y,z)) = (\text{implikáció átírása})$$

$$\neg\exists x(\neg\exists yP(x,y) \vee \forall y\exists z\neg Q(y,z)) = (\text{negáció bevitel})$$

$$\forall x\neg(\neg\exists yP(x,y) \vee \forall y\exists z\neg Q(y,z)) = (\text{negáció bevitel})$$

$$\forall x(\neg\neg\exists yP(x,y) \wedge \neg\forall y\exists z\neg Q(y,z)) = (\text{negáció bevitel})$$

$$\forall x(\exists yP(x,y) \wedge \exists y\forall z\neg\neg Q(y,z)) = (\text{negáció bevitel})$$

$$\forall x(\exists yP(x,y) \wedge \exists y\forall zQ(y,z)) = (\text{kvantor kiemelés})$$

$$\forall x\exists y_1\exists y_2\forall z(P(x,y_1) \wedge Q(y_2,z)) \Rightarrow (\exists \text{ eliminálása})$$

$$\forall x\forall z(P(x,f(x)) \wedge Q(g(x),z)) = (\text{KNF alakra hozás})$$

$$\forall xP(x,f(x)) \wedge \forall y\forall zQ(g(y),z)$$

$$K = \{P(x,f(x)), Q(g(y),z), \dots\}$$

Elsőrendű rezolúció 4. példa

Bizonyítsuk elsőrendű rezolúcióval, hogy a következő szemantikus következmény teljesül:

$$\{\neg\exists x(\exists yP(x,y) \supset \forall y\exists z\neg Q(y,z))\} \models \exists x\exists y(P(x,y) \wedge Q(x,y))$$

Alakítsuk kielégíthetetlenség vizsgálattá visszakövetkeztetéssel:

$$\{\neg\exists x(\exists yP(x,y) \supset \forall y\exists z\neg Q(y,z)), \underline{\neg\exists x\exists y(P(x,y) \wedge Q(x,y))}\}$$

Készítsünk változóiban tiszta klózhalmazt:

$$\neg\exists x\exists y(P(x,y) \wedge Q(x,y)) = (\text{negáció bevitel})$$

$$\forall x\neg\exists y(P(x,y) \wedge Q(x,y)) = (\text{negáció bevitel})$$

$$\forall x\forall y\neg(P(x,y) \wedge Q(x,y)) = (\text{negáció bevitel})$$

$$\forall x\forall y(\neg P(x,y) \vee \neg Q(x,y)) = (\text{változóiban tisztává alakítás})$$

$$\forall v\forall w(\neg P(v,w) \vee \neg Q(v,w)) = (\text{változóiban tisztává alakítás})$$

$$K = \{P(x, f(x)), Q(g(y), z), \neg P(v, w) \vee \neg Q(v, w)\}$$

Elsőrendű rezolúció 4. példa

$$K = \{P(x, f(x)), Q(g(y), z), \neg P(v, w) \vee \neg Q(v, w)\}$$

Rezolúció levezetés:

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1. $P(x, f(x))$ | $[\in K]$ | |
| 2. $Q(g(y), z)$ | $[\in K]$ | |
| 3. $\neg P(v, w) \vee \neg Q(v, w)$ | $[\in K]$ | |
| 4. $\neg Q(v, f(v))$ | $[res(1, 3)]$ | $(x v)(w f(v))$ |
| 5. \square | $[res(2, 4)]$ | $(v g(y)), (z f(g(y)))$ |

Elsőrendű rezolúció 5. példa

Bizonyítsuk elsőrendű rezolúcióval, hogy a következő szemantikus következmény teljesül:

$$\{\forall x\exists y\forall z(\neg P(x, z) \supset \neg Q(y, g(z))), \forall x\forall y(P(g(x), y) \supset (\neg R(x) \supset \neg S(y)))\} \models (\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \supset \exists v\exists w\neg Q(v, w)$$

Alakítsuk kielégíthetatlenség vizsgálattá visszakövetkeztetéssel:

$$\{\forall x\exists y\forall z(\neg P(x, z) \supset \neg Q(y, g(z))), \forall x\forall y(P(g(x), y) \supset (\neg R(x) \supset \neg S(y))), \neg((\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \supset \exists v\exists w\neg Q(v, w))\}$$

Készítsünk változóiban tiszta klózhalmazt:

$$\forall x\exists y\forall z(\neg P(x, z) \supset \neg Q(y, g(z))) = (\text{implikáció alakítása})$$

$$\forall x\exists y\forall z(\neg\neg P(x, z) \vee \neg Q(y, g(z))) = (\text{negáció bevitele})$$

$$\forall x\exists y\forall z(P(x, z) \vee \neg Q(y, g(z))) \Rightarrow (\exists \text{ eliminálás})$$

$$\forall x\forall z(P(x, z) \vee \neg Q(f(x), g(z)))$$

$$K = \{ P(x, z) \vee \neg Q(f(x), g(z)), \dots \}$$

Elsőrendű rezolúció 5. példa

Alakítsuk klózthalmazzá:

$$\{\forall x\exists y\forall z(\neg P(x, z) \supset \neg Q(y, g(z))), \forall x\forall y(P(g(x), y) \supset (\neg R(x) \supset \neg S(y))), \\ \neg((\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \supset \exists v\exists w\neg Q(v, w))\}$$

Készítsünk változóiban tiszta klózthalmazt:

$$\forall x\forall y(P(g(x), y) \supset (\neg R(x) \supset \neg S(y))) = (\text{implikáció alakítása})$$

$$\forall x\forall y(\neg P(g(x), y) \vee (\neg\neg R(x) \vee \neg S(y))) = (\text{negáció bevitele})$$

$$\forall x\forall y(\neg P(g(x), y) \vee R(x) \vee \neg S(y)) = (\text{változóiban tisztává alakítás})$$

$$\forall y\forall u(\neg P(g(y), u) \vee R(y) \vee \neg S(u))$$

$$K = \{ P(x, z) \vee \neg Q(f(x), g(z)), \neg P(g(y), u) \vee R(y) \vee \neg S(u), \dots \}$$

Elsőrendű rezolúció 5. példa

Alakítsuk klózhalmazzá:

$$\{\forall x\exists y\forall z(\neg P(x, z) \supset \neg Q(y, g(z))), \forall x\forall y(P(g(x), y) \supset (\neg R(x) \supset \neg S(y))), \neg((\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \supset \exists v\exists w\neg Q(v, w))\}$$

Készítsünk változóiban tiszta klózhalmazt:

$$\neg((\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \supset \exists v\exists w\neg Q(v, w)) = (\text{implikáció alakítása})$$

$$\neg(\neg(\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \vee \exists v\exists w\neg Q(v, w)) = (\text{negáció bevitele})$$

$$\neg\neg(\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \wedge \neg\exists v\exists w\neg Q(v, w) = (\text{negáció bevitele})$$

$$(\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \wedge \forall v\forall w\neg\neg Q(v, w) = (\text{negáció bevitele})$$

$$(\exists x\neg R(x) \wedge \exists yS(y)) \wedge \forall v\forall wQ(v, w) = (\text{kvantor kiemelés})$$

$$\exists x\exists y\forall v\forall w(\neg R(x) \wedge S(y) \wedge Q(v, w)) \Rightarrow (\exists \text{ eliminálása})$$

$$\forall v\forall w(\neg R(\bar{a}) \wedge S(\bar{b}) \wedge Q(v, w)) = (\text{KNF-re hozás})$$

$$\neg R(\bar{a}) \wedge S(\bar{b}) \wedge \forall v\forall wQ(v, w)$$

$$K = \{P(x, z) \vee \neg Q(f(x), g(z)), \neg P(g(y), u) \vee R(y) \vee \neg S(u), \neg R(\bar{a}), S(\bar{b}), Q(v, w)\}$$

Levezetés következő órán!

Elsőrendű rezolúció 6. példa

$$K = \{P(x, z) \vee \neg Q(f(x), g(z)), \neg P(g(y), u) \vee R(f(u)), \neg S(t), \neg R(s), S(\bar{b}) \vee P(w, \bar{b}) \vee Q(v, w)\}$$

1. $P(x, z) \vee \neg Q(f(x), g(z))$ $[\in K]$
2. $S(\bar{b}) \vee P(w, \bar{b}) \vee Q(v, w)$ $[\in K]$
3. $P(x, z) \vee S(\bar{b}) \vee P(g(z), \bar{b})$ $[res(1, 2)]$ $(v \parallel f(x))(w \parallel g(z))$
4. $\neg S(t)$ $[\in K]$
5. $P(x, z) \vee P(g(z), \bar{b})$ $[res(3, 4)]$ $(t \parallel \bar{b})$
6. $\neg P(g(y), u) \vee R(f(u))$ $[\in K]$
7. $R(f(\bar{b}))$ $[res(5, 6)]$ 5. faktor: $((x \parallel g(z))(z \parallel \bar{b})$
 $(y \parallel \bar{b})(u \parallel \bar{b})$
8. $\neg R(s)$ $[\in K]$
9. \square $[res(7, 8)]$ $(s \parallel f(\bar{b}))$

Elsőrendű rezolúció 7. példa - nem illeszthető esetek

Készítsünk egy elsőrendű rezolúciós levezetést a következő klózalmazhoz:

$$K1 = \{Q(f(\bar{b})) \vee \neg P(z, g(\bar{a}, z)), P(y, y), \neg Q(x)\}$$

1. $Q(f(\bar{b})) \vee \neg P(z, g(\bar{a}, z))$ [$\in K1$]
2. $\neg Q(x)$ [$\in K1$]
3. $\neg P(z, g(\bar{a}, z))$ [$res(1, 2)$] ($x \parallel f(\bar{b})$)
4. $P(y, y)$ [$\in K1$]
5. nincs [$res(3, 4)$] ($y \parallel z$) (nem lehet illeszteni)

$$K2 = \{P(g(z)) \vee Q(\bar{a}), \neg P(f(g(x))), \neg Q(\bar{b}), \neg Q(f(\bar{a}))\}$$

1. $P(g(z)) \vee Q(\bar{a})$ [$\in K2$]
2. $\neg P(f(g(x)))$ [$\in K2$]
3. $\neg Q(\bar{b})$ [$\in K2$]
4. $\neg Q(f(\bar{a}))$ [$\in K2$]
5. [$res(1, 2)$] $g(z)$ és $(f(g(x)))$ nem illeszthető - különböző fv.
5. [$res(1, 3)$] \bar{a} és \bar{b} nem illeszthető - különböző konstans
5. [$res(1, 4)$] \bar{a} és $f(\bar{a})$ nem illeszthető - konst-fv