

Determinantes

Abrantes Araújo Silva Filho



Vila Velha, 15/09/2019

- 1 Introdução
- 2 Métodos de cálculo
- 3 Propriedades dos determinantes
- 4 Regra de Chió

O que é um determinante?

Um *determinante* ou, mais precisamente, *funções determinante*, são **funções que associam um número real a uma matriz quadrada**.

Como representar um determinante?

Seja a matriz $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. O seu determinante é representado por:

- $\det(A)$
- $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

Os determinantes são definidos para *matrizes quadradas*, ou seja, matrizes $n \times n$. Matrizes não quadradas não têm determinante definido.

- 1 Introdução
- 2 Métodos de cálculo
- 3 Propriedades dos determinantes
- 4 Regra de Chió

Determinante de matriz 1x1

Corresponde ao próprio elemento da matriz:

$$|a_{11}| = a_{11}$$

Determinante de matriz 2x2

É dado pelo produto dos elementos da diagonal principal, **menos** o produto dos elementos da diagonal secundária:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} \sin(\theta) & \cos(\theta) \\ -\cos(\theta) & \sin(\theta) \end{vmatrix} =$$

Determinante de matriz 3x3

Calculamos o determinante pelo **método de Sarrus**:

- 1 Repetir as duas primeiras colunas
- 2 Calcular a soma do produto das “diagonais principais”
- 3 Calcular a soma do produto das “diagonais secundárias”
- 4 Determinante = (resultado em 2) – (resultado em 3)

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \\ 2 & 7 & 5 \end{vmatrix}$$

Determinante de matriz 4x4

Calculamos o determinante pelo **método de Laplace**:

- 1 Escolha uma linha ou coluna da matriz com o maior número de elementos nulos
- 2 Calcule o **menor complementar** e o **cofator** de cada elemento não nulo da linha ou coluna escolhida
- 3 $\text{Determinante} = \sum_{k=1}^n (\text{elemento}_k \times \text{cofator}_k)$, onde n é o número de elementos não nulos na linha ou coluna escolhida

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 3 \end{vmatrix} = ?$$

Menor complementar

O **menor complementar** de um elemento a_{ij} é representado por M_{ij} e corresponde ao determinante da matriz resultante ao eliminarmos a linha i e a coluna j correspondentes ao elemento a_{ij} escolhido.

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 3 \end{vmatrix} = ?$$

Cofator

O **cofator** de um elemento a_{ij} é representado por C_{ij} e é obtido pela fórmula:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \times M_{ij}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 3 \end{vmatrix} = ?$$

Cálculo do determinante

Determinante = $\sum_{k=1}^n (\text{elemento}_k \times \text{cofator}_k)$, onde n é o número de elementos não nulos na linha ou coluna escolhida

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \\ -1 & 7 & 5 & 3 \end{vmatrix} = ?$$

Determinante de matrizes 4x4: Laplace

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 & 1 & 2 \\ -1 & -4 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 \\ 6 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$$

- 1 Introdução
- 2 Métodos de cálculo
- 3 Propriedades dos determinantes**
- 4 Regra de Chió

As seguintes situações resultam em determinante igual a zero, não importando o tamanho da matriz quadrada:

- 1 Linhas (ou colunas) **nulas**
- 2 Linhas (ou colunas) **repetidas**
- 3 Linhas (ou colunas) **proporcionais**
- 4 Linhas (ou colunas) que são **combinações lineares** de outras duas linhas (ou colunas)

As seguintes situações resultam em determinante igual a zero, não importando o tamanho da matriz quadrada:

- 1 Linhas (ou colunas) **nulas**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 9 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

- 2 Linhas (ou colunas) **repetidas**
- 3 Linhas (ou colunas) **proporcionais**
- 4 Linhas (ou colunas) que são **combinações lineares** de outras duas linhas (ou colunas)

As seguintes situações resultam em determinante igual a zero, não importando o tamanho da matriz quadrada:

- 1 Linhas (ou colunas) **nulas**
- 2 Linhas (ou colunas) **repetidas**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 6 \\ 1 & 7 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 4 & 9 & 9 \\ 2 & 7 & 7 \end{pmatrix}$$

- 3 Linhas (ou colunas) **proporcionais**
- 4 Linhas (ou colunas) que são **combinações lineares** de outras duas linhas (ou colunas)

As seguintes situações resultam em determinante igual a zero, não importando o tamanho da matriz quadrada:

- 1 Linhas (ou colunas) **nulas**
- 2 Linhas (ou colunas) **repetidas**
- 3 Linhas (ou colunas) **proporcionais**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ 2 & 9 & 6 \\ 3 & 21 & 9 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 4 & 12 & 9 \\ 2 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

- 4 Linhas (ou colunas) que são **combinações lineares** de outras duas linhas (ou colunas)

As seguintes situações resultam em determinante igual a zero, não importando o tamanho da matriz quadrada:

- 1 Linhas (ou colunas) **nulas**
- 2 Linhas (ou colunas) **repetidas**
- 3 Linhas (ou colunas) **proporcionais**
- 4 Linhas (ou colunas) que são **combinações lineares** de outras duas linhas (ou colunas)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 5 & -5 & 12 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 4 & 12 & 16 \\ 2 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

A cada vez que permutamos duas linhas (ou duas colunas), o novo determinante é o oposto do determinante original (ou seja: o valor absoluto é o mesmo, mas **o sinal é trocado**):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -2 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 16$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \implies \det(B) = -\det(A) = -16$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} \implies \det(C) = -\det(B) = -(-16) = 16$$

Se multiplicarmos uma **única** linha (ou coluna) de uma matriz A por um número escalar real k , o determinante da matriz B resultante é igual ao determinante de A multiplicado por k :
 $\det(B) = k \times \det(A)$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 174$$

$$\begin{aligned} B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -10 \\ 6 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} &\implies \det(B) = -2 \times \det(A) \\ &= -2 \times 174 \\ &= -348 \end{aligned}$$

Se multiplicarmos **todas** as linhas (e, por consequência, todas as colunas) de uma matriz A por um número escalar real k , o determinante da matriz B resultante é igual ao determinante de A multiplicado por k elevado à ordem da matriz:

$$\det(B) = k^n \times \det(A):$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 174$$

$$\begin{aligned} B = \begin{pmatrix} -2 & -6 & -10 \\ -12 & -2 & 4 \\ -4 & -8 & 8 \end{pmatrix} &\implies \det(B) = (-2)^3 \times \det(A) \\ &= -8 \times 174 \\ &= -1392 \end{aligned}$$

O determinante de uma matriz transposta A^t é igual ao determinante da matriz original A (não transposta):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 174$$

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 5 & -2 & -4 \end{pmatrix} \implies \det(A^t) = \det(A) = 174$$

O determinante de uma matriz triangular (superior ou inferior) ou de uma matriz diagonal, é igual ao produto dos elementos de sua diagonal principal:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 346 & \pi & \sqrt[5]{3} \\ 0 & 9 & -500 & 2^{-189} \\ 0 & 0 & -1 & 432 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 2 \cdot 9 \cdot (-1) \cdot (-4) \\ = 72$$

O determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto do determinante de cada matriz:

$$\det(AB) = \det(A) \times \det(B):$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 7 & -2 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 30$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & -2 \end{pmatrix} \implies \det(B) = 21$$

$$\begin{aligned} AB = \begin{pmatrix} 24 & -9 & -1 \\ 8 & 27 & 33 \\ 19 & -18 & -12 \end{pmatrix} &\implies \det(AB) = \det(A) \times \det(B) \\ &= 30 \times 21 \\ &= 630 \end{aligned}$$

Se B for a matriz que resulta quando um múltiplo de uma linha (ou coluna) de uma matriz A é somado a uma outra linha (ou coluna) de A , então $\det(B) = \det(A)$:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 7 & -2 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 30$$

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 15 & 0 \\ 1 & 7 & -2 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix} \implies \det(B) = \det(A) = 30$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 7 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \implies \det(C) = \det(A) = 30$$

O determinante de uma matriz inversa A^{-1} é igual ao inverso multiplicativo (recíproco) do determinante da matriz A

original, ou seja, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & -2 \end{pmatrix} \implies \det(A) = 21$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2/7 & -1/7 & -1/7 \\ 10/21 & -4/7 & -19/21 \\ -3/7 & 5/7 & 5/7 \end{pmatrix} \implies \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \\ = \frac{1}{21}$$

Cuidado!

Em geral o determinante de uma soma de matrizes **não** é igual à soma dos determinantes, ou seja:

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$$

- 1 Introdução
- 2 Métodos de cálculo
- 3 Propriedades dos determinantes
- 4 Regra de Chió

Calcula o determinante “rebaixando” a ordem da matriz:

Regra de Chió

- 1 Se o elemento a_{11} da matriz não for unitário, utiliza-se alguma propriedade para transformá-lo em 1
- 2 Elimina-se a primeira linha e a primeira coluna da matriz, rebaixando-se assim sua ordem
- 3 De cada elemento a_{ij} na matriz rebaixada resultante, **subtrai-se** o produto $a_{i1} \times a_{1j}$
- 4 A matriz obtida tem o mesmo determinante que a matriz original

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix} \implies \det(A) = ?$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -2 & 4 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 6 & -4 \end{pmatrix}$$