

Детская клиника «Кидней»

ДУБЛИКАТ

Консультация педиатра

ФИО: Багомедов Ибрагим Исаевич

Возраст: 7 лет (29.05.2018)

Дата приема: 23.11.2025

Жалобы: кашель, подъем Т тела

Краткий анамнез: Со слов отца, с 20.11 подъем Т тела, кашель, больше в ночные часы.

Получал Тубелон, ингаляции с Беродуалом, Пульмикортом, АЦЦ.

Известно, что брат перенес пневмонию (атипичного генеза)

Перенесенные инфекции, травмы, операции: ветряная оспа, корь, отит, острый бронхит, стрептодермия, острый ларинготрахеит, конъюнктивит; оперативное вмешательство по поводу двусторонней паховой грыжи, перелом ключицы, циркумцизио.

Прививочный анамнез: V1 ККП

Данные осмотра: масса тела: 25 кг, Рост: 126 см., Температура - 35,8 С 0

Общее состояние ближе к удовлетворительному.

На осмотр реагирует спокойно. Аппетит избирательный. Пьет хорошо.

Физическое развитие соответствует возрастной норме.

Кожные покровы смуглые, чистые от высыпаний.

Слизистые оболочки розовые. Умеренная гиперемия зева, миндалины без наложений..

Лимфатическая система без системного увеличения. Носовое дыхание не затруднено , из носа отделяемого нет ,

в легких аускультация затруднена в связи с наложением гипсовой повязки на область груди.

Дыхание ослаблено в нижних отделах слева. Кашель с влажным компонентом. Одышки нет. Sat. 97%.

Сог-тоны ясные ритмичные. Живот не вздут, мягкий, б/б при пальпации.

Стул ежедневный оформленный. Мочеиспускание безболезненное

Отоскопия: AS=AD - без особенностей.

Данные лабораторных и инструментальных исследований: Rg ОГК не проведен, так как достоверная интерпретация рентген снимка невозможна за счет наложения (суммации) гипсовой повязки на органы грудной клетки

Заключение: Острый ринофарингит. Пневмония?

Диагноз: [J00] Острый назофарингит [насморк]

Классификация: Основное заболевание

Рекомендации: 1. Дома проветривать, увлажнять (Т 18-24 С, влажность 40-60%)

2. Обильное питье. Сон с приподнятым головным концом

3. Витамин Д 1000 МЕ х 1 раз в день, давать в первой половине дня

4. Внутрь: Кладид 250 мг: по 3/4 таб (187,5 мг) х 2 раза в день (принимать до еды), давать в одни и те же часы, с интервалом в 12 часов - 7- 10 дней

5. После курса а/б терапии: Энтерол по 1 капс х 2 раза в день - 7 дней

6. Туалет носа Аквалором х 3 раза в день, с последующим отсмаркиванием

7. Контроль Т тела. При нарушении самочувствия - Парацетамол 120 мг/5 мл: 250 мг с интервалом 4-6 часов или Нурофен 100 мг/5 мл: 200 мг с интервалом 6-8 часов

8. Повторный осмотр через 1-2 дня/при ухудшении состояния

9. При резком ухудшении состояния - срочно вызвать по номеру 112!

8 (988) 699-12-14 (w/a). Ответ на Ваше сообщение в течение 24 часов

Дорогой пациент! Второй прием в течение 7 дней проводим БЕСПЛАТНО, но необходима запись в колл-центре.

Врач: Закарьяева Написат Исамутдиновна

Подпись _____

**С диагнозом и
рекомендациями ознакомлен** _____
Багомедова Джамиля Магомедовна