

Консультация педиатра

ФИО: Агаханова Сияна Муслимовна

Возраст: 0 лет 6 месяцев (30.04.2025)

Дата приема: 23.11.2025

Жалобы: насморк вчера, осиплость голоса, кашель (кашель усилился, чаще ночью).

Краткий анамнез: Ребенок от 2 беременности (2 – роды), е/родов на 39,3 неделе. Масса при рождении 3650 г, рост 51 см. По шкале Апгар 8/9 баллов. Выписаны из роддома на 5 сутки. На грудном вскармливании до 1,5 мес.

Питание: смесь "Нестожен" + прикорм.

Болеет 2 сутки. Ребенок относительно активен, стул и диурез в норме, аппетит сохранен.

Проводили вакцинацию Пентаксим 19.11.25 г.

Перенесенные инфекции, травмы, операции: ОРВИ.

Прививочный анамнез: V1 БЦЖ, V3 Гепатит В, V2 Пентаксим.

Данные осмотра: масса тела: 8 500 кг, Рост: 70 см., Температура - 36 С 0 ЧСС - 128/минуту, ЧДД - 32/минуту, сатурация - 99%

Общее состояние удовлетворительное. На осмотр реагирует адекватно, активна.

Физическое развитие соответствует возрастной норме.

Кожные покровы бледно-розовые, чистые от высыпаний.

Слизистые оболочки розовые, чистые от сыпи, зев слабо гиперемирован, затек слизи по задней стенке глотки.

Лимфатическая система без системного увеличения. Носовое дыхание не затруднено, из носа отделяемого нет, в легких пуэрильное дыхание, хрипов нет.

Сог-тоны ясные, ритмичные. Живот не вздут, б/б при пальпации.

Стул ежедневный, без патологических примесей.

Мочеиспускание безболезненное, диурез адекватный

Отоскопия: AS=AD - без особенностей.

Заключение: ОРВИ. Острый назофарингит. Острый ларингит. ДН 0 ст.

Диагноз: [J00] Острый назофарингит [насморк]

Классификация: Основное заболевание

Рекомендации:

1. Общий анализ крови. Анализ крови на СРБ при повышении температуры.

Рентгенография органов грудной клетки.

2. До промывания (при заложенности носа) - називин беби по 1 капле в каждый носовой ход х 3 р/день – не более 5 дней. Туалет носа – Аквалор/Аквамарис/физ раствор + очищать аспиратором х 5-6 р/день.

3. Обильное питье. Сон с приподнятым головным концом.

4. Пульмикорт - 0,25 мг (1 мл) + 3 мл физ раствора х 2 р/день - 3-5 дней. После ингаляции умыться лицо и дать выпить воды.

5. Парацетамол 120 мг/5 мл – 5 мл или цефекон - 100 мг с интервалом в 4-6 часов, нурофен 100 мг/5 мл – 4 мл с интервалом в 6-8 часов. Перед приемом жаропонижающих препаратов используйте физические методы охлаждения (растирания теплой водой, примочки салфетками, смоченными прохладной водой на область лба и подмышечных впадин).

6. Витамин Д – 1000 Ед (вигантол 2 капли) до обеда, длительно.

7. Повторная консультация педиатра при ухудшении состояния/через 2 дня.

8. При резком ухудшении состояния, развитии одышки, втяжении межреберных промежутков, вялости (проведена беседа) - срочно вызвать скорую помощь! (по номеру 112), не дожидаясь ответа врача.

9. 89887803033 - Саида Абдуразаковна, отправить результаты анализов для расшифровки,

срок ответа 12 часов (связь с врачом сохраняется до выздоровления по данному состоянию с 8-30 ч до 12-30 ч и с 19 ч до 21 ч) (отправить фото заключения). Сообщить при изменении в самочувствии.

Дорогой пациент! Второй прием в течение 7 дней проводим БЕСПЛАТНО, но необходима запись в колл-центре.

Врач: Османова Саида Абдуразаковна

Подпись _____

**С диагнозом и
рекомендациями ознакомлен** _____

Селимова Аида Суфьяновна