

Консультация педиатра

ФИО: Муртазалиева Ханифа Саидовна

Возраст: 1 год 1 месяц (17.10.2024)

Дата приема: 23.11.2025

Жалобы: на приеме с мамой, с 22.11. лающий кашель, осиплость голоса, шумное дыхание, ночью повышение температуры до 37,5 С. Домашнее лечение - Мирамистин, ингаляции с физ. р-ром.

Краткий анамнез: Ребенок от 3 беременности (1 и 2 - замершая), протекавшей б/о, от 1 родов на 40 неделе, естественным путем. Масса при рождении 3690 г, рост 54 см. По шкале Апгар 9/баллов. На смеси Нутрилон + из общего

На учете у нефролога с д-ом- ИМВП. 14 дней назад перенесла снова ИМВП.

Перенесенные инфекции, травмы, операции: ИМВП

Прививочный анамнез: по календарю

Данные осмотра: масса тела: 10,7 кг, Рост: 80 см., Температура - 36,6 С 0

Общее состояние удовлетворительное.

На осмотр реагирует адекватно. Очаговых и менингеальных симптомов нет.

Физическое развитие соответствует возрастной норме.

Кожные покровы бледно-розовые, чистые от высыпаний.

Слизистые оболочки розовые, зев гиперемирован, миндалины без налета.

Лимфатическая система без системного увеличения. Носовое дыхание не затруднено, из носа отделяемое прозрачное, в легких жесткое дыхание, хрипов нет.

Сог-тоны ясные, ритмичные. Живот не вздут, мягкий.

Стул ежедневный, без патологических примесей.

Мочеиспускание безболезненное. Дизурии нет

Отоскопия: AS=AD - наружный слуховой проход широкий, барабанная перепонка обзрима, серая, блестящая, опознавательные знаки сохранены.

Заключение: ОРВИ. Острый ларинготрахеит. Стеноз 0

Диагноз: [J00] Острый назофарингит [насморк]

Классификация: Основное заболевание

Рекомендации: 1. Общий анализ крови + СРБ. Общий анализ мочи.

2. Ингаляции с Пульмикортом 0,25 мг - 2 мл + 2,0 мл NaCl 0,9 % - 2 раза в день - 3 дня (при необходимости увеличить Пульмикорт до 4 мл, который 0,25 мг). После ингаляции помыть лицо и дать попить водички.

3. При заложенности носа до промывания -Називин 0,025 % - по 1 впр в каждый носовой ход - 2-3 раза в день, затем минут через 5-10 Туалет носа – Аквалор или Аквамарис мягкий душ + очищать аспиратором

4. Обильное дробное питье.

5. При повышении температуры внутрь сироп Парацетамол 120 мг/5 мл – 6,7 мл или свечи ректально Цефекон - мг с интервалом в 4-6 часов или Нурофен 100 мг/5 мл – 5,5 мл с интервалом в 6-8 часов.

6. Витамин Д – 1000 Ед (Вигантол 2 капли) до обеда, длительно.

7. Оптимальный режим дня, рациональное питание, соблюдение микроклимата (температурный режим- 18- 23 С, влажность 40-60 %)

8. Повторная консультация педиатра при ухудшении состояния/через 2 дня.

9. При резком ухудшении состояния - срочно вызвать скорую помощь! (по номеру 112). О красных флагах проинформированы!

10. 8925-262-67-62 – Айна Абдурахмановна. Скинуть результаты анализов для расшифровки - срок ответа – 12 часов. Писать по факту данного обращения

Дорогой пациент! Второй прием в течение 7 дней проводим БЕСПЛАТНО, но необходима запись в колл-центре.

Врач: Алиева Айнугаят Абдурахмановна

Подпись _____

**С диагнозом и
рекомендациями ознакомлен** _____

Магомедова Зарина Арсеновна