



## **Xyba Project**

### **Matematika Dasar II Pembahasan UTS 2017**

1. This document is version: 0.9.5  
Version should be at least 0.9 if you want to share this document to other people.
2. You may not share this document if version is less than 1.0 unless you have my permission to do so
3. This document is created by Xyba, Student of Mathematics University of Indonesia Batch 2016
4. Should there be any mistakes or feedbacks you'd like to give, please contact me
5. Last Updated: 18/07/2018

Thank you for your cooperation >v<

1. Kerjakan sesuai perintah!

a. Jika  $y = \arctan(\sin(x))$ , carilah  $\frac{dy}{dx}$

b. Selesaikan  $\int \frac{e^x}{e^{2x}-3e^x+2} dx$

c. Buktikan  $\int \cos^n x dx = \frac{\cos^{n-1}(x) \sin(x)}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx$ , kemudian hitunglah:  

$$\int_0^\pi \cos^8(x) dx$$

Jawab:

a. Diberikan  $y = \arctan(\sin(x))$ , maka:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d(\arctan(\sin(x)))}{d(\sin(x))} \cdot \frac{d(\sin(x))}{dx} = \frac{1}{1 + \sin^2 x} (\cos x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$$

b. Perhatikan:

$$\frac{1}{u^2 - 3u + 2} = \frac{1}{(u-1)(u-2)} = \frac{A}{u-1} + \frac{B}{u-2}$$

$$\Leftrightarrow 1 = A(u-2) + B(u-1)$$

$$u = 1 \rightarrow -A = 1 \rightarrow A = -1$$

$$u = 2 \rightarrow B = 1$$

Sehingga:

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x}{e^{2x} - 3e^x + 2} dx &= \int \frac{e^x}{(e^x - 1)(e^x - 2)} \frac{d(e^x)}{e^x} \\ &= \int \frac{1}{(e^x - 1)(e^x - 2)} d(e^x) \\ &= \int \left( \frac{-1}{e^x - 1} + \frac{1}{e^x - 2} \right) d(e^x) \\ &= - \int \frac{1}{e^x - 1} d(e^x) + \int \frac{1}{e^x - 2} d(e^x) \\ &= -\ln|e^x - 1| + \ln|e^x - 2| + C \end{aligned}$$

c. Akan dibuktikan:

$$\int \cos^n x dx = \frac{\cos^{n-1}(x) \sin(x)}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx$$

Perhatikan:

$$\frac{d(\cos^{n-1} x)}{dx} = \frac{d(\cos^{n-1} x)}{d(\cos x)} \frac{d(\cos x)}{dx} = (n-1) \cos^{n-2} x (-\sin x)$$

Maka:

$$\begin{aligned} \int \cos^n x dx &= \int (\cos^{n-1} x \cos x) dx \\ &= u \cdot dv, \quad u = \cos^{n-1} x \rightarrow du = (n-1) \cos^{n-2} x (-\sin x) dx \\ &\quad dv = \cos x dx \rightarrow v = \sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= uv - \int v du \\
&= \cos^{n-1} x \sin x - \int (\sin x (n-1) \cos^{n-2} x (-\sin x)) dx \\
&= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int (\sin^2 x)(\cos^{n-2} x) dx \\
&= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int (1 - \cos^2 x)(\cos^{n-2} x) dx \\
&= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int (\cos^{n-2} x - \cos^n x) dx \\
&= \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx - (n-1) \int \cos^n x dx
\end{aligned}$$

Sehingga:

$$\begin{aligned}
&\int \cos^n x dx = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx - (n-1) \int \cos^n x dx \\
&\Leftrightarrow \int \cos^n x + (n-1) \int \cos^n x dx = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx \\
&\Leftrightarrow n \int \cos^n x dx = \cos^{n-1} x \sin x + (n-1) \int \cos^{n-2} x dx \\
&\Leftrightarrow \int \cos^n x dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx
\end{aligned}$$

Sehingga, terbukti bahwa:

$$\int \cos^n(x) dx = \frac{\cos^{n-1}(x) \sin(x)}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx$$

Sekarang, kita akan gunakan informasi ini untuk menentukan:

$$\int_0^{\pi} \cos^8(x) dx$$

Perhatikan:

$$\begin{aligned}
&\int \cos^8(x) dx = \frac{\cos^7(x) \sin(x)}{8} + \frac{7}{8} \int \cos^6(x) dx \\
&= \frac{\cos^7(x) \sin(x)}{8} + \frac{7}{8} \left( \frac{\cos^5(x) \sin(x)}{6} + \frac{5}{6} \int \cos^4(x) dx \right) \\
&= \frac{\cos^7(x) \sin(x)}{8} + \frac{7}{8} \left( \frac{\cos^5(x) \sin(x)}{6} + \frac{5}{6} \left( \frac{\cos^3(x) \sin(x)}{4} + \frac{3}{4} \int \cos^2 x dx \right) \right) \\
&= \frac{\cos^7(x) \sin(x)}{8} + \frac{7}{8} \left( \frac{\cos^5(x) \sin(x)}{6} + \frac{5}{6} \left( \frac{\cos^3(x) \sin(x)}{4} + \frac{3}{4} \left( \frac{\cos(x) \sin(x)}{2} + \frac{1}{2} \int dx \right) \right) \right) \\
&= \frac{\cos^7(x) \sin(x)}{8} + \frac{7}{8} \left( \frac{\cos^5(x) \sin(x)}{6} + \frac{5}{6} \left( \frac{\cos^3(x) \sin(x)}{4} + \frac{3}{4} \left( \frac{\cos(x) \sin(x)}{2} + \frac{1}{2} x \right) \right) \right) + C
\end{aligned}$$

Karena untuk  $x = 0$  persamaan tersebut akan bernilai  $0 + C$  dan karena  $\sin(\pi) = 1$  serta  $\cos(\pi) = 0$ , maka:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \cos^8(x) dx &= \left[ \int \cos^8(x) dx \right]_0^\pi = \int \cos^8(x) dx|_{x=\pi} - 0 \\&= \left( \frac{\cos^7(x) \sin(x)}{8} + \frac{7}{8} \left( \frac{\cos^5(x) \sin(x)}{6} + \frac{5}{6} \left( \frac{\cos^3(x) \sin(x)}{4} + \frac{3}{4} \left( \frac{\cos(x) \sin(x)}{2} + \frac{1}{2} x \right) \right) \right) \right) \bigg|_{x=\pi} \\&= \frac{0^7 1}{8} + \frac{7}{8} \left( \frac{0^5 1}{6} + \frac{5}{6} \left( \frac{0^3 1}{4} + \frac{3}{4} \left( \frac{0 \cdot 1}{2} + \frac{1}{2} \pi \right) \right) \right) \\&= 0 + \frac{7}{8} \left( 0 + \frac{5}{6} \left( 0 + \frac{3}{4} \left( 0 + \frac{1}{2} \pi \right) \right) \right) = \frac{7}{8} \left( \frac{5}{6} \left( \frac{3}{4} \left( \frac{1}{2} \pi \right) \right) \right) \\&= \frac{105}{384} \pi\end{aligned}$$

2. Diberikan grafik persamaan polar  $r = 6 \sin 2\theta$ 
  - a. Selidiki kesimetrian grafik polar di atas dengan menggunakan uji-uji kesimetrian
  - b. Sketsa grafik polar di atas
  - c. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik polar di atas yang terletak di kuadran satu

Jawab:

- a. Akan diuji kesimetrian dari  $r = 6 \sin 2\theta$

-  $\theta = -\theta$

$$r = 6 \sin(2\theta) \xrightarrow{\theta=-\theta} 6 \sin(2(-\theta)) = 6 \sin(-2\theta) = -6 \sin(2\theta) = -r$$

Dengan kata lain,  $(r, \theta) \xrightarrow{\theta=-\theta} (-r, -\theta)$ . Artinya  $r$  simetri terhadap sumbu  $y$ .

-  $\theta = \pi - \theta$

$$r = 6 \sin(2\theta) \xrightarrow{\theta=\pi-\theta} 6 \sin(2(\pi - \theta)) = 6 \sin(2\pi - 2\theta) = -6 \sin(2\theta) = -r$$

Dengan kata lain,  $(r, \theta) \xrightarrow{\theta=\pi-\theta} (-r, -\theta)$ . Artinya  $r$  simetri terhadap sumbu  $x$ .


-  $\theta = \pi + \theta$

$$r = 6 \sin(2\theta) \xrightarrow{\theta=\pi+\theta} 6 \sin(2(\pi + \theta)) = 6 \sin(2\pi + 2\theta) = 6 \sin(2\theta) = r$$

Dengan kata lain,  $(r, \theta) \xrightarrow{\theta=\pi+\theta} (r, \theta)$ . Artinya  $r$  simetri terhadap titik asal.

(Karena  $r$  simetri terhadap sumbu  $x$  dan  $y$ , sudah dapat dikatakan  $r$  simetri terhadap titik asal sehingga tidak perlu dicek jika tidak ingin)

- b.  $r = 6 \sin(2\theta)$  akan berbentuk mawar dengan banyak bunga  $2 \times 2 = 4$  karena 2 genap.



- c. Karena kuadran 1 dibatasi oleh 0 dan  $\frac{\pi}{2}$ , maka luas daerah yang dibatasi oleh grafik polar di atas yang terletak di kuadran satu diberikan oleh:

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} (f(\theta))^2 d\theta$$

Maka:

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (6 \sin(2\theta))^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (36 \sin^2(2\theta)) d\theta = 18 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2\theta) d\theta \\ &= 18 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2\theta) d\theta = 18 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(4\theta) \right) d\theta = 9 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos(4\theta)) d\theta \\ &= 9 \left[ \theta - \frac{1}{4} \sin(4\theta) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 9 \left[ \left( \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4} \sin(2\pi) \right) - \left( 0 - \frac{1}{4} \sin(0) \right) \right] = 9 \left( \frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{9}{2} \pi \end{aligned}$$

3. Kerjakan sesuai perintah!

a. Carilah  $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2x + e^{\frac{x}{3}}\right)^{\frac{3}{x}}$

b. Periksa kekonvergenan dari  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|2x|} dx$

Jawab:

a. Akan ditentukan:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(2x + e^{\frac{x}{3}}\right)^{\frac{3}{x}}$$

Definisikan:

$$y = \left(2x + e^{\frac{x}{3}}\right)^{\frac{3}{x}}$$

Perhatikan:

$$\begin{aligned} y &= \left(2x + e^{\frac{x}{3}}\right)^{\frac{3}{x}} \\ \Leftrightarrow \ln y &= \frac{3}{x} \ln \left(2x + e^{\frac{x}{3}}\right) \\ \Leftrightarrow \ln y &= \frac{3 \ln \left(2x + e^{\frac{x}{3}}\right)}{x} \end{aligned}$$

Sehingga:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \ln y &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \ln \left(2x + e^{\frac{x}{3}}\right)}{x} = \frac{0}{0} \\ &\stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2x + e^{\frac{x}{3}}} \left(2 + \frac{1}{3} e^{\frac{x}{3}}\right)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + e^{\frac{x}{3}}}{2x + e^{\frac{x}{3}}} = \frac{6 + 1}{0 + 1} = \frac{7}{1} = 7 \end{aligned}$$

Sehingga:

$$\lim_{x \rightarrow 0} y = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \ln y} = e^7$$

b. Akan diperiksa kekonvergenan dari:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|2x|} dx$$

Perhatikan integral tersebut merupakan integral tak wajar yang tidak terbatas di kedua batasnya maka:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|2x|} dx &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{-(-2x)} dx + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-(2x)} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^0 e^{2x} dx + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-2x} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \lim_{a \rightarrow -\infty} [e^{2x}]_a^0 - \frac{1}{2} \lim_{b \rightarrow \infty} [e^{-2x}]_0^b \\
&= \frac{1}{2} \left( 1 - \lim_{a \rightarrow -\infty} e^{2a} \right) - \frac{1}{2} \left( \lim_{b \rightarrow \infty} e^{-2b} - 1 \right) \\
&= \frac{1}{2} (1 - 0) - \frac{1}{2} (0 - 1) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \\
&= 1
\end{aligned}$$

Artinya  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|2x|} dx$  konvergen.

4. Kerjakan sesuai perintah!

- Posisi sebuah titik pada saat  $t$  dinyatakan sebagai  $x = \frac{1}{2}t^2, y = \frac{1}{9}(6t + 9)^{3/2}$ .  
Tentukan jarak yang ditempuh oleh titik tersebut dari  $t = 0$  sampai  $t = 4$ .
- Tentukan luas permukaan yang terbentuk apabila kurva  $x = y^3$  antara  $y = 0$  dan  $y = 1$  diputar mengelilingi sumbu  $y$ .

Jawab:

- Jarak yang ditempuh di sini akan sama dengan dari panjang kurva tersebut, sehingga:

$$L = S(\alpha, \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

Diberikan:

$$x = \frac{1}{2}t^2 \rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2}(2t) = t$$

$$y = \frac{1}{9}(6t + 9)^{3/2} \rightarrow \frac{dy}{dt} = \left(\frac{1}{9}\right)\left(\frac{3}{2}\right)(6)(6t + 9)^{1/2} = (6t + 9)^{1/2} = \sqrt{6t + 9}$$

Maka:

$$\begin{aligned}
L &= \int_0^4 \sqrt{(t)^2 + (\sqrt{6t + 9})^2} dt = \int_0^4 \sqrt{t^2 + 6t + 9} dt = \int_0^4 \sqrt{(t + 3)^2} dt = \int_0^4 (t + 3) dt \\
&= \left[ \frac{1}{2}t^2 + 3t \right]_0^4 = [(8 + 12) - 0] = 20
\end{aligned}$$

- Karena  $x = g(y)$  diputar mengelilingi sumbu  $y$  dengan  $a \leq y \leq b$ , maka luas permukaannya diberikan oleh:

$$A = \int_a^b 2\pi x \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

Maka:

$$\begin{aligned} A &= 2\pi \int_0^1 y^3 \sqrt{1 + (3y^2)^2} dy = 2\pi \int_0^1 y^3 \sqrt{1 + 9y^4} dy \\ &= 2\pi \int_{y=0}^{y=1} y^3 \sqrt{1 + 9y^4} \frac{d(1 + 9y^4)}{36y^3} = \frac{\pi}{18} \int_{y=0}^{y=1} \sqrt{1 + 9y^4} d(1 + 9y^4) \\ &= \frac{\pi}{18} \left( \frac{2}{3} \left[ (1 + 9y^4)^{\frac{3}{2}} \right]_{y=0}^{y=1} \right) = \frac{\pi}{27} \left[ (1 + 9y^4)^{\frac{3}{2}} \right]_{y=0}^{y=1} \\ &= \frac{\pi}{27} \left[ (10)^{\frac{3}{2}} - (1)^{\frac{3}{2}} \right] = \frac{\pi}{27} (10\sqrt{10} - 1) \end{aligned}$$



## Afterword

Pembuatan dokumen ini dibantu oleh:

1. namora03, Matematika UI 2016.
2. rilo\_chand, Matematika UI 2016.