1:利斯敦. ≥1(x; < x) 表示样本中小于等于x的个数。

强: Fn→>F 条件: n→∞.

 $\overline{VBB}: E[1(x_i \leq x)] = I P_r(x_i \leq x) + O(1 - P_r(x_i \leq x))$ $= P_r(x_i \leq x)$ $Var(1(x_i \leq x)) = (I - P_r(x_i \leq x))^2 P_r(x_i \leq x)$ $+ (O - P_r(x_i \leq x))^2 (I - P_r(x_i \leq x))$ = P(I - P)[(I - P) + P] = P(I - P) $E[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 1(x_i \leq x)] = \frac{1}{n} n P = P = F(x)$ $Var(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 1(x_i \leq x)) = \frac{1}{n^2} n P(I - P) = \frac{1}{n} P(I - P) \longrightarrow O$ $E[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 1(x_i \leq x)] = \frac{1}{n^2} n P(I - P) = \frac{1}{n} P(I - P) \longrightarrow O$ $E[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} 1(x_i \leq x)] = \frac{1}{n^2} n P(I - P) = \frac{1}{n} P(I - P) \longrightarrow O$

Bootstrap 思想

用機構統計量,作为对真实值的估计。估计误差多大?
例: $\bar{x}_{n} = \frac{1}{h} \stackrel{\sim}{\hookrightarrow}_{n} x_{i}$ 作为均值 \mathcal{U} 的估计。 \bar{x}_{n} 的误差 (标待差) 是 $se(\bar{x}_{n}) = \frac{6}{h}$ 因为 $Var(\bar{x}_{n}) = \frac{1}{h^{2}}(n\sigma^{2}) = \frac{\sigma^{2}}{n}$ 再用 σ 的估计量,比如 $\hat{\sigma} = \frac{1}{h} \stackrel{\sim}{\hookrightarrow}_{n} (x_{i} - \bar{x}_{n})^{2}$ 代入 f_{n} ,即可

但有时事情不这么简单

得 Xu 的标准系

任给一统计量 $T_n = g(x_1, \dots, x_n)$, $se(T_n)$ 未必可简单写出. 地即 $\int (T_n - E(T_n))^2 dF(x) = |ar_F(T_n)| 未知.$

用 Var (Tn) 代替?

想法不错,但Var Fn(Tn)就能简单写出吗?

我们强行军吧:

·从外,…,~~中再抽样,也即再次数下的一个抽样分布然…,~~

ο it {x*, ·, x* { 生成 B次, Tn*=g(x*, ·, x*) 就有3

T*, ..., T*

 $Var_{Boot} = \frac{1}{P_0} \sum_{h=1}^{B} \left(T_{hb}^* - \frac{1}{B} \sum_{r=1}^{B} T_{hr}^* \right)^2$

 $Var_{F}(T_{n}) \approx Var_{F_{n}}(T_{n}) \approx Var_{Boot}(T_{n}^{*})$