CONCEPTO · ETAPA 1 · 1/54

¿Qué es la hipertensión y por qué se trata?

FISIOLOGÍA · ETAPA 1 · 3/54

¿Cómo funciona el eje renina-angiotensina-aldosterona y dónde actúan los fármacos?

CASO CLÍNICO · ETAPA 4 · 16/54

Tos seca

3 semanas con enalapril



CASO CLÍNICO

Mujer de 56 años hipertensa que empezó enalapril hace 3 semanas. Consulta por una tos seca e irritativa, sin fiebre ni expectoración, con radiografía de tórax normal.

¿Qué haces?

EFECTO ADVERSO · ETAPA 4 · 17/54

¿Por qué los IECA dan tos y angioedema?

COMPARATIVA · ETAPA 4 · 20/54


IECA frente a ARA-II

ALGORITMO · ETAPA 8 · 46/54

Hipertensión recién diagnosticada: ¿cómo empiezo?

FISIOLOGÍA · ETAPA 1 · 3/54

¿Cómo funciona el eje renina-angiotensina-aldosterona y dónde actúan los fármacos?



Si se activa de más: hipertensión, retención de líquido y fibrosis; y frenarlo sube el potasio (menos aldosterona)

infocitos

CONCEPTO · ETAPA 1 · 1/54

¿Qué es la hipertensión y por qué se trata?

En una frase	Una presión arterial mantenida de 140/90 mmHg o más
Imagínalo así	Una manguera a demasiada presión que va desgastando las tuberías
Qué daña	Los «órganos diana»: corazón, cerebro, riñón, retina y arterias
Por qué importa	Casi nunca da síntomas; se trata para prevenir infartos, ictus y daño renal

Algunas guías usan 130/80 mmHg como límite.

infocitos

EFECTO ADVERSO · ETAPA 4 · 17/54

¿Por qué los IECA dan tos y angioedema?

IECA bloquea la ECA → se acumula bradicinina → **tos y angioedema**

Por qué	La ECA también destruye la bradicinina; al bloquearla, la bradicinina se acumula
Tos	Seca e irritativa, en alrededor de 1 de cada 10 pacientes; aparece en semanas o meses
Angioedema	Hinchazón de labios, lengua o glotis; raro, pero puede ser mortal
Si hay tos	Cambiar a un ARA-II, que no acumula bradicinina
Si hay angioedema	Retirar para siempre los IECA y vigilar la vía aérea

El angioedema por IECA responde mal a antihistamínicos y corticoides porque se debe a bradicinina, no a histamina.

infocitos

CASO CLÍNICO · ETAPA 4 · 16/54

Respuesta

✓ **Es la tos típica del IECA, por acumulación de bradicinina**

✓ Cambia a un ARA-II, que controla la presión igual y no da tos

✓ La tos desaparece en días o semanas tras retirar el IECA; no hace falta jarabe

infocitos

ALGORITMO · ETAPA 8 · 46/54

Hipertensión recién diagnosticada: ¿cómo empiezo?

1. **Confirma** con medidas fuera de la consulta (automedida o MAPA) y busca daño en riñón, corazón y retina
2. **Cambios de vida para todos** menos sal, perder peso, ejercicio y menos alcohol
3. **Fármacos** en la mayoría, dos en una sola pastilla: IECA o ARA-II con amlodipino o con tiazida
4. **Si no basta** los tres juntos; después, espironolactona (hipertensión resistente)

✕ **Evita** un IECA y un ARA-II juntos; más daño renal y potasio sin beneficio

Los betabloqueantes se añaden cuando hay otra indicación: angina, infarto, insuficiencia cardiaca o fibrilación auricular.

infocitos

COMPARATIVA · ETAPA 4 · 20/54

IECA frente a ARA-II

	IECA	ARA-II
Dónde actúan	frenan la enzima ECA	bloquean el receptor AT1
Tos	en 1 de cada 10	casi nunca
Angioedema	más frecuente	raro
Indicaciones	hipertensión, insuficiencia cardiaca, proteinuria	las mismas

Nunca juntos: más daño renal y potasio alto sin beneficio.

infocitos

¿TE GUSTÓ?

Consigue el paquete completo

583 tarjetas en 11 bloques: 64 esquemas, 119 casos clínicos y 32 algoritmos. PDF para el móvil, PDF para imprimir y mazo de Anki.

1 Con tarjeta

Entra en infocitos.github.io y pulsa «Comprar». Te llega todo al correo al momento.

2 Por QR

Escríbenos al WhatsApp +591 77343575, paga con el QR y envía el comprobante con tu nombre y tu correo. Te mandamos tu acceso personal.

Precio de lanzamiento: 49 Bs o 7 USD, hasta el 6 de diciembre.