

## T.D. III - Intégration

### I - Primitives & Intégrales

**Exercice 1. (🔧)** Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{x^3+5x^2-4}{x^2}</math>.</li> <li>2. <math>\frac{8x^2}{(x^3+2)^3}</math>.</li> <li>3. <math>x\sqrt{1-2x^2}</math>.</li> <li>4. <math>(e^x+1)^3e^x</math>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <math>\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}</math>.</li> <li>6. <math>\frac{x^2}{\sqrt{5+x^3}} dx</math>.</li> <li>7. <math>\frac{\ln(x)}{x}</math>.</li> </ol> |
|--|---|

**Exercice 2. (Changements de variables, 🔧)** Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\frac{1}{e^x+1}</math>.<br/><math>\varphi : u \mapsto \ln(u)</math>.</li> <li>2. <math>\frac{1-\sqrt{t}}{\sqrt{t}}</math>.<br/><math>\varphi : u \mapsto \sqrt{u}</math>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <math>\frac{1}{2t \ln(t)+t}</math>.<br/><math>\varphi : u \mapsto e^u</math>.</li> <li>4. <math>\frac{x^3}{\sqrt{x^2+2}}</math>.<br/><math>\varphi : u \mapsto \sqrt{u-2}</math>.</li> </ol> |
|--|--|

**Exercice 3. (Intégrations par parties, 🔧)** Déterminer une primitive des fonctions suivantes :

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\ln(x)</math>.</li> <li>2. <math>xe^x</math>.</li> <li>3. <math>x^2e^x</math>.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <math>x^2 \ln(x)</math>.</li> <li>5. <math>\sqrt{1+x} \ln(x)</math>.</li> </ol> |
|---|---|

**Exercice 4.**

1. Montrer qu'il existe  $a, b$  réels tels que pour tout  $x \in [0, 1]$ ,  
 $\frac{x}{(x+1)(x+2)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2}$ .
2. En déduire la valeur de  $\int_0^1 \frac{x}{(x+1)(x+2)} dx$ .

**Exercice 5. (🔧)** Montrer que  $\frac{1}{3} \leq \int_0^1 \frac{dt}{1+t+t^2} \leq 1$ .

**Exercice 6. (Loi exponentielle, 🔧)** Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = 0$  si  $x < 0$  et  $f(x) = 2e^{-2x}$  sinon.

1. Représenter graphiquement la fonction  $f$ .

2. Déterminer les intégrales suivantes :

a)  $\int_{-2}^0 f(x) dx$ .
 b)  $\int_{-1}^{3/2} f(x) dx$ .

3. Si  $x \geq 0$ , déterminer  $\int_0^x f(t) dt$  et en déduire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt$ .

**Exercice 7. (🔧)**

1. Montrer que, pour tout  $k \geq 2$ ,

$$\int_{k-1}^k \ln(t) dt \leq \ln(k) \leq \int_k^{k+1} \ln(t) dt.$$

2. En déduire que, pour tout  $n \geq 1$ ,

$$\int_1^n \ln(t) dt \leq \ln(n!) \leq \int_1^n \ln(t) dt + \ln(n).$$

3. En utilisant une primitive de  $\ln$ , en déduire la limite de la suite de terme général  $\frac{\ln(n!)}{n \ln(n)}$ .

**Exercice 8. (🔧)** Pour tout  $x \in [0, 1]$ , on pose  $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln(t)}$ .

1. En utilisant la concavité du logarithme, montrer que

$$\forall x \in ]0, 1[, \forall t \in ]x^2, 1[, \frac{2 \ln(x)}{x^2 - 1}(t - 1) \leq \ln(t) \leq t - 1.$$

2. Montrer que  $f$  est prolongeable par continuité en 1.

3. Montrer que  $f$  est dérivable sur  $[0, 1[$  et calculer sa dérivée.

## II - Suites d'intégrales

**Exercice 9. (✱✱)** Pour tout  $n$  entier naturel, on pose  $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$ .

1. Montrer que  $(I_n)$  converge et déterminer sa limite.
2. Calculer  $I_n + I_{n+1}$ .

3. En déduire la limite de la suite de terme général  $\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}$ .

**Exercice 10.** Pour tout  $n$  entier naturel, on pose  $I_n = \int_0^1 \ln(1+x^n) dx$ .

1. Montrer que :  $\forall x \geq 0, 0 \leq \ln(1+x) \leq x$ .
2. En déduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .

**Exercice 11.** Pour tout  $n$  entier naturel non nul, on pose  $I_n = \int_0^1 x^n \ln(1+x^2) dx$  et  $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx$ .

1. a) Calculer  $J_1$ .  
b) Montrer que, pour tout  $n$  entier naturel non nul,  $0 \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$ .  
c) En déduire que  $(J_n)$  converge et déterminer sa limite.
2. a) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que :

$$\forall n \geq 1, I_n = \frac{\ln(2)}{n+1} - \frac{2}{n+1} J_{n+2}.$$

- b) Montrer que la suite  $(I_n)$  converge.
- c) Montrer que la suite  $(nI_n)$  converge et déterminer sa limite.

**Exercice 12. (Fonction bêta)** Pour tout  $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ , on note  $I_{p,q} = \int_0^1 x^p (1-x)^q dx$ .

1. Déterminer une relation entre  $I_{p,q}$  et  $I_{p+1,q-1}$ .
2. Exprimer la valeur de  $I_{p,q}$  à l'aide de factorielles.

## III - Calculs d'intégrales généralisées

**Exercice 13. (✱✱)** Calculer, si elles existent, les intégrales suivantes :

$$\begin{array}{|l} \text{1. } \int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{t}}}{\sqrt{t}} dt. \\ \text{2. } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+1)(x+2)}. \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{\frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2}}{(x+1)(x+2)}. \\ \text{3. } \int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{t} dt. \end{array} \right| \quad \text{4. } \int_2^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln(t))^2}.$$

**Exercice 14. (Loi uniforme, ✱✱)** Soit  $a < b$  et  $f$  la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Déterminer  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ .

**Exercice 15. (Loi exponentielle, ✱✱)** Soit  $\lambda > 0$  et  $f$  la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Déterminer  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ .

**Exercice 16. (✱✱)** Montrer que les intégrales suivantes convergent :

1.  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$ .  
 $\forall t \geq 1, e^{-t^2} \leq e^{-t}$ .
2.  $\int_0^{+\infty} \sqrt{t} e^{-t} dt$ .  
 $\forall t \geq a, \sqrt{t} e^{-t} \leq 1/t^2$ .

## IV - Intégrations par parties - Changement de variable

**Exercice 17. (Expression intégrale de la factorielle, ⚙️)** Pour tout  $n$  entier naturel, on pose  $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ .

1. Calculer  $I_0$ .
2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .
  - a) Montrer qu'il existe un réel  $a$  tel que

$$\forall t \geq a, 0 \leq t^n e^{-t} \leq \frac{1}{t^2}.$$

- b) En déduire que l'intégrale  $I_n$  converge.
3. En utilisant une intégration par parties sur le segment  $[0, M]$ , puis en faisant tendre  $M$  vers  $+\infty$ , montrer que  $I_{n+1} = nI_n$ .
4. En déduire, pour tout  $n$  entier naturel, la valeur de  $I_n$ .

**Exercice 18. (Fonction Gamma d'Euler, ⚙️)** Pour tout réel  $x$  strictement positif, on pose  $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ .

1. Soit  $x > 0$ .
  - a) Pour tout  $t \in ]0, 1]$ , rappeler la définition de  $t^{x-1}$ .
  - b) Montrer que, pour tout  $t \in ]0, 1]$ ,  $t^{x-1} e^{-t} \leq e^{-t}$ .
  - c) En déduire que  $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$  converge.
  - d) Montrer qu'il existe un réel  $a$  tel que

$$\forall t \geq a, t^{x-1} e^{-t} \leq e^{-t/2}.$$

- e) En déduire que  $\int_a^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$  converge.
  - f) En déduire que la fonction  $\Gamma$  est bien définie.
2. En utilisant une intégration par parties sur le segment  $[\varepsilon, M]$  puis en faisant tendre  $\varepsilon$  vers 0 et  $M$  vers  $+\infty$ , montrer que  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ .

3. En déduire, pour tout  $n$  entier naturel, la valeur de  $\Gamma(n+1)$ .

**Exercice 19.** On pose  $I = \int_0^1 \frac{x-1}{\ln(x)} dx$ .

1. Existence. On pose  $f : x \mapsto \frac{x-1}{\ln(x)}$ .
  - a) Montrer que  $f$  admet un prolongement continu en 0.
  - b) Montrer que  $f$  admet un prolongement continu en 1.
  - c) En déduire que l'intégrale  $I$  converge.
2. On pose  $J_{\varepsilon, M} = \int_{\varepsilon}^M \frac{x-1}{\ln(x)} dx$ .
  - a) Effectuer le changement de variable  $\varphi : u \mapsto e^{-u}$  dans  $J_{\varepsilon, M}$ .
  - b) En utilisant la linéarité de l'intégrale, calculer  $J_{\varepsilon, M}$ .
  - c) En faisant tendre successivement  $M$  vers  $+\infty$ , puis  $\varepsilon$  vers 0, en déduire la valeur de  $I$ .