

T.D. VII - Applications linéaires

I - Applications linéaires

Solution de l'exercice 1.

1. Soit $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2)$ des éléments de \mathbb{R}^3 et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\begin{aligned} f_1(u + \lambda v) &= f_1(x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2, z_1 + \lambda z_2) \\ &= (-(x_1 + \lambda x_2) + 2(y_1 + \lambda y_2), 2(x_1 + \lambda x_2) - 3(y_1 + \lambda y_2) + (z_1 + \lambda z_2)) \\ &= (-x_1 + 2y_1, 2x_1 - 3y_1 + z_1) + \lambda(-x_2 + 2y_2, 2x_2 - 3y_2 + z_2) \\ &= f_1(u) + \lambda f_1(v). \end{aligned}$$

Ainsi, f_1 est une application linéaire.

$(x, y, z) \in \text{Ker } f_1$ si et seulement si $f_1(x, y, z) = (0, 0)$ si et seulement si

$$\begin{aligned} \begin{cases} -x + 2y &= 0 \\ 2x - 3y + z &= 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} -x + 2y &= 0 \\ y + z &= 0 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow 2L_1 + L_2 \\ &\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} ; \begin{cases} x &= -2\lambda \\ y &= -\lambda \\ z &= \lambda \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{Ker } f_1 = \text{Vect}\{(-2, -1, 1)\}$.

Comme $\dim \text{Ker } f_1 = 1$, d'après le théorème du rang,

$$\text{Rg}(f) = 3 - \dim \text{Ker } f = 2.$$

Comme $\text{Im } f_1 \subset \mathbb{R}^2$ et $\dim(\text{Im } f_1) = \dim \mathbb{R}^2$, alors $\text{Im } f_1 = \mathbb{R}^2$.

2° Méthode.

$$\begin{aligned} \text{Im}(f) &= \text{Vect}\{f_1(1, 0, 0), f_1(0, 1, 0), f_1(0, 0, 1)\} \\ &= \text{Vect}\{(-1, 2), (2, -3), (0, 1)\} \\ &= \text{Vect}\{(-1, 0), (2, 0), (0, 1)\} \\ &= \text{Vect}\{(1, 0), (0, 1)\} = \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

2. TODO

3. TODO

4. On remarque que si $u = (1, 0, 1)$, alors

$$f_4(2u) = f_4(2, 0, 2) = 2(2, 2) = 4(1, 1)$$

et

$$2f_4(u) = 2f_4(1, 0, 1) = 2 \times 1(1, 1) = 2(1, 1)$$

Ainsi, $f_4(2u) \neq 2f_4(u)$ et la fonction f_4 n'est pas linéaire.

5. TODO □

Solution de l'exercice 2. Raisonnons par double implication.

(\Rightarrow) Supposons que $g \circ f = 0$. Montrons que $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(g)$.

Soit $y \in \text{Im}(f)$. Il existe $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $y = f(x)$. Ainsi,

$$g(y) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) = 0$$

et $y \in \text{Ker}(g)$.

Donc, $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(g)$.

(\Leftarrow) Supposons que $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(g)$. Montrons que $g \circ f = 0$.

Soit $x \in \mathbb{R}^n$. Alors, $f(x) \in \text{Im}(f)$, donc $f(x) \in \text{Ker}(g)$ et

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 0.$$

Ainsi, $g \circ f = 0$. □

Solution de l'exercice 3. Comme f est une application linéaire, alors $\text{Im}(f)$ est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R} . Ainsi, $\dim \text{Im}(f) \leq 1$.

Comme f n'est pas l'application nulle, alors $\text{Im}(f) \neq \{0\}$, donc $\dim \text{Im}(f) \geq 1$.

Finalement, $\dim \text{Im}(f) = 1$ et $\text{Im}(f) \subset \mathbb{R}$, donc $\text{Im}(f) = \mathbb{R}$.

Ainsi, f est une application surjective.

2^e méthode. Comme f n'est pas l'application linéaire nulle, il existe $x_0 \in \mathbb{R}^n$ tel que $y_0 = f(x_0) \neq 0$.
Soit $y \in \mathbb{R}$. Alors, comme y_0 est non nul,

$$\begin{aligned} y &= \frac{y}{y_0} y_0 \\ &= \underbrace{\frac{y}{y_0}}_{\in \mathbb{R}} f(x_0) \\ &= f\left(\underbrace{\frac{y}{y_0} x_0}_{\in \mathbb{R}^n}\right), \text{ car } f \text{ est linéaire.} \end{aligned}$$

Ainsi, y possède un antécédent par f et la fonction f est surjective. \square

Solution de l'exercice 4. TODO \square

II - Applications linéaires & Matrices

Solution de l'exercice 6.

1. Comme

$$\begin{aligned} f(1, 0) &= (1, 3) = 1 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1), \\ f(0, 1) &= (1, -5) = 1 \cdot (1, 0) - 5 \cdot (0, 1), \end{aligned}$$

alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}.$$

2. Comme

$$\begin{aligned} f(0, 1) &= (1, -5) = -5 \cdot (0, 1) + 1 \cdot (1, 0), \\ f(1, 0) &= (1, 3) = 3 \cdot (0, 1) + 1 \cdot (1, 0), \end{aligned}$$

alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. D'une part,

$$\begin{aligned} f(1, 2) &= (4, -1) \\ f(3, 4) &= (10, -1). \end{aligned}$$

D'autre part, la matrice de passage de la base \mathcal{B} à la base canonique vaut

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $P \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -19/2 \\ 9/2 \end{pmatrix}$ et $P \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -43/2 \\ 21/2 \end{pmatrix}$. Donc

$$\begin{aligned} f(1, 2) &= -\frac{19}{2}(1, 2) + \frac{9}{2}(3, 4) \\ f(3, 4) &= -\frac{43}{2}(1, 2) + \frac{21}{2}(3, 4). \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -19 & -43 \\ 9 & 21 \end{pmatrix}.$$

4. Comme

$$\begin{aligned} f(1, 0, 0) &= (1, 3, 0) = (1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 0(1, 1, 1), \\ f(0, 1, 0) &= (1, 0, 1) = 0 \cdot (1, 0, 0) - (0, 1, 0) + (1, 1, 1), \\ f(1, 1, 1) &= (2, 2, 1) = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) + (1, 1, 1), \end{aligned}$$

alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

\square

III - Calculs de puissances

IV - Rangs de matrices

Solution de l'exercice 10.

1. Les colonnes de la matrice ne sont pas colinéaires et la matrice est non nulle. Le rang vaut 2.
2. Toutes les lignes sont proportionnelles à la première qui est non nulle. Le rang vaut 1.
3. Toutes les lignes sont proportionnelles à la première qui est non nulle. Le rang vaut 1.
4. Les deux premiers vecteurs colonnes sont non colinéaires, le troisième est la somme des deux premiers. Le rang vaut 2.
5. Les deux vecteurs colonnes ne sont pas colinéaires. Le rang vaut 2.
6. Toutes les colonnes sont égales à la première qui est non nulle. Le rang vaut 1. \square

Solution de l'exercice 11.

1. En effectuant des opérations élémentaires :

$$\begin{aligned}
 \text{Rg } A_1 &= \text{Rg} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 + L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1 \end{array} \\
 &= \text{Rg} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2 \end{array} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

2. En effectuant des opérations élémentaires :

$$\begin{aligned}
 \text{Rg } A_2 &= \text{Rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \end{array} \\
 &= \text{Rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_3 \leftarrow 2L_3 + L_2 \end{array} \\
 &= 3.
 \end{aligned}$$

3. En effectuant des opérations élémentaires :

$$\begin{aligned}
 \text{Rg } A_3 &= \text{Rg} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -5 & -4 \\ 0 & 6 & -7 & -13 \\ 0 & 5 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \end{array} \\
 &= \text{Rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & -7 & 6 & -13 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} C_2 \leftrightarrow C_3 \end{array} \\
 &= \text{Rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 9 & -37 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_3 \leftarrow 5L_3 - 7L_2 \end{array} \\
 &= \text{Rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 9 & -37 \\ 0 & 0 & 0 & 167 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_4 \leftarrow 9L_4 - 5L_3 \end{array} \\
 &= 4.
 \end{aligned}$$

 \square

V - Questions plus théoriques

Solution de l'exercice 12.

1. Soit $N, M \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors, d'après la distributivité du produit matriciel par rapport à l'addition,

$$\begin{aligned}
 \varphi(\lambda M + N) &= (\lambda M + N)A \\
 &= \lambda MA + NA \\
 &= \lambda \varphi(M) + \varphi(N).
 \end{aligned}$$

Ainsi, φ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

2. Rappelons que

$$\begin{aligned}
E_{1,1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{1,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
E_{2,1} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{2,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
E_{3,1} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{3,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{3,3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\varphi(E_{1,1}) = E_{1,1}A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{1,1} + 2E_{1,2} + 3E_{1,3}$$

$$\varphi(E_{1,2}) = E_{1,2}A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -E_{1,1} + E_{1,2} + 2E_{1,3}$$

$$\varphi(E_{1,3}) = E_{1,3}A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{1,2} + 3E_{1,3}$$

$$\varphi(E_{2,1}) = E_{2,1}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{2,1} + 2E_{2,2} + 3E_{2,3}$$

$$\varphi(E_{2,2}) = E_{2,2}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = -E_{2,1} + E_{2,2} + 2E_{2,3}$$

$$\varphi(E_{2,3}) = E_{2,3}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E_{2,2} + 3E_{2,3}$$

$$\varphi(E_{3,1}) = E_{3,1}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = E_{3,1} + 2E_{3,2} + 3E_{3,3}$$

$$\varphi(E_{3,2}) = E_{3,2}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = -E_{3,1} + E_{3,2} + 2E_{3,3}$$

$$\varphi(E_{3,3}) = E_{3,3}A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = E_{3,2} + 3E_{3,3}$$

Ainsi, en notant $\mathcal{B} = (E_{1,1}, E_{1,2}, E_{1,3}, E_{2,1}, E_{2,2}, E_{2,3}, E_{3,1}, E_{3,2}, E_{3,3})$,

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

□

Solution de l'exercice 13. Z_n est l'ensemble des matrices qui commutent avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Cet ensemble est appelé le *centre* de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La lettre Z provient de l'initiale de *Zentrum* qui signifie centre en allemand.

1. Soit $A, B \in Z_n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $\lambda A + B \in Z_n$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Alors,

$$\begin{aligned} (\lambda A + B)M &= \lambda AM + BM \\ &= \lambda MA + MB, \text{ car } A, B \in Z_n \\ &= M(\lambda A + B). \end{aligned}$$

Ainsi, $\lambda A + B$ commute avec toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\lambda A + B \in Z_n$.

2. a) On peut ici dessiner les matrices produits...

- * La matrice $E_{i,j}A$ est constituée de 0 sauf sur la i^{e} ligne qui est constituée des éléments $a_{j,1}, a_{j,2}, \dots, a_{j,n}$.
- * La matrice $AE_{i,j}$ est constituée de 0 sauf sur la j^{e} colonne qui est constituée des éléments $a_{1,i}, a_{2,i}, \dots, a_{n,i}$.

Comme $AE_{i,j} = E_{i,j}A$, en identifiant les éléments, on obtient

- * les coefficients situés à la i^{e} ligne et j^{e} colonne sont égaux, soit $a_{j,j} = a_{i,i}$,
- * les autres coefficients sont nuls, soit $a_{j,k} = 0$ si $k \neq j$ et $a_{k,i} = 0$ si $k \neq i$.

b) En utilisant la question précédente pour tous les couples (i, j) et en notant λ la valeur commune à tous les $a_{i,i}$, alors $A = \lambda I$.

3. Nous avons montré à la question précédente que, si A commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $A = \lambda I$. Réciproquement, si $A = \lambda I$, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $A(\lambda I) = \lambda IA = \lambda A$.

Finalement, $Z_n = \{\lambda I, \lambda \in \mathbb{R}\}$. □

Solution de l'exercice 14. Raisonnons par Analyse / Synthèse.

Analyse. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Supposons qu'il existe S symétrique et A antisymétrique telles que $M = S + A$. Alors,

$$\begin{aligned} M &= S + A \\ M^T &= S^T + A^T \\ &= S - A \end{aligned}$$

Ainsi, en additionnant puis soustrayant ces égalités, on obtient

$$S = \frac{1}{2}(M + M^T) \text{ et } A = \frac{1}{2}(M - M^T).$$

Synthèse. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Posons

$$S = \frac{1}{2}(M + M^T) \text{ et } A = \frac{1}{2}(M - M^T).$$

D'une part,

$$\begin{aligned} S^T &= \left(\frac{1}{2}(M + M^T) \right)^T = \frac{1}{2}(M^T + M) = S \\ A^T &= \left(\frac{1}{2}(M - M^T) \right)^T = \frac{1}{2}(M^T - M) = -A \end{aligned}$$

Ainsi, S est symétrique et A est antisymétrique.

D'autre part,

$$S + A = \frac{1}{2}(M + M^T) + \frac{1}{2}(M - M^T) = M.$$

□

Solution de l'exercice 15.

1. Comme $f^2 \neq 0$, l'application f^2 n'est pas l'application nulle et il existe $x_0 \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(x_0) \neq 0$.

2. Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$ax_0 + bf(x_0) + cf^2(x_0) = 0.$$

En composant par f^2 ,

$$\begin{aligned} af^2(x_0) + bf^3(x_0) + cf^4(x_0) &= f^2(0) \\ af^2(x_0) &= 0, \text{ car } f^3 = f^4 = 0 \end{aligned}$$

Comme $f^2(x_0) \neq 0$, alors $a = 0$.

Ainsi, en reprenant l'équation, on obtient

$$bf(x_0) + cf^2(x_0) = 0.$$

En composant par f ,

$$\begin{aligned} bf^2(x_0) + cf^3(x_0) &= f(0) \\ bf^2(x_0) &= 0, \text{ car } f^3 = 0 \end{aligned}$$

Comme $f^2(x_0) = 0$, alors $b = 0$.

Ainsi, en reprenant l'équation, on obtient

$$cf^2(x_0) = 0.$$

Comme $f^2(x_0) = 0$, alors $c = 0$.

Finalement, $a = b = c = 0$ et la famille $(x_0, f(x_0), f^2(x_0))$ est libre.

3. Comme

$$\begin{aligned} f(x_0) &= f(x_0) \\ f(f(x_0)) &= f^2(x_0) \\ f(f^2(x_0)) &= f^3(x_0) = 0, \end{aligned}$$

alors

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Soit g telle que $g \circ f = f \circ g$. Notons

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ \gamma & h & i \end{pmatrix}.$$

Alors,

$$\begin{aligned} f \circ g &= g \circ f \\ \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) &= \text{Mat}_{\mathcal{B}}(g)\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} b & c & 0 \\ e & f & 0 \\ h & i & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{cases} b = 0 \\ c = 0 \\ a = e \\ b = f \\ d = h \\ e = i \\ f = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = c = f = 0 \\ a = e \\ d = h \\ e = i \end{cases}$$

soit

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ d & a & 0 \\ \gamma & d & a \end{pmatrix}$$

5. Notons $N = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$. On remarque que

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Si g commute avec f , d'après la question précédente, il existe $a, d, \gamma \in \mathbb{R}$

tels que

$$\begin{aligned}\text{Mat}_{\mathcal{B}}(g) &= a \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= aI_3 + dN + \gamma N^2 \\ g &= a\text{Id} + df + \gamma f^2.\end{aligned}$$

Réciproquement, si $g = af^2 + bf + c\text{Id}$, alors $g \circ f = af^3 + bf^2 + cf = f \circ g$. \square

Solution de l'exercice 16.

1. D'après la définition du produit matriciel,

$$\begin{aligned}AX &= 0 \\ \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1,j}x_j \\ \sum_{j=2}^n a_{2,j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=2}^n a_{n,j}x_j \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

En utilisant la i^{e} ligne de ce produit matriciel, puis en sortant le i^{e} terme de la somme,

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n a_{i,j}x_j &= 0 \\ \sum_{k \neq i} a_{i,k}x_k + a_{i,i}x_i &= 0 \\ a_{i,i}x_i &= - \sum_{k \neq i} a_{i,k}x_k.\end{aligned}$$

2. En utilisant l'inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned}|a_{i_0,i_0}x_{i_0}| &\leq \sum_{k \neq i_0} |a_{i_0,k}x_k| \\ |a_{i_0,i_0}| \cdot |x_{i_0}| &\leq \sum_{k \neq i_0} |a_{i_0,k}| \cdot |x_{i_0}| \\ |a_{i_0,i_0}| &\leq \sum_{k \neq i_0} |a_{i_0,k}|,\end{aligned}$$

car $x_{i_0} \neq 0$.

3. D'après l'hypothèse,

$$|a_{i_0,i_0}| > \sum_{k \neq i_0} |a_{i_0,k}|.$$

On obtient ainsi une contradiction et $X = 0$.

Finalement, $\text{Ker } A = \{0\}$. Ainsi, l'endomorphisme canoniquement associé à A est injectif donc bijectif. La matrice A est donc inversible. \square