

# X - Variables aléatoires à densité

## I - Variable aléatoire à densité

### I.1 - Densité

#### Définition 1 - Densité de probabilité

Une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est une *densité de probabilité* si :

- $f$  est positive sur  $\mathbb{R}$ ,
- $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  sauf éventuellement en un nombre fini de points en lesquels elle admet des limites finies à droite et à gauche,
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = 1$ .

#### Exemple 1 - Densités

- Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } x \in [1, 3] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On remarque que :

- ★  $f$  est à valeurs positives.
- ★  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  sauf en 1 et en 3 où elle admet des limites finies à gauche et à droite.

$$\star \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \int_1^3 \frac{dt}{2} = \frac{1}{2}(3 - 1) = 1.$$

Ainsi,  $f$  est une densité de probabilité.

- Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 2e^{-2x} & \text{sinon} \end{cases}$$

On remarque que :

- ★  $g$  est à valeurs positives.
- ★  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}$  sauf en 0 où elle admet des limites finies à gauche et à droite.
- ★ Si  $x > 0$ , alors

$$\int_{-\infty}^x g(t) dt = \int_0^x 2e^{-2t} dt = [-e^{-2t}]_0^x = -e^{-2x} + 1.$$

$$\text{soit } \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) dt = 1.$$

Ainsi,  $g$  est une densité de probabilité.

#### Définition 2 - Variable aléatoire à densité

Une variable aléatoire réelle  $X$  admet une *densité de probabilité*  $f$  si, pour tout réel  $x$ , sa fonction de répartition  $F_X$  est égale à :

$$F_X(x) = \mathbf{P}([X \leq x]) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

a

#### Exemple 2 - Calcul de fonction de répartition

Soit  $X$  une variable aléatoire de densité  $g$  définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 2e^{-2x} & \text{sinon} \end{cases}$$

- La fonction de répartition de  $X$  est égale à

$$F(x) = \int_{-\infty}^x g(t) dt.$$

Ainsi,

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ 1 - e^{-2x} & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

- On retrouve la densité de  $X$  en dérivant sa fonction de répartition  $F$ .

## I.2 - Calculs

### Proposition 1 - Calculs de probabilités

Soit  $X$  une variable aléatoire admettant une densité de probabilité  $f$ , une fonction de répartition  $F$  et  $a < b$  deux réels. Alors,

$$\mathbf{P}(X < a) = \mathbf{P}(X \leq a),$$

$$\mathbf{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a),$$

$$\mathbf{P}(X \geq a) = 1 - \mathbf{P}(X \leq a) = 1 - F(a).$$

### Exemple 3 - Du continu au discret

Soit  $X$  une variable aléatoire de densité  $f$  définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \notin [0, 1] \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ainsi, la fonction de répartition  $F$  de  $X$  vaut :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \in [0, 1] \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}.$$

On note  $Y$  la variable aléatoire qui vaut :

- 0 si  $X < \frac{1}{2}$ ,
- 1 si  $X \in [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}]$ ,

- 2 si  $X > \frac{2}{3}$ .

Ainsi,  $Y(\Omega) = \{0, 1, 2\}$  et

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([Y = 0]) &= \mathbf{P}\left(\left[X < \frac{1}{2}\right]\right) \\ &= F(1/2) = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([Y = 1]) &= \mathbf{P}\left(\left[\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{2}{3}\right]\right) \\ &= F(2/3) - F(1/2) \\ &= \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([Y = 2]) &= \mathbf{P}\left(\left[X > \frac{2}{3}\right]\right) \\ &= 1 - F(2/3) \\ &= 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, la loi de  $Y$  est

$x$	0	1	2
$\mathbf{P}([Y = x])$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$

### Définition 3 - Espérance

La variable aléatoire  $X$  à densité  $f$  admet une *espérance* si l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} tf(t) dt$  converge. Alors,

$$\mathbf{E}[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} tf(t) dt.$$

## Exemple 4 - Un calcul d'espérance

Soit  $X$  une variable aléatoire à densité  $f$  définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 2e^{-2x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Soit  $y < 0 < x$ . En posant  $u(t) = t$ ,  $v'(t) = 2e^{-2t}$ , alors  $u'(t) = 1$ ,  $v(t) = -e^{-2t}$ . Les fonctions  $u$  et  $v$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, x]$  et d'après la formule d'intégration par parties,

$$\begin{aligned} \int_y^x t f(t) dt &= \int_0^x t 2e^{-2t} dt \\ &= [-te^{-2t}]_0^x - \int_0^x 1(-e^{-2t}) dt \\ &= -xe^{-2x} + \left[-\frac{e^{-2t}}{2}\right]_0^x \\ &= -xe^{-2x} - \frac{e^{-2x}}{2} + \frac{1}{2} \\ &\rightarrow \frac{1}{2} \text{ lorsque } x \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Ainsi,  $\int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-2t} dt$  converge et

$$\mathbf{E}[X] = \frac{1}{2}.$$

## Définition 4 - Variance

La variable aléatoire  $X$  à densité  $f$  admet une *variance* si l'intégrale  $\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f(t) dt$  converge. Alors,  $\mathbf{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 f(t) dt$  et

$$\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}[X^2] - \mathbf{E}[X]^2$$

L'écart-type de  $X$  est défini par  $\sigma(X) = \sqrt{\mathbf{V}(X)}$ .

## Exemple 5 - Un calcul de variance

Soit  $X$  une variable aléatoire à densité  $f$  définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 2e^{-2x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Nous avons vu précédemment que  $\mathbf{E}[X] = \frac{1}{2}$ .

Soit  $y < 0 < x$ . En posant  $u(t) = t^2$ ,  $v'(t) = 2e^{-2t}$ , alors  $u'(t) = 2t$ ,  $v(t) = -e^{-2t}$ . Les fonctions  $u$  et  $v$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, x]$  et d'après la formule d'intégration par parties,

$$\begin{aligned} \int_y^x t^2 f(t) dt &= \int_0^x t^2 2e^{-2t} dt \\ &= [-t^2 e^{-2t}]_0^x - \int_0^x 2t(-e^{-2t}) dt \\ &= -x^2 e^{-2x} + \int_0^x t(2e^{-2t}) dt \\ &\rightarrow \int_0^{+\infty} t 2e^{-2t} dt = \frac{1}{2} \text{ lorsque } x \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Ainsi,  $\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-2t} dt$  converge et  $\mathbf{E}[X^2] = \frac{1}{2}$ . Alors,

$$\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}[X^2] - \mathbf{E}[X]^2 = \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

## Proposition 2 - Propriétés de l'espérance et de la variance

Soit  $a, b$  deux réels et  $X, Y$  des variables aléatoires à densité admettant une espérance. Alors,

$$\mathbf{E}[aX + b] = a\mathbf{E}[X] + b$$

$$\mathbf{E}[aX + bY] = a\mathbf{E}[X] + b\mathbf{E}[Y].$$

Si  $X$  admet une variance, alors  $\mathbf{V}(aX + b) = a^2 \mathbf{V}(X)$ .


## II - Lois usuelles

### II.1 - Loi uniforme sur $[a, b]$

#### Définition 5 - Loi uniforme

Soit  $a < b$ . Une variable aléatoire  $X$  suit la *loi uniforme* sur  $[a, b]$ , noté  $X \hookrightarrow \mathcal{U}([a, b])$ , si elle admet la densité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



#### Exemple 6 - Modélisation


La loi uniforme permet de modéliser le choix d'un réel au hasard entre  $a$  et  $b$  sans privilégier aucun des résultats.

#### Proposition 3 - Propriétés de la loi uniforme

Soit  $a < b$  et  $X$  qui suit une loi uniforme sur  $[a, b]$ .

- La fonction de répartition  $F$  de  $X$  est définie par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$



- L'espérance de  $X$  est  $\mathbf{E}[X] = \frac{a+b}{2}$ .
- La variance de  $X$  est  $\mathbf{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ .

#### Exemple 7 - Modifications d'une loi uniforme

Soit  $X \hookrightarrow \mathcal{U}([1, 2])$ .

- On pose  $Y = \frac{X-1}{2}$ . La fonction de répartition de  $Y$  est égale à :

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \mathbf{P}([Y \leq y]) = \mathbf{P}\left(\left[\frac{X-1}{2} \leq y\right]\right) \\ &= \mathbf{P}([X \leq 2y+1]). \end{aligned}$$

Ainsi,

- ★ Si  $2y+1 \leq 1$ , i.e.  $y \leq 0$ , alors  $F_Y(y) = 0$ .

★ Si  $1 \leq 2y + 1 \leq 2$ , i.e.  $y \in [0, 1/2]$ , alors

$$F_Y(y) = \frac{2y + 1 - 1}{2 - 1} = 2y.$$

★ Si  $2y + 1 \geq 2$ , i.e.  $y \geq 1/2$ , alors  $F_Y(y) = 1$ .

La fonction  $F_Y$  est dérivable sauf en 1 et en 2. Une densité de  $Y$  est donc donnée par :

$$f_Y(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 2 & \text{si } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ 0 & \text{si } t > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Finalement,  $Y \hookrightarrow \mathcal{U}([0, 1/2])$ .

- On pose  $Z = X^2$ . La fonction de répartition de  $z$  vaut

$$F_Z(z) = \mathbf{P}([Z \leq z]) = \mathbf{P}([X^2 \leq z]).$$

★ Si  $z \leq 0$ , alors  $F_Z(z) = 0$ .

★ Si  $z \geq 0$ , alors

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathbf{P}(|X| \leq \sqrt{z}) = \mathbf{P}([-\sqrt{z} \leq X \leq \sqrt{z}]) \\ &= F_X(\sqrt{z}) - F_X(-\sqrt{z}) = F_X(\sqrt{z}). \end{aligned}$$

Ainsi,

— Si  $\sqrt{z} \leq 1$ , i.e.  $z \leq 1$ , alors  $F_Z(z) = 0$ .

— Si  $\sqrt{z} \geq 2$ , i.e.  $z \geq 4$ , alors  $F_Z(z) = 1$ .

— Si  $\sqrt{z} \in [1, 2]$ , i.e.  $z \in [1, 4]$ , alors

$$F_Z(z) = \frac{\sqrt{z} - 1}{2 - 1} = \sqrt{z} - 1.$$

La fonction  $F_Z$  est dérivable sauf en 1 et en 4. Une densité de  $Z$  est donnée par :


$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z \leq 1 \\ \frac{1}{2\sqrt{z}} & \text{si } z \in [1, 4] \\ 0 & \text{si } z > 4 \end{cases}$$

## II.2 - Loi exponentielle

### Définition 6 - Loi exponentielle

Soit  $\lambda > 0$ . Une variable aléatoire  $X$  suit la *loi exponentielle* de paramètre  $\lambda$ , noté  $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$ , si elle admet la densité

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



### Exemple 8 - Modélisation


La loi exponentielle modélise la durée de vie d'un phénomène sans mémoire ou sans vieillissement d'usure. Il est utilisé pour modéliser la durée de vie d'un atome radioactif, le temps d'attente dans une file, la durée de vie d'un composant électronique,...

### Proposition 4 - Propriétés de la loi exponentielle

Soit  $\lambda > 0$  et  $X$  qui suit une loi exponentielle de paramètre  $\lambda$ .

- La fonction de répartition  $F$  de  $X$  est définie par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$



- L'espérance de  $X$  est  $\mathbf{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$ .
- La variance de  $X$  est  $\mathbf{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ .

### Exemple 9 - Minimum de lois exponentielles

Soit  $X \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda)$  et  $Y \hookrightarrow \mathcal{E}(\mu)$  deux variables aléatoires indépendantes. On note  $Z = \min\{X, Y\}$ . Alors, la fonction de répartition de  $Z$  est égale à :

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \mathbf{P}([Z \leq z]) = 1 - \mathbf{P}([\min\{X, Y\} > z]) \\ &= 1 - \mathbf{P}([X > z] \cap [Y > z]) \\ &= 1 - \mathbf{P}([X > z]) \times \mathbf{P}([Y > z]) \\ &= 1 - (1 - \mathbf{P}([X \leq z])) \times (1 - \mathbf{P}([Y \leq z])). \end{aligned}$$

- Si  $z \leq 0$ , alors  $F_Z(z) = 0$ .
- Si  $z > 0$ , alors

$$F_Z(z) = 1 - e^{-\lambda z} \times e^{-\mu z} = 1 - e^{-(\lambda+\mu)z}.$$

La fonction  $F_Z$  est dérivable sauf en 0. Une densité de  $Z$  est donnée par :

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{si } z < 0 \\ (\lambda + \mu) e^{-(\lambda+\mu)z} & \text{si } z \geq 0 \end{cases}$$


Finalement,  $Z \hookrightarrow \mathcal{E}(\lambda + \mu)$ .

## II.3 - Loi normale

### Définition 7 - Loi normale

Soit  $m$  un réel et  $\sigma$  un réel non nul. Une variable aléatoire  $X$  suit la *loi normale* (ou de Laplace-Gauss) de paramètres  $m$  et  $\sigma^2$ , noté  $X \hookrightarrow \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ , si elle admet la densité

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-m}{\sigma}\right)^2}.$$



### Exemple 10 - Modélisation

La loi normale sert à modéliser des expériences qui sont le résultat de multiples facteurs. Par exemple, la taille d'individus de même âge, la taille des becs d'une population d'oiseaux, les résultats d'une mesure physique, le prix de denrées cotées en bourse,...

### Proposition 5 - Propriétés de la loi normale

Soit  $m \in \mathbb{R}$ ,  $\sigma > 0$  et  $X$  qui suit une loi normale de paramètres  $m$  et  $\sigma^2$ .

- L'espérance de  $X$  est  $\mathbf{E}[X] = m$ .
- La variance de  $X$  est  $\mathbf{V}(X) = \sigma^2$ .

**Définition 8 - Loi normale centrée réduite**

La variable aléatoire à densité  $X$  suit la *loi normale centrée réduite* si  $X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ . La fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite est généralement notée  $\Phi$ .

**Exemple 11 - Lecture de table**

Soit  $X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ . On utilise la table de la loi normale centrée réduite :

$$\mathbf{P}([X \leq 2,57]) \simeq 0,9949$$

$$\mathbf{P}([X \leq 1,45]) \simeq 0,9265$$

$$\begin{aligned}\mathbf{P}([0,25 \leq X \leq 1,45]) &= \mathbf{P}([X \leq 1,45]) - \mathbf{P}([X \leq 0,25]) \\ &\simeq 0,9265 - 0,5987 \simeq 0,3278.\end{aligned}$$

**Proposition 6 - Fonction de répartition**

Soit  $\Phi$  la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Alors,

$$\forall x \in \mathbb{R}, \Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$

**Exemple 12 - Utilisation de la table**

Soit  $X \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ . En utilisant la table de la loi normale centrée réduite,

$$\mathbf{P}([X \leq -2,34]) = 1 - \mathbf{P}([X \leq 2,34]) \simeq 1 - 0,9901 \simeq 0,0100.$$

**Proposition 7 - Lien entre lois normales**

Soit  $m \in \mathbb{R}$  et  $\sigma > 0$ . Si  $X \hookrightarrow \mathcal{N}(m, \sigma^2)$  et  $X^* = \frac{X-m}{\sigma}$ , alors  $X^* \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ .

**Exemple 13 - Utilisation de la table**

Soit  $X \hookrightarrow \mathcal{N}(3, 25)$ . Alors,  $\frac{X-3}{5} \hookrightarrow \mathcal{N}(0, 1)$ , soit

$$\begin{aligned}\mathbf{P}([X \leq 2]) &= \mathbf{P}([X - 3 \leq 2 - 3]) = \mathbf{P}\left(\left[\frac{X-3}{5} \leq -\frac{1}{5}\right]\right) \\ &= \mathbf{P}([X \leq -0,2]) = 1 - \mathbf{P}([X \leq 0,2]) \\ &\simeq 1 - 0,5793 \simeq 0,4207.\end{aligned}$$

**II.4 - Table de la loi normale centrée réduite**

$z$	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	0,5	0,5034	0,5080	0,5120	0,5159	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5909	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7356	0,7389	0,7421	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7703	0,7734	0,7764	0,7793	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8437	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8906	0,8925	0,8943	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9648	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,980	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9874	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9924	0,9927	0,9929	0,9930	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9958	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9978	0,9979	0,9980	0,9981	0,9982	0,9983
2,9	0,9984	0,9985	0,9986	0,9987	0,9988	0,9989	0,9990	0,9991	0,9992	0,9993