



Exercice 1. Dans cet exercice, on considère l'espace E des fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables et de dérivée continue, telles que $f(0) = f(1) = 0$.

Les propriétés élémentaires des fonctions cosinus (notée \cos), sinus (notée \sin) et cotangente (notée \cotan) sont les suivantes et pourront être utilisées sans justification :

- Les fonctions \cos et \sin sont 2π -périodiques :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x + 2\pi) = \cos(x) \text{ et } \sin(x + 2\pi) = \sin(x).$$

- Pour tout réel x ,

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x) \text{ et } \sin(\pi - x) = \sin(x).$$

- Les fonctions cosinus et sinus sont de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \cos'(x) = -\sin(x) \text{ et } \sin'(x) = \cos(x).$$

- La fonction cosinus est paire et strictement décroissante sur $[0, \pi]$. De plus,

$$\cos(0) = 1, \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{ et } \cos(\pi) = -1.$$

- La fonction sinus est impaire, strictement croissante sur $[0, \pi/2]$ et strictement décroissante sur $[\pi/2, \pi]$. De plus,

$$\sin(0) = \sin(\pi) = 0 \text{ et } \sin(\pi/2) = 1.$$

- Sur son intervalle de définition, $\cotan(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$.

Dans tout l'exercice, la fonction f désigne un élément de E .

Partie I : Limites et Équivalents

1. a) Donner le domaine de définition de la fonction $x \mapsto \cotan(\pi x)$ et déterminer un équivalent de $\cotan(\pi x)$ lorsque x est au voisinage de 0, $x > 0$.

b) De même, montrer que $\cotan(\pi x) \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{1}{\pi(x-1)}$.

c) Montrer que la dérivée de la fonction $x \mapsto \cotan(\pi x)$ sur $]0, 1[$ est égale à $x \mapsto -\pi(1 + \cotan(\pi x)^2)$. Tracer la courbe représentative de $x \mapsto \cotan(\pi x)$ sur $]0, 1[$.

2. Soit $f \in E$.

a) On définit la fonction g sur $]0, 1]$ par $g(x) = \frac{f(x)}{x}$. Montrer que g tend vers $f'(0)$ lorsque x tend vers 0, $x > 0$.

b) De même, calculer la limite de la fonction h , définie sur $[0, 1[$ par $h(x) = \frac{f(x)}{x-1}$, lorsque x tend vers 1, $x < 1$.

Partie II : Inégalité de Poincaré

3. Considérons l'intégrale suivante

$$I = \int_0^1 f(x) f'(x) \cotan(\pi x) dx.$$

a) En utilisant les questions précédentes, montrer que la fonction à intégrer est prolongeable par continuité en 0 et en 1. En déduire que l'intégrale I est bien définie.

b) Soit $0 < a < b < 1$. Appliquer une intégration par parties à l'intégrale

$$\int_a^b f(x) f'(x) \cotan(\pi x) \, dx.$$

c) En considérant les limites $a \rightarrow 0$, $b \rightarrow 1$, en déduire que l'on a

$$2\pi I = \pi^2 \int_0^1 f(x)^2 (1 + \cotan(\pi x)^2) \, dx.$$

4. On considère l'intégrale J définie par

$$J = \int_0^1 (f'(x) - \pi f(x) \cotan(\pi x))^2 \, dx.$$

a) Montrer que la fonction à intégrer est prolongeable par continuité en 0 et en 1. En déduire que J est bien définie.

b) En développant J , montrer que pour toute fonction f de E , on a la relation

$$\int_0^1 f(x)^2 \, dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 f'(x)^2 \, dx.$$