VIII - Intégration

I - Primitives

Définition 1 - Primitive

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. Une *primitive* de f est une fonction dérivable F sur I telle que, pour tout $x \in I$, F'(x) = f(x).

Exemple 1

Soit F la fonction définie sur]0,1] par $F(x)=x\ln(x)-x$. Comme la fonction logarithme népérien est dérivable sur]0,1], alors F est dérivable et pour tout $x \in]0,1]$,

$$F'(x) = \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln(x).$$

Ainsi, F est une primitive de ln sur [0, 1].

Théorème 1 - Primitives de fonctions continues

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives. Si F et G sont des primitives d'une fonction f continue sur I, alors il existe un réel c tel que $\forall x \in I$, F(x) = G(x) + c.

Exemple 2

Si G est une primitive de la fonction ln sur]0,1], alors il existe un réel c tel que

$$\forall x \in]0,1], G(x) = x \ln(x) - x + c.$$

Proposition 1 - Primitives des fonctions usuellesFonction f(x)Primitive F(x)Intervalleccx \mathbb{R} $x^a, a \neq -1$ $\frac{1}{a+1}x^{a+1}$ \mathbb{R}^*_+ ou \mathbb{R}^* ou \mathbb{R} $\frac{1}{x}$ $\ln(x)$ $]0, +\infty[$ $e^{ax}, a \neq 0$ $\frac{1}{a}e^{ax}$ \mathbb{R}

Exemple 3

Une primitive de la fonction définie sur \mathbb{R}_+^* par $f(x)=x^{1/4}$ est donnée par

$$F(x) = \frac{1}{\frac{1}{4} + 1} x^{1/4 + 1} = \frac{4}{5} x^{5/4}.$$

Proposition 2 - Primitive de fonctions composées 🖏

Soit u une fonction dérivable telle que u' soit continue.

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$
$\lambda u'(x) + \mu v'(x)$	$\lambda u(x) + \mu v(x)$
$u'(x)u^a(x), a \neq -1$	$\frac{1}{a+1}u^{a+1}(x)$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln u(x) $
$u'(x) e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$
u'(x)v'(u(x))	v(u(x))

Exemple 4

La fonction définie sur \mathbb{R}_+^* par $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ est de la forme u'(x)u(x) où $u(x) = \ln(x)$. Ainsi, une primitive de f est donnée par $F(x) = \frac{1}{2}(\ln(x))^2$.

II - Intégrale sur un segment

Définition 2 - Intégrale d'une fonction continue 🖏

Soit f une fonction continue sur [a,b] et F une primitive de f. L'intégrale de f sur [a,b] est le réel défini par

$$\int_{a}^{b} f(x) dx = [F(x)]_{a}^{b} = F(b) - F(a).$$

Exemple 5

En utilisant les primitives usuelles,

•
$$\int_0^1 (3x^2 + 4) e^{x^3 + 4x} dx = \left[e^{x^3 + 4x} \right]_0^1 = e^5 - 1.$$

Théorème 2 - Intégrale et Primitive

Soit f une fonction continue définie sur I et $a \in I$. On note $F(x) = \int_a^x f(t) \, \mathrm{d}t$. Alors, F est l'unique primitive de f qui s'annule en a. En particulier, pour tout réel $x \in I$, F'(x) = f(x).

II.1 - Propriétés de l'intégrale

Définition 3 - Fonctions continues par morceaux

Soit f une fonction définie sur un intervalle $I = \bigcup_{k=0}^{n}]a_k, b_k[$. On suppose que f est continue par morceaux sur I, i.e. prolongeable par continuité sur chacun des segments $]a_k, b_k[$. Alors, $\int_{-\infty}^{b} \int_{-\infty}^{b_k} \int_{$

$$\int_{a}^{b} f(x) \, dx = \sum_{k=0}^{n} \int_{a_{k}}^{b_{k}} f(x) \, dx.$$

Proposition 3 - Relation de Chasles

Soit f une fonction continue par morceaux sur un intervalle I et a, b et c des réels de I. Alors,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Exemple 6 - Fonction définie par morceaux

Soit f la fonction définie par f(x) = 0 si $x \le 1$ et f(x) = x - 1 sinon. Alors,

$$\int_{-1}^{2} f(x) dx = \int_{-1}^{1} f(x) dx + \int_{1}^{2} f(x) dx$$
$$= \int_{-1}^{1} 0 dx + \int_{1}^{2} (x - 1) dx$$
$$= 0 + \left[\frac{(x - 1)^{2}}{2} \right]_{1}^{2} = 0 + \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}.$$

Proposition 4 - Linéarité de l'intégrale

Soit f et g des fonctions continues par morceaux sur [a,b] et λ un réel. Alors,

$$\int_a^b f(x) + \lambda g(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \lambda \int_a^b g(x) dx.$$

Exemple 7

En utilisant les primitives usuelles,

$$\int_{1}^{2} \frac{12}{x} + 5x^{3} dx = 12 \int_{1}^{2} \frac{1}{x} dx + 5 \int_{1}^{2} x^{3} dx$$

$$= 12 \left[\ln(x)\right]_{1}^{2} + 5 \left[\frac{x^{4}}{4}\right]_{1}^{2}$$

$$= 12 \left(\ln(2) - \ln(1)\right) + 5 \left(\frac{2^{4}}{4} - \frac{1}{4}\right)$$

$$= 12 \ln(2) + \frac{5}{4} \cdot 15.$$

Proposition 5 - Croissance de l'intégrale (I)

Soit f une fonction continue par morceaux sur [a, b]. Si $a \le b$ et, pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \ge 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \ge 0$.

Exemple 8

Soit
$$F(x) = \int_0^x \frac{e^t}{(t+1)^2} dt$$
 et $0 \le x \le y$. Alors,

$$F(y) = \int_0^y \frac{e^t}{(t+1)^2} dt = \int_0^x \frac{e^t}{(t+1)^2} dt + \int_x^y \frac{e^t}{(t+1)^2} dt$$

$$= F(x) + \int_x^y \frac{e^t}{(t+1)^2} dt$$

Or,
$$\frac{\mathrm{e}^t}{(t+1)^2} \geqslant 0$$
 pour tout $t \in [x,y]$ et $x \leqslant y$, donc $\int_x^y \frac{\mathrm{e}^t}{(t+1)^2} \, \mathrm{d}t \geqslant 0$. Ainsi, $F(x) \leqslant F(y)$ et F est croissante.

Proposition 6 - Croissance de l'intégrale (II)

Soit f et g deux fonctions continues par morceaux sur [a, b]. Si, pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Exemple 9

Pour tout $x \in [0, 1], x + 1 \ge 1$. Ainsi,

$$\int_0^1 \frac{x^n n}{1+x} \, \mathrm{d}x \le \int_0^1 x^n \, \mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}.$$

Proposition 7 - Inégalité triangulaire

Soit f une fonction continue par morceaux sur [a, b]. Alors,

$$\left| \int_{a}^{b} f(t) \, \mathrm{d}t \right| \leqslant \int_{a}^{b} |f(t)| \, \mathrm{d}t.$$

Exemple 10

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \ge 0$. Alors,

$$\left| \int_0^x \frac{(-t)^n}{n!} \, \mathrm{e}^t \, \, \mathrm{d}t \right| \leqslant \int_0^x |(-t)^n| \, \frac{\mathrm{e}^t}{n!} \, \, \mathrm{d}t \leqslant \frac{\mathrm{e}^x}{n!} \int_0^x t^n \, \, \mathrm{d}t \leqslant \frac{x^{n+1} \, \mathrm{e}^x}{(n+1)!}.$$

Proposition 8 - Positivité de l'intégrale des fonctions continues

Soit f une fonction continue sur [a, b]. Si f est à valeurs positives, alors $f \equiv 0$ si et seulement si $\int_a^b f(t) dt = 0$.

Exemple 11 - Contre-exemple



La propriété précédente est fausse si f est seulement continue par morceaux. Par exemple, si f(x) = 0 sur]0,1] et f(1) = 1. Alors, f est non nulle et $\int_0^1 f(x) dx = 0$.

II.2 - Calculs d'intégrales

Théorème 3 - Intégration par parties

Soit u et v deux fonctions dérivables sur [a, b] telles que u' et v' soient continues sur [a, b]. Alors,

$$\int_{a}^{b} u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_{a}^{b} - \int_{a}^{b} u'(x)v(x) dx.$$

Exemple 12 - 🐯

• Calculons $\int_0^1 x e^{2x} dx$. Posons u(x) = x et $v'(x) = e^{2x}$. Alors, u'(x) = 1 et $v(x) = \frac{e^{2x}}{2}$. Comme u, v sont dérivables et u', v' sont continues sur [0,1], d'après la formule d'intégration par parties,

$$\int_0^1 x e^{2x} dx = \left[x \frac{e^{2x}}{2} \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{e^{2x}}{2} dx = \frac{2e^4}{2} - \frac{e^2}{2} - \left[\frac{e^{2x}}{4} \right]_1^2$$
$$= e^4 - \frac{e^2}{2} - \frac{e^4}{4} + \frac{e^2}{4} = \frac{3e^4}{4} - \frac{e^2}{4}.$$

• Calculons $\int_{1}^{2} \ln(x) dx$. Posons $u(x) = \ln(x)$ et v'(x) = 1. Alors, $u'(x) = \frac{1}{x}$ et v(x) = x. Comme u, v sont dérivables et u', v' sont continues sur [1, 2], d'après la formule d'intégration par parties,

$$\int_{1}^{2} \ln(x) dx = [\ln(x)x]_{1}^{2} - \int_{1}^{2} \frac{1}{x} \cdot x dx$$

$$= 2\ln(2) - 1\ln(1) - \int_{1}^{2} 1 dx$$

$$= 2\ln(2) - [x]_{1}^{2} = 2\ln(2) - 2 + 1 = 2\ln(2) - 1.$$

Théorème 4 - Changement de variable

Soit $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ et φ une fonction de [a, b] dans I de classe \mathcal{C}^1 . Alors,

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u) du = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) dt.$$

Exemple 13 - 🗫

Calculons $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x + 1}$ à l'aide du changement de variable $t = \ln(u)$. La fonction $\varphi : [1, \mathrm{e}] \to [0, 1], \ u \mapsto \ln(u)$ est de classe \mathscr{C}^1 . Ainsi,

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^x + 1} = \int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{u + 1} \frac{1}{u} \, \mathrm{d}u$$

$$= \int_1^{\mathrm{e}} \left[\frac{1}{u} - \frac{1}{1 + u} \right] \, \mathrm{d}u$$

$$= \int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}u}{u} - \int_1^{\mathrm{e}} \frac{\mathrm{d}u}{1 + u} = [\ln(u)]_1^{\mathrm{e}} - [\ln(1 + u)]_1^{\mathrm{e}}$$

$$= 1 - \ln(1 + \mathrm{e}) + \ln(2).$$

III - Intégrales généralisées

Dans tout ce paragraphe, I désigne un intervalle de $\mathbb R$ d'extrémités a et b, où $-\infty \leq a < b \leq +\infty$.

III.1 - Définition

Définition 4 - Convergence

Soit f une fonction continue par morceaux sur I.

- Si I = [a, b[et f est continue sur [a, b[. L'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) dt$ converge si $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ possède une limite finie lorsque x tend vers b.
- Si I =]a, b] et f est continue sur]a, b]. L'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) dt$ converge si $x \mapsto \int_x^b f(t) dt$ possède une limite finie lorsque x tend vers a.
- Si I =]a, b[et f est continue sur]a, b[. L'intégrale généralisée $\int_a^b f(t) dt$ converge s'il existe $c \in]a, b[$ tel que $\int_a^c f(t) dt$ et $\int_c^b f(t) dt$ soient convergentes.

Dans tous les cas, si l'intégrale ne converge pas, elle diverge.

Exemple 14

La fonction ln est continue sur]0,1]. De plus, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\int_{\varepsilon}^{1} \ln(t) dt = [t \ln(t) - t]_{\varepsilon}^{1} = -1 - \varepsilon \ln(\varepsilon) + \varepsilon.$$

Ainsi, $\lim_{\varepsilon \to 0} \int_{0}^{1} \ln(t) dt = -1$ et $\int_{0}^{1} \ln(t) dt$ converge.

Théorème 5 - Intégrales de référence

(i). Intégrales de Riemann sur $[1, +\infty[$.

$$\int_{1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{\alpha}} \text{ converge si et seulement si } \alpha > 1. \text{ Alors,}$$

$$\int_{1}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{\alpha}} = \frac{1}{\alpha - 1}.$$

(ii). Intégrales de Riemann sur [0,1].

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^{\alpha}} \quad \text{converge si et seulement si } \alpha < 1. \text{ Alors,}$$

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^{\alpha}} = \frac{1}{1-\alpha}.$$

(iii). Fonction exponentielle.

$$\int_{0}^{+\infty} e^{-\alpha t} dt \text{ converge si et seulement si } \alpha > 0. \text{ Alors,}$$

$$\int_{0}^{+\infty} e^{-\alpha t} dt = \frac{1}{\alpha}.$$

(iv). Fonction logarithme.

$$\int_0^1 \ln(t) dt \text{ converge. De plus, } \int_0^1 \ln(t) dt = -1.$$

III.2 - Propriétés

Proposition 9 - Linéarité

Soit
$$\lambda \in \mathbb{R}$$
. Si $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ convergent. Alors, $\int_a^b (f(t) + \lambda g(t)) dt$ converge et

$$\int_{a}^{b} (f(t) + \lambda g(t)) dt = \int_{a}^{b} f(t) dt + \lambda \int_{a}^{b} g(t) dt.$$

Proposition 10 - Relation de Chasles

On suppose que $\int_a^b f(t) dt$ converge et $c \in]a, b[$. Alors, $\int_a^c f(t) dt$ et $\int_c^b f(t) dt$ convergent et

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

Proposition 11 - Croissance de l'intégrale

On suppose que $\int_a^b f(t) dt$ et $\int_a^b g(t) dt$ convergent.

- (i). Si, pour tout $x \in I$, $f(x) \ge 0$, alors $\int_a^b f(t) dt \ge 0$.
- (ii). Si, pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant g(x)$, alors $\int_a^b f(t) dt \leqslant \int_a^b g(t) dt.$

Théorème 6 - Inégalité triangulaire

Si $\int_a^b |f(t)| dt$ est convergente, alors $\int_a^b f(t) dt$ converge et

$$\left| \int_{a}^{b} f(t) \, \mathrm{d}t \right| \leqslant \int_{a}^{b} |f(t)| \, \mathrm{d}t.$$

Théorème 7 - Positivité

Soit $f:I\to\mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\int_I |f(t)| dt$ converge. Si $\int_I |f(t)| dt=0$, alors f est nulle sur I.

III.3 - Preuves d'existences

Proposition 12 - Intégrale faussement impropre

Soit f une fonction continue sur le segment [a, b]. Alors, les intégrales de f sur [a, b], [a, b], [a, b] et [a, b] sont égales.

Exemple 15

Montrons que $\int_0^1 t \ln(t) dt$ est convergente. On note f la fonction définie sur]0,1] par $f(t)=t\ln(t)$.

- La fonction f est continue sur]0,1].
- D'après les croissances comparées, $\lim_{t\to 0} f(t) = 0$. Ainsi, f est prolongeable par continuité en 0.

Finalement, l'intégrale de f sur]0,1] est bien définie.

Proposition 13 - Fonctions à valeurs positives

Si f est valeurs positives sur [a, b[, alors $\int_a^b f(t) dt$ converge si et seulement si $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est majorée sur [a, b[.

Théorème 8 - Domination locale

Soient f, g deux fonctions continues de [a, b[dans \mathbb{R}_+ .

- S'il existe un réel c tel que $\forall x \in [c, b[, 0 \le f(x) \le g(x)]$ et $\int_{c}^{b} g(t) dt$ converge, alors $\int_{c}^{b} f(t) dt$ converge.
- Si $f(x) \sim_b g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx$ converge si et seulement si $\int_a^b g(x) dx$ converge.

Exemple 16

• Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Étudions $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$.

 $\star x \mapsto x^n e^{-x}$ est continue sur $[0, +\infty[$

 \star Comme $\lim_{x\to +\infty} x^{n+2}\,\mathrm{e}^{-x}=0,$ il existe un réel c tel que, pour tout $x \geqslant c$,

$$x^n e^{-x} \leqslant \frac{1}{x^2}.$$

D'après les intégrales de référence, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ converge.

Ainsi, $\int_{-\infty}^{+\infty} x^n e^{-x} dx$ converge.

Comme $x \mapsto x^n e^{-x}$ est continue sur [0, c], son intégrale sur ce segment est bien définie.

Finalement, $\int_{0}^{+\infty} x^{n} e^{-x} dx$ converge.

• Étudions $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}$. * $t \mapsto \frac{1}{1-t^2}$ est continue sur [0,1[.

 $\star \ \frac{1}{1-t^2} = \frac{1}{(1+t)(1-t)} \sim_1 \frac{1}{2(1-t)}.$ Or, $\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1-t} = -\ln(1-x) \to +\infty$ quand $x \to 1$.

Ainsi, $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2}$ n'est pas convergente.

III.4 - Méthodes de calculs

Utiliser les méthodes de calcul sur un segment (primitivation, intégration par parties, changement de variable), puis étudier la limite.

Exemple 17

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculons $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$.

- Si n = 0, alors $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = \left[-e^{-x} \right]_0^{+\infty} = 1$.
- Si $n \ge 1$. Soit $M \ge 0$. Les fonctions $u: x \mapsto x^n$ et v: $x \mapsto -e^{-x}$ sont de classe \mathscr{C}^1 sur [0, M]. D'après la formule d'intégration par parties.

$$\int_0^M x^n e^{-x} dx = [-x^n e^{-x}]_0^M + \int_0^M nx^{n-1} e^{-x} dx$$
$$= -M^n e^{-M} + n \int_0^M x^{n-1} e^{-x} dx.$$

Ainsi, lorsque $M \to +\infty$, on obtient la relation :

$$I_n = nI_{n-1}.$$

 \bullet On montre alors par récurrence que, pour tout n entier naturel, $I_n = n!$.