

## T.D. V - Variables aléatoires discrètes finies

### I - Lois usuelles

**Solution de l'exercice 1.** Les valeurs prises par  $X$  sont 1, 2, 3 ou 4 :  $X(\Omega) = \llbracket 1, 4 \rrbracket$ .

Sachant que ces nombres ont tous la même probabilité d'être tirés, alors  $X$  suit une loi uniforme sur  $\llbracket 1, 4 \rrbracket$ .

Comme  $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 4 \rrbracket)$ , alors

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[X] &= \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2}, \\ \mathbf{V}(X) &= \frac{4^2-1}{2} = \frac{15}{2}. \end{aligned}$$

□

**Solution de l'exercice 2.** Les valeurs prises par  $X$  sont les entiers compris entre 1 et 20 :  $X(\Omega) = \llbracket 1, 20 \rrbracket$ . Sachant que ces nombres ont tous la même probabilité d'être tirés, alors  $X$  suit une loi uniforme sur  $\llbracket 1, 20 \rrbracket$ .

Comme  $X \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 20 \rrbracket)$ , alors

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[X] &= \frac{1+20}{2} = \frac{21}{2}, \\ \mathbf{V}(X) &= \frac{20^2-1}{2} = \frac{399}{2}. \end{aligned}$$

□

#### Solution de l'exercice 3.

**1.** Les valeurs prises par  $X$  sont 0 et 1 :  $X(\Omega) = \llbracket 0, 1 \rrbracket$ . Ainsi,  $X$  suit une loi de Bernoulli. Comme la probabilité que  $X$  vaille 1 vaut  $\frac{2}{3}$ , alors  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(\frac{2}{3})$ .

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[X] &= \frac{2}{3}, \\ \mathbf{V}(X) &= \frac{2}{3} \left(1 - \frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

**2.** Les valeurs prises par  $Y$  sont les entiers compris entre 0 et 5 :  $Y(\Omega) = \llbracket 0, 5 \rrbracket$ .

La variable aléatoire  $Y$  compte le nombre de succès lors d'une suite de 5 expériences de Bernoulli indépendantes dont la probabilité de succès vaut  $\frac{2}{3}$ . Ainsi,  $Y$  suit une loi binomiale de paramètres 5 et  $\frac{2}{3}$  :  $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(5, \frac{2}{3})$ .

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[Y] &= 5 \times \frac{2}{3} = \frac{10}{3}, \\ \mathbf{V}(Y) &= 5 \times \frac{2}{3} \times \left(1 - \frac{2}{3}\right) \\ &= 5 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{10}{9}. \end{aligned}$$

□

#### Solution de l'exercice 4.

**1.** Les valeurs prises par  $X$  sont 0 et 1 :  $X(\Omega) = \{0, 1\}$ . Ainsi, suit  $X$  suit une loi de Bernoulli. La variable aléatoire  $X$  vaut 1 si la lampe est défectueuse, donc elle vaut 1 avec probabilité  $\frac{5}{100} = \frac{1}{20}$ . Ainsi,  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(\frac{1}{20})$ .

Alors,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[X] &= \frac{1}{20}, \\ \mathbf{V}(X) &= \frac{1}{20} \left(1 - \frac{1}{20}\right) = \frac{19}{400}. \end{aligned}$$

**2.** Les valeurs prises par  $Y$  sont les entiers compris entre 0 et 30 :  $Y(\Omega) = \llbracket 0, 30 \rrbracket$ .

La variable aléatoire  $Y$  compte le nombre de succès lors d'une suite de 30 expériences de Bernoulli indépendantes dont la probabilité de succès vaut  $\frac{1}{20}$ . Ainsi,  $Y$  suit une loi binomiale de paramètres 30 et  $\frac{1}{20}$  :  $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(30, \frac{1}{20})$ .

Alors,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[Y] &= 30 \times \frac{1}{20} = \frac{3}{2}, \\ \mathbf{V}(Y) &= 30 \times \frac{1}{20} \times \left(1 - \frac{1}{20}\right) \\ &= 30 \times \frac{1}{20} \times \frac{19}{20} = \frac{57}{40}.\end{aligned}$$

□

**Solution de l'exercice 5.** L'expérience est une suite de 4 expériences de Bernoulli indépendantes dont la probabilité de succès (c'est-à-dire de tirer une boule noire) vaut  $\frac{5}{8}$ .

Comme  $X$  compte le nombre de succès lors de ces 4 tirages, alors  $X$  suit une loi binomiale de paramètres 4 et  $\frac{5}{8}$  :  $X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(4, \frac{5}{8}\right)$ .

Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X] &= 4 \times \frac{5}{8} = \frac{5}{2}, \\ \mathbf{V}(X) &= 4 \times \frac{5}{8} \times \left(1 - \frac{5}{8}\right) = \frac{5}{2} \times \frac{3}{8} = \frac{15}{16}.\end{aligned}$$

□

**Solution de l'exercice 6.** L'expérience est une suite de 5 expériences de Bernoulli indépendantes dont la probabilité de succès (c'est-à-dire de tirer une boule noire) vaut  $\frac{3}{10}$ .

Comme  $X$  compte le nombre de succès lors de ces 5 tirages, alors  $X$  suit une loi binomiale de paramètres 5 et  $\frac{3}{10}$  :  $X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(5, \frac{3}{10}\right)$ .

Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X] &= 5 \times \frac{3}{10} = \frac{3}{2}, \\ \mathbf{V}(X) &= 5 \times \frac{3}{10} \times \left(1 - \frac{3}{10}\right) = \frac{3}{2} \times \frac{7}{10} = \frac{21}{20}.\end{aligned}$$

□

**Solution de l'exercice 7.** L'expérience est une suite de 2 expériences de Bernoulli indépendantes dont la probabilité de succès (c'est-à-dire de tirer une boule numérotée 1) vaut  $\frac{1}{3}$ .

Comme  $X$  compte le nombre de succès lors de ces 2 tirages, alors  $X$  suit une loi binomiale de paramètres 2 et  $\frac{1}{3}$  :  $X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(2, \frac{1}{3}\right)$ .

Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X] &= 2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}, \\ \mathbf{V}(X) &= 2 \times \frac{1}{3} \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.\end{aligned}$$

□

**Solution de l'exercice 8.** L'expérience est une suite de 5 expériences de Bernoulli indépendantes dont la probabilité de succès (c'est-à-dire d'obtenir le numéro 1) vaut  $\frac{1}{6}$ .

Comme  $X$  compte le nombre de succès lors de ces 5 tirages, alors  $X$  suit une loi binomiale de paramètres 5 et  $\frac{1}{6}$ , noté

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(5, \frac{1}{6}\right).$$


Ainsi,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X] &= 5 \times \frac{1}{6} = \frac{5}{6}, \\ \mathbf{V}(X) &= 5 \times \frac{1}{6} \times \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}.\end{aligned}$$

□

## II - Calculs de lois

**Solution de l'exercice 9.** On peut représenter l'expérience ainsi :



La variable aléatoire  $X$  est la somme des tirages. Les valeurs qu'elle peut prendre sont donc 3, 5, 6 :  $X(\Omega) = \{3, 5, 6\}$ .

De plus,

$$\mathbf{P}([X = 3]) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

$$\mathbf{P}([X = 5]) = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

$$\mathbf{P}([X = 6]) = \frac{1}{3}.$$

On peut ainsi résumer la loi de  $X$  dans le tableau suivant :

$k$	3	5	6
$\mathbf{P}([X = k])$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

En utilisant ce tableau, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[X] &= 3 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{3 + 5 + 6}{3} = \frac{14}{3}. \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \mathbf{E}[X^2] &= 3^2 \times \frac{1}{3} + 5^2 \times \frac{1}{3} + 6^2 \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{9 + 25 + 36}{3} = \frac{70}{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, d'après la formule de Koenig-Huygens,

$$\begin{aligned} \mathbf{V}(X) &= \mathbf{E}[X^2] - \mathbf{E}[X]^2 = \frac{70}{3} - \left(\frac{14}{3}\right)^2 \\ &= \frac{210}{9} - \frac{196}{9} = \frac{14}{9}. \end{aligned}$$

□

**Solution de l'exercice 10.** On peut représenter l'expérience ainsi :



1. Les valeurs prises par  $S$ , la somme des gains sont donc : 30, 15, 0, -15 :  $S(\Omega) = \{-15, 0, 15, 30\}$ .

De plus, on obtient

$$\mathbf{P}([S = 30]) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{8}{27},$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([S = 15]) &= \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \\ &= 3 \times \frac{4}{27} = \frac{4}{9}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([S = 0]) &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \\ &= 3 \times \frac{2}{27} = \frac{2}{9}, \end{aligned}$$

$$\mathbf{P}([S = -15]) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{27}.$$

On peut représenter la loi de  $S$  dans le tableau suivant :

$k$	-15	0	15	30
$\mathbf{P}([S = k])$	$\frac{1}{27}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{8}{27}$

2. En utilisant le tableau précédent,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}[S] &= -15 \times \frac{1}{27} + 0 \times \frac{2}{9} + 15 \times \frac{4}{9} + 30 \times \frac{8}{27} \\
 &= -\frac{5}{9} + 5 \times \frac{4}{3} + \frac{10 \times 8}{9} \\
 &= \frac{75}{9} + \frac{20}{3} = \frac{25}{3} + \frac{20}{3} \\
 &= \frac{45}{3}, \\
 \mathbf{E}[S^2] &= (-15)^2 \times \frac{1}{27} + 0^2 \times \frac{2}{9} + 15^2 \times \frac{4}{9} + 30^2 \times \frac{8}{27} \\
 &= \frac{25}{3} + 25 \times 4 + 10^2 \times \frac{8}{3} \\
 &= \frac{825}{3} + 100 = 275 + 100 \\
 &= 375.
 \end{aligned}$$

Ainsi, d'après la formule de Kœnig-Huygens,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}(S) &= \mathbf{E}[S^2] - \mathbf{E}[S]^2 = 375 - 15^2 \\
 &= 375 - 225 = 150.
 \end{aligned}$$

□

### Solution de l'exercice 11.

	$X$	$Y$
$\frac{1}{4}$	-3	9
$\frac{1}{3}$	0	0
$\frac{1}{6}$	-1	1
$\frac{1}{4}$	-2	4

1. On distingue en fonction des valeurs prises par  $X$  :

- \* lorsque  $X$  vaut -2, alors  $Y$  vaut 4,
- \* lorsque  $X$  vaut -1, alors  $Y$  vaut 1,
- \* lorsque  $X$  vaut 0, alors  $Y$  vaut 0,
- \* lorsque  $X$  vaut 3, alors  $Y$  vaut 9.

Ainsi,  $Y(\Omega) = \{0, 1, 4, 9\}$ .

De plus,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{P}([Y = 0]) &= \mathbf{P}([X = 0]) = \frac{1}{3}, \\
 \mathbf{P}([Y = 1]) &= \mathbf{P}([X = -1]) = \frac{1}{6}, \\
 \mathbf{P}([Y = 4]) &= \mathbf{P}([X = -2]) = \frac{1}{4}, \\
 \mathbf{P}([Y = 9]) &= \mathbf{P}([X = 3]) = \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

La loi de  $Y$  peut donc être représentée dans le tableau suivant :

$k$	0	1	4	9
$\mathbf{P}([Y = k])$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

2. En utilisant le tableau précédent,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}[X] &= -2 \times \frac{1}{4} - 1 \times \frac{1}{6} + 0 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{4} \\
 &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{3}{4} \\
 &= \frac{-6 - 2 + 9}{12} = \frac{1}{12}, \\
 \mathbf{E}[X^2] &= (-2)^2 \times \frac{1}{4} + (-1)^2 \times \frac{1}{6} + 0^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{4} \\
 &= 1 + \frac{1}{6} + \frac{9}{4} = \frac{12 + 2 + 27}{12} = \frac{41}{12}.
 \end{aligned}$$

Ainsi, en utilisant la formule de Kœnig-Huygens,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{V}(X) &= \mathbf{E}[X^2] - \mathbf{E}[X]^2 = \frac{41}{12} - \frac{1}{12^2} \\
 &= \frac{41 \times 12 - 1}{144} = \frac{491}{144}.
 \end{aligned}$$

3. D'après la définition de  $Y$  ainsi que la question précédente,

$$\mathbf{E}[Y] = \mathbf{E}[X^2] = \frac{41}{12}.$$

D'après le théorème de transfert,


$$\begin{aligned}\mathbf{E}[Y^2] &= \mathbf{E}[X^4] = (-2)^4 \times \frac{1}{4} + (-1)^4 \times \frac{1}{6} + 0^4 \times \frac{1}{3} + 3^4 \times \frac{1}{4} \\ &= 4 + \frac{1}{6} + \frac{81}{4} = \frac{48 + 2 + 243}{12} = \frac{293}{12}.\end{aligned}$$

Ainsi, d'après la formule de Kœnig-Huygens,

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(Y) &= \mathbf{E}[Y^2] - \mathbf{E}[Y]^2 = \frac{293}{12} - \left(\frac{41}{12}\right)^2 \\ &= \frac{293 \times 12 - 41^2}{144} = \frac{1835}{144}.\end{aligned}$$

□

### Solution de l'exercice 12.



1. On distingue en fonction des valeurs prises par  $X$  :

- \* lorsque  $X$  vaut 0, alors  $Y$  vaut 0,
- \* lorsque  $X$  vaut 1, alors  $Y$  vaut 1,
- \* lorsque  $X$  vaut 4, alors  $Y$  vaut 2,
- \* lorsque  $X$  vaut 9, alors  $Y$  vaut 3.

Ainsi,  $Y(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$ .

De plus,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}([Y = 0]) &= \mathbf{P}([X = 0]) = \frac{1}{4}, \\ \mathbf{P}([Y = 1]) &= \mathbf{P}([X = 1]) = \frac{1}{6}, \\ \mathbf{P}([Y = 2]) &= \mathbf{P}([X = 4]) = \frac{1}{3}, \\ \mathbf{P}([Y = 3]) &= \mathbf{P}([X = 9]) = \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

La loi de  $Y$  peut donc être représentée dans le tableau suivant :

$k$	0	1	2	3
$\mathbf{P}([Y = k])$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

2. En utilisant le tableau précédent,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X] &= 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{3} + 9 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6} + \frac{4}{3} + \frac{9}{4} \\ &= \frac{2 + 16 + 27}{12} = \frac{45}{12} = \frac{15}{4}, \\ \mathbf{E}[X^2] &= 0^2 \times \frac{1}{4} + 1^2 \times \frac{1}{6} + 4^2 \times \frac{1}{3} + 9^2 \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{16}{3} + \frac{81}{4} = \frac{2 + 16 \times 4 + 81 \times 3}{12} = \frac{309}{12} = \frac{103}{4}.\end{aligned}$$

Ainsi, en utilisant la formule de Kœnig-Huygens,

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(X) &= \mathbf{E}[X^2] - \mathbf{E}[X]^2 = \frac{103}{4} - \left(\frac{15}{4}\right)^2 \\ &= \frac{103 \times 4 - 15^2}{16} = \frac{187}{16}.\end{aligned}$$

3. D'après la définition de  $Y$  ainsi que la formule de transfert,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[Y] &= \mathbf{E}[\sqrt{X}] \\ &= \sqrt{0} \times \frac{1}{4} + \sqrt{1} \times \frac{1}{6} + \sqrt{2} \times \frac{1}{3} + \sqrt{9} \times \frac{1}{4} \\ &= \frac{1}{6} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} = \frac{2 + 8 + 9}{12} = \frac{19}{12}.\end{aligned}$$

D'après la définition,


$$\mathbf{E}[Y^2] = \mathbf{E}[(\sqrt{X})^2] = \mathbf{E}[X] = \frac{15}{4}.$$

Ainsi, d'après la formule de Kœnig-Huygens,

$$\begin{aligned} \mathbf{V}(Y) &= \mathbf{E}[Y^2] - \mathbf{E}[Y]^2 = \frac{15}{4} - \left(\frac{19}{12}\right)^2 \\ &= \frac{15 \times 36 - 19^2}{144} = \frac{179}{144}. \end{aligned}$$

□

### Solution de l'exercice 13.



1. On commence par déterminer les valeurs que peut prendre la variable aléatoire  $Y$  :

- \* si  $X(\omega) = 1$ , alors  $Y(\omega) = 2$ ,
- \* si  $X(\omega) = 2$ , alors  $Y(\omega) = 1$ ,
- \* si  $X(\omega) = 3$ , alors  $Y(\omega) = 0$ ,
- \* si  $X(\omega) = 4$ , alors  $Y(\omega) = 1$ ,
- \* si  $X(\omega) = 5$ , alors  $Y(\omega) = 2$ .

Ainsi,

$$Y(\Omega) = \{0, 1, 2\}.$$

D'après l'étude précédente,

$$\mathbf{P}(Y = 0) = \mathbf{P}(X = 3) = \frac{1}{10},$$

$$\mathbf{P}(Y = 1) = \mathbf{P}(X = 2) + \mathbf{P}(X = 4) = \frac{1}{10} + \frac{2}{5} = \frac{1}{2},$$

$$\mathbf{P}(Y = 2) = \mathbf{P}(X = 1) + \mathbf{P}(X = 5) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

On peut représenter la loi de  $Y$  dans le tableau suivant :

$k$	0	1	2
$\mathbf{P}([Y = k])$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$

En utilisant la formule de l'espérance,


$$\mathbf{E}[Y] = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{2}{5} = \frac{13}{10}.$$

2. En utilisant le théorème de transfert,

$$\mathbf{E}[Y] = |1 - 3| \frac{1}{5} + |2 - 3| \frac{1}{10} + |3 - 3| \frac{1}{10} + |4 - 3| \frac{2}{5} + |5 - 3| \frac{1}{5}.$$

□

### Solution de l'exercice 14.



1. On commence par déterminer les valeurs que peut prendre la variable aléatoire  $Y$  :

- \* si  $X(\omega) = -1$ , alors  $Y(\omega) = 2$ ,
- \* si  $X(\omega) = 0$ , alors  $Y(\omega) = 1$ ,
- \* si  $X(\omega) = 1$ , alors  $Y(\omega) = 0$ ,
- \* si  $X(\omega) = 2$ , alors  $Y(\omega) = 1$ ,
- \* si  $X(\omega) = 3$ , alors  $Y(\omega) = 2$ .

Ainsi,

$$Y(\Omega) = \{0, 1, 2\}.$$

D'après l'étude précédente,

$$\mathbf{P}(Y = 0) = \mathbf{P}(X = 1) = \frac{1}{10},$$

$$\mathbf{P}(Y = 1) = \mathbf{P}(X = 0) + \mathbf{P}(X = 2) = \frac{1}{10} + \frac{2}{5} = \frac{1}{2},$$

$$\mathbf{P}(Y = 2) = \mathbf{P}(X = -1) + \mathbf{P}(X = 3) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{2}{5}.$$

On peut représenter la loi de  $Y$  dans le tableau suivant :

$k$	0	1	2
$\mathbf{P}([Y = k])$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$

En utilisant la formule de l'espérance,

$$\mathbf{E}[Y] = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{2}{5} = \frac{13}{10}.$$

2. En utilisant le théorème de transfert,

$$\mathbf{E}[Y] = |-1 - 1| \frac{1}{5} + |0 - 1| \frac{1}{10} + |1 - 1| \frac{1}{10} + |2 - 1| \frac{2}{5} + |3 - 1| \frac{1}{5}.$$

□

### III - Espérance & Variance sans calcul de loi

**Solution de l'exercice 15.** Remarquons que  $X_i$  est le résultat du  $i^{\text{e}}$  lancer d'un dé équilibré à 12 faces, donc  $X_i \hookrightarrow \mathcal{U}(\llbracket 1, 12 \rrbracket)$ . Ainsi,

$$\mathbf{E}[X_i] = \frac{1 + 12}{2} = \frac{13}{2},$$

$$\mathbf{V}(X_i) = \frac{12^2 - 1}{12} = \frac{143}{12}.$$

1. D'après la définition de  $S$ ,

$$S = \sum_{i=1}^{30} X_i.$$

En utilisant la linéarité de l'espérance,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[S] &= \mathbf{E}\left[\sum_{i=1}^{30} X_i\right] = \sum_{i=1}^{30} \mathbf{E}[X_i] \\ &= \sum_{i=1}^{30} \frac{13}{2} = 15 \times 13 = 195. \end{aligned}$$

D'après les propriétés de la variance, comme les variables aléatoires sont indépendantes,

$$\begin{aligned} \mathbf{V}(S) &= \mathbf{V}\left(\sum_{i=1}^{30} X_i\right) = \sum_{i=1}^{30} \mathbf{V}(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^{30} \frac{143}{12} = 30 \times \frac{143}{12} = \frac{5 \times 143}{2} = \frac{715}{2}. \end{aligned}$$

2. Comme les variables aléatoires sont indépendantes,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[P] &= \mathbf{E}\left[\prod_{i=1}^{30} X_i\right] = \prod_{i=1}^{30} \mathbf{E}[X_i] \\ &= \prod_{i=1}^{30} \frac{13}{2} = \left(\frac{13}{2}\right)^{30}. \end{aligned}$$

□

**Solution de l'exercice 16.** La variable aléatoire  $X_i$  prend les valeurs 10 et  $-5$ . De plus,

$$\mathbf{P}([X_i = 10]) = \frac{2}{3},$$

$$\mathbf{P}([X_i = -5]) = \frac{1}{3}.$$

D'après les définitions,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[X_i] &= 10 \times \frac{2}{3} - 5 \times \frac{1}{3} = \frac{15}{3} = 5, \\ \mathbf{E}[(X_i)^2] &= 10^2 \times \frac{2}{3} + 5^2 \times \frac{1}{3} = 75.\end{aligned}$$

Ainsi, d'après la formule de Kœnig-Huygens,

$$\mathbf{V}(X_i) = \mathbf{E}[(X_i)^2] - \mathbf{E}[X_i]^2 = 75 - 5^2 = 50.$$

1. D'après la définition de  $S$ ,

$$S = \sum_{i=1}^{50} X_i.$$

En utilisant la linéarité de l'espérance,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[S] &= \mathbf{E}\left[\sum_{i=1}^{50} X_i\right] = \sum_{i=1}^{50} \mathbf{E}[X_i] \\ &= \sum_{i=1}^{50} 5 = 50 \times 5 = 250.\end{aligned}$$

D'après les propriétés de la variance, comme les variables aléatoires sont indépendantes,

$$\begin{aligned}\mathbf{V}(S) &= \mathbf{V}\left(\sum_{i=1}^{50} X_i\right) = \sum_{i=1}^{50} \mathbf{V}(X_i) \\ &= \sum_{i=1}^{50} 50 = 50 \times 50 = 2500.\end{aligned}$$

2. Comme les variables aléatoires sont indépendantes,

$$\begin{aligned}\mathbf{E}[P] &= \mathbf{E}\left[\prod_{i=1}^{50} X_i\right] = \prod_{i=1}^{50} \mathbf{E}[X_i] \\ &= \prod_{i=1}^{50} 5 = 5^{50}.\end{aligned}$$

□

## IV - Lois de couple

### Solution de l'exercice 17.

1. Comme la somme des probabilités vaut 1, alors

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + p + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} &= 1 \\ 1 + p &= 1 \\ p &= 0.\end{aligned}$$

2. On complète le tableau précédent :

$x \backslash y$	1	2	3	4	$\mathbf{P}([X = x])$
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{3}{4}$
1	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$
$\mathbf{P}([Y = y])$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	

Comme  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(1/4)$ , alors

$$\mathbf{E}[X] = \frac{1}{4}.$$

De plus, d'après la loi de  $Y$  obtenue ci-dessus,

$$\mathbf{E}[Y] = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{8} = 2.$$

3. En utilisant le tableau précédent,

$$\begin{aligned}\mathbf{P}_{[X=1]}([Y = 1]) &= \frac{\mathbf{P}([X = 1] \cap [Y = 1])}{\mathbf{P}([X = 1])} = \frac{0}{\frac{1}{4}} = 0, \\ \mathbf{P}_{[X=1]}([Y = 2]) &= \frac{\mathbf{P}([X = 1] \cap [Y = 2])}{\mathbf{P}([X = 1])} = \frac{0}{\frac{1}{4}} = 0, \\ \mathbf{P}_{[X=1]}([Y = 3]) &= \frac{\mathbf{P}([X = 1] \cap [Y = 3])}{\mathbf{P}([X = 1])} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}, \\ \mathbf{P}_{[X=1]}([Y = 4]) &= \frac{\mathbf{P}([X = 1] \cap [Y = 4])}{\mathbf{P}([X = 1])} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$



On peut donc résumer la loi de  $Y$  sachant  $[X = 1]$  dans le tableau suivant :

$k$	3	4
$\mathbf{P}_{[X=1]}([Y = k])$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

4. On remarque que

$$\mathbf{P}([X = 1] \cap [Y = 1]) = 0$$

$$\mathbf{P}(X = 1) \times \mathbf{P}(Y = 1) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \neq 0.$$

Ainsi,

$$\mathbf{P}([X = 1] \cap [Y = 1]) \neq \mathbf{P}(X = 1) \times \mathbf{P}(Y = 1)$$

et les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.

5. D'après les propriétés des probabilités,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([X = 0] \cup [Y = 1]) &= \mathbf{P}(X = 0) + \mathbf{P}(Y = 1) - \mathbf{P}([X = 0] \cap [Y = 1]) \\ &= \frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

6. En utilisant la définition,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[XY] &= 0 \times 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times 2 \times \frac{1}{8} + 0 \times 3 \times \frac{1}{8} + 0 \times 4 \times 0 + \dots \\ &\quad \dots + 1 \times 1 \times 0 + 1 \times 2 \times 0 + 1 \times 3 \times \frac{1}{8} + 1 \times 4 \times \frac{1}{8} \\ &= \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

Ainsi, en utilisant la question 1.,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \mathbf{E}[XY] - \mathbf{E}[X] \mathbf{E}[Y] \\ &= \frac{7}{8} - \frac{1}{4} \times 2 = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

7. Comme  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(1/4)$ , alors

$$\mathbf{V}(X) = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{16}.$$

D'après le théorème de transfert,

$$\mathbf{E}[Y^2] = 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{8} + 3^2 \times \frac{1}{4} + 4^2 \times \frac{1}{8} = \frac{21}{4}.$$

D'après la formule de Kœnig-Huygens,

$$\mathbf{V}(Y) = \mathbf{E}[Y^2] - \mathbf{E}[Y]^2 = \frac{21}{4} - 2^2 = \frac{5}{4}.$$

Finalement,

$$\begin{aligned} \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbf{V}(X) \mathbf{V}(Y)}} \\ &= \frac{\frac{3}{8}}{\sqrt{\frac{3}{16} \times \frac{5}{4}}} \\ &= \frac{\frac{3}{8}}{\frac{\sqrt{3 \times 5}}{\sqrt{64}}} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{\sqrt{3 \times 5}}{8}} \\ &= \frac{3}{8} \times \frac{8}{\sqrt{3 \times 5}} = \frac{\sqrt{3} \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{5}} \\ &= \sqrt{\frac{3}{5}}. \end{aligned}$$

8. En utilisant la linéarité de la covariance par rapport à son premier argument,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X + Y, X) &= \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(Y, X) = \mathbf{V}(X) + \text{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{3}{16} + \frac{3}{8} = \frac{9}{16}. \end{aligned}$$

En utilisant la symétrie de la covariance,

$$\text{Cov}(X, X + Y) = \text{Cov}(X + Y, X) = \frac{9}{16}.$$

En utilisant la linéarité de la covariance par rapport à son premier argument,

$$\text{Cov}(2X, X) = 2\text{Cov}(X, X) = 2\mathbf{V}(X) = 2 \times \frac{3}{16} = \frac{3}{8}.$$

En utilisant la variance d'une somme,

$$\mathbf{V}(X + Y) = \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{3}{16} + \frac{5}{4} + 2 \times \frac{3}{8} = \frac{35}{16}.$$

□

**Solution de l'exercice 18.** On note  $d_1$  (resp.  $D_2$ ) le résultat du premier (resp. second) dé.

1. En fonction des valeurs obtenus pour chacun des lancers, les valeurs obtenues par le couple  $(X, Y)$  sont

$$\{(i, j), 1 \leq i \leq j \leq 6\}.$$

2. Si  $X = 1$ , la plus grande valeur renvoyée est 1, donc les deux dés ont renvoyé la valeur 1. Ainsi,

$$[X = 1] = [D_1 = 1] \cap [D_2 = 1].$$

En utilisant l'équiprobabilité des lancers,

$$\mathbf{P}(X = 1) = \frac{1}{36}.$$

3. Si  $Y = 1$ , alors un des deux dés a renvoyé 1 : soit les deux dés ont renvoyé 1, soit l'un des dé a renvoyé 1 et l'autre a renvoyé une valeur comprise entre 2 et 6. Ainsi, le nombre de lancers favorables vaut  $1 + 5 + 5 = 11$ . Alors,

$$\mathbf{P}([Y = 1]) = \frac{11}{36}.$$

4. Si le plus petit et le plus grand des résultats obtenus vaut 1, alors les deux lancers ont renvoyé 1. Ainsi,

$$[X = 1] \cap [Y = 1] = [D_1 = 1] \cap [D_2 = 1].$$

D'où,

$$\mathbf{P}([X = 1] \cap [Y = 1]) = \frac{1}{36}.$$

5. Comme  $\mathbf{P}([X = 1] \cap [Y = 1]) \neq \mathbf{P}(X = 1)\mathbf{P}(Y = 1)$ , alors  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes. □

### Solution de l'exercice 19.

1. Les résultats obtenus au cours des 4 lancers peuvent varier entre 0 (tous les résultats sont identiques) et 3 (le résultat change à chaque lancer). De plus,

$$\mathbf{P}([X = 0]) = \mathbf{P}(\{FFFF, PPPP\}) = \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^4} = \frac{1}{2^3},$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([X = 1]) &= \mathbf{P}(\{FPFP, FFPP, FFFP, PFFF, PPFF, PPPF\}) \\ &= \frac{6}{2^4} = \frac{3}{2^3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}([X = 2]) &= \mathbf{P}(\{PFPP, PFFP, PPFP, FPFF, FPPF, FFPF\}) \\ &= \frac{6}{2^4} = \frac{3}{2^3}, \end{aligned}$$

$$\mathbf{P}([X = 2]) = \mathbf{P}(\{PFPP, FFPF\}) = \frac{2}{2^4} = \frac{1}{2^3}.$$

La loi de  $X$  peut être représentée dans le tableau suivant :

$k$	0	1	2	3
$\mathbf{P}([X = k])$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

En utilisant le tableau,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[X] &= 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} \\ &= \frac{3}{8}(1 + 2 + 1) = \frac{3}{2}, \\ \mathbf{E}[X^2] &= 0^2 \times \frac{1}{8} + 1^2 \times \frac{3}{8} + 2^2 \times \frac{3}{8} + 3^2 \times \frac{1}{8} \\ &= \frac{3}{8}(1 + 4 + 3) = 3. \end{aligned}$$

D'après la formule de Kœnig-Huygens,

$$\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}[X^2] - \mathbf{E}[X]^2 = 3 - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{12 - 9}{4} = \frac{3}{4}.$$

2. La variable aléatoire  $Y$  compte le nombre de succès dans une suite de 4 expériences de Bernoulli indépendantes de probabilité de succès égale à  $\frac{1}{2}$ . Ainsi,  $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(4, 1/2)$ .

D'après le cours,

$$\mathbf{E}[Y] = 4 \times \frac{1}{2} = 2,$$

$$\mathbf{V}(Y) = 4 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1.$$

**3.** En utilisant l'étude effectuée précédemment pour établir la loi de  $X$ , on peut, pour chaque série de lancers, calculer les valeurs de  $X$  et de  $Y$ . On obtient ainsi le tableau suivant :

$x \backslash y$	0	1	2	3	4
0	$\frac{1}{16}$	0	0	0	$\frac{1}{16}$
1	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0
3	0	0	$\frac{1}{8}$	0	0

En utilisant le tableau,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[XY] &= 1 \times 1 \times \frac{1}{8} + 1 \times 2 \times \frac{1}{8} + 1 \times 3 \times \frac{1}{8} + \dots \\ &\quad \dots + 2 \times 1 \times \frac{1}{8} + 2 \times 2 \times \frac{1}{8} + 2 \times 3 \times \frac{1}{8} + \dots \\ &\quad \dots + 3 \times 2 \times \frac{1}{8} \\ &= \frac{1 + 2 + 3 + 2 + 4 + 6 + 6}{8} = \frac{24}{8} = 3. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}[XY] - \mathbf{E}[X] \mathbf{E}[Y] = 3 - \frac{3}{2} \times 2 = 0.$$

**4.** D'après le tableau,

$$\mathbf{P}([X = 0] \cap [Y = 1]) = 0$$

et

$$\mathbf{P}([X = 0]) \times \mathbf{P}([Y = 1]) = \frac{2}{16} \times \frac{2}{8} \neq 0.$$

Ainsi, les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.

**5.** D'après la définition du coefficient de corrélation,

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbf{V}(X) \mathbf{V}(Y)}} = \frac{0}{\sqrt{\frac{3}{4} \times 1}} = 0.$$

**6.** D'une part,

$$\mathbf{P}([X = 0, Y = 1]) = 0.$$

D'autre part,

$$\mathbf{P}([X = 0]) \times \mathbf{P}([Y = 1]) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4}.$$

Ainsi,

$$\mathbf{P}([X = 0, Y = 1]) \neq \mathbf{P}([X = 0]) \times \mathbf{P}([Y = 1])$$

et les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.

**7.** En utilisant la linéarité de l'espérance,

$$\mathbf{E}[X + Y] = \mathbf{E}[X] + \mathbf{E}[Y] = \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}.$$

En utilisant la formule sur la variance d'une somme,

$$\begin{aligned} \mathbf{V}(X + Y) &= \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{3}{4} + 1 + 0 = \frac{7}{4}, \\ \mathbf{V}(X - Y) &= \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(-Y) + 2\text{Cov}(X, -Y) \\ &= \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

□

### Solution de l'exercice 20.

**1.** Les valeurs qui peuvent être prises par le couple  $(X, Y)$  sont :

$$(1, 1), (1, 2), (2, 1).$$

La loi du couple  $(X, Y)$  est ainsi :

\* si les deux premières boules tirées sont numérotées 1 :

$$\mathbf{P}([X = 1, Y = 1]) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

- \* si la première boule est numérotée 1 et la seconde est numérotée 2 :

$$\mathbf{P}([X = 1, Y = 2]) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

- \* si la première boule est numérotée 2 et la seconde est numérotée 1 :

$$\mathbf{P}([X = 2, Y = 1]) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} = \frac{1}{3}.$$

La loi du couple peut être représentée dans le tableau suivant :

$x \backslash y$	1	2
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	0

2. En utilisant les marginales, on obtient :

$x \backslash y$	1	2	$\mathbf{P}([X = x])$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
$\mathbf{P}([Y = y])$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	

3. En utilisant le tableau précédent,

$$\mathbf{E}[X] = 1 \times \frac{2}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3},$$

$$\mathbf{E}[Y] = 1 \times \frac{2}{3} + 2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

4. Toujours à l'aide du tableau, on obtient :

$$\mathbf{E}[XY] = 1 \times 1 \times \frac{1}{3} + 1 \times 2 \times \frac{1}{3} + 2 \times 1 \times \frac{1}{3} = \frac{5}{3}.$$

Ainsi, d'après la définition de la covariance,

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}[XY] - \mathbf{E}[X]\mathbf{E}[Y] = \frac{5}{3} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{15 - 16}{9} = -\frac{1}{9}.$$

5. D'une part,

$$\mathbf{P}([X = 2, Y = 2]) = 0.$$

D'autre part,

$$\mathbf{P}([X = 2]) \times \mathbf{P}([Y = 2]) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}.$$

Ainsi,

$$\mathbf{P}([X = 2, Y = 2]) \neq \mathbf{P}([X = 2]) \times \mathbf{P}([Y = 2])$$

et les variables aléatoires  $X$  et  $Y$  ne sont pas indépendantes.

6. D'une part,

$$\mathbf{E}[X^2] = 1^2 \frac{2}{3} + 2^2 \frac{1}{3} = \frac{6}{3} = 2.$$

Ainsi, d'après la formule de Kœnig-Huygens,

$$\mathbf{V}(X) = \mathbf{E}[X^2] - \mathbf{E}[X]^2 = 2 - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{18 - 16}{9} = \frac{2}{9}.$$

Comme  $X$  et  $Y$  ont la même loi, alors  $\mathbf{V}(Y) = \frac{2}{9}$ .

D'après la définition du coefficient de corrélation,

$$\begin{aligned} \rho(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathbf{V}(X) \mathbf{V}(Y)}} \\ &= \frac{-\frac{1}{9}}{\sqrt{\frac{2}{9} \times \frac{2}{9}}} \\ &= -\frac{1}{9} \times \frac{9}{2} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

7. En utilisant la linéarité de l'espérance,

$$\mathbf{E}[X + Y] = \mathbf{E}[X] + \mathbf{E}[Y] = \frac{8}{3}.$$

En utilisant la formule sur la variance d'une somme,

$$\mathbf{V}(X + Y) = \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} - 2 \times \frac{1}{9} = \frac{2}{9},$$

$$\mathbf{V}(X - Y) = \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(-Y) + 2\text{Cov}(X, -Y)$$

$$= \mathbf{V}(X) + \mathbf{V}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + 2 \times \frac{1}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}.$$

□