Traitement Hyperthermie Maligne 2025

RECONSTITUTION D'AGILUS®
120 MG PAR FLACON

AGILUS® doit être dissous dans de l'eau pour préparation injectable (eppi).
Solution reconstituée à utiliser dans les 24 heures et conservée à l'abri de la lumière.
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Ne pas mettre au réfrigérateur.

1 AGILUS®

6 flacons AGILUS® par boîte
Flacons de 120 mg intraveineux
(dantrolène sodique hémiheptahydraté)

2 Matériel nécessaire

- 1 Flacon AGILUS® 120 mg
- Eau pour préparation injectable (eppi) : 100 mL
- 1 Seringue 20ml
- 1 trocart simple

3 Reconstitution

1 MIN

Reconstituer avec 20 ml d'eppi
- Secouer si présence de particules
- Reconstitution d'un volume total de **22,6 ml**
- Chaque millilitre de solution contient **5,3 mg** d'AGILUS

4 Administration IV

Injecter rapidement sur une ligne de perfusion dédiée

2,5 mg/kg chez l'adulte et l'enfant

Résumé des caractéristiques du produit

Nombre de flacons à préparer[a]	Poids corporel	Exemples de recommandation posologique		
		Poids corporel	Dose à administrer	Volume à administrer[a]
1	Jusqu'à 48 kg	3 kg	7,5 mg	1,4 ml
		6 kg	15 mg	2,8 ml
		12 kg	30 mg	5,6 ml
		24 kg	60 mg	11,3 ml
		48 kg	120 mg	22,6 ml
2	De 49 kg à 96 kg	72 kg	180 mg	33,9 ml
		96 kg	240 mg	45,2 ml
3	À partir de 97 kg	120 kg	300 mg	56,5 ml
		144 kg[b]	300 mg[b]	56,5 ml

Localisation du stock Urgence Agilus®

.....

Numéro d'appel de la pharmacie pour des kits Agilus® complémentaires

.....

Ce document est téléchargeable sur le site : www.sfar.org