1 Math

Inline $a^2 + b^2 = c^2$, $\frac{a}{b}$, $\frac{1}{2}$, $\sqrt{x+1}$, $\sqrt[3]{x}$, $x_{i,j}^{(k)}$, $f'(x)$, f'', $e^{i\pi} + 1 = 0$.

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \iint_D \oint_C \prod_k \bigcup_i \bigoplus_j$$

$$\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) \begin{Bmatrix} a & b \\ c & d \end{Bmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$\hat{x}\widehat{xyz}abc\widehat{def}gh\bar{x}\overline{abc}\underline{abc}\tilde{a}\widetilde{abcd}\vec{v}\dot{x}\ddot{y}\check{c}\breve{u}\acute{a}\grave{a}\mathring{A}\ \overrightarrow{AB}\overleftarrow{CD}\overleftrightarrow{EFGH}\ \overbrace{a+b+c+d}^{4}\underbrace{x+y+z}_{3}\ \mathbb{R}\mathcal{L}\mathbf{gv}x\mathrm{dAt}\boldsymbol{\alpha x}$

$x \to y \longrightarrow z \xrightarrow{f} w \xleftarrow[g]{h} \Rightarrow \mapsto \hookrightarrow \leftrightarrows$

$$P_j^2 + V_i^2 + f^{(n)}(x) + \lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} + T_j + W^2 \tag{1}$$

$$\begin{aligned} a &= b + c && (2) \\ &\leq \prod_{k=1}^{n} k! \\ &\neq \binom{n}{k} + \binom{2n}{n} && (3) \end{aligned}$$

$$\left(\left[\left\{\langle x \rangle\right\}\right]\right)\left|y\right\|\left\|z\right\|$$

$$\left(\left(\left\{\left\lfloor \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} \right\rceil \right\|\frac{a}{b}\right\|\right)$$

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}{n-1}} \qquad \sqrt{\left|\sqrt[n]{\frac{a}{b}}\right|}$$

$$f(x)=\begin{cases}x^2 & x>0\\ -x & \text{otherwise}\end{cases} \qquad \cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{x}}}$$

$$\sum_{\substack{0\le i\le m\\ 0<j<n}} P(i,j) \quad \stackrel{!}{=} \quad \arg\min_x \quad \boxed{E=mc^2}$$

$\sum_{i=1}^{n}\int_a^b \lim_{n\to\infty}\max_x \sup_{y\in Y}$ and $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\int_a^b$. $A^{\mathsf{T}}\mathrm{e}^{x}a_{b_{c_d}}x^{y^{z^w}}\sum_{n}{}'\,{}_a^b X_c^d \operatorname{Res}_{z=0}$ $\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\varepsilon\zeta\eta\theta\vartheta\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\varpi\rho\varrho\sigma\varsigma\tau\upsilon\phi\varphi$

$\leq\geq\ll\gg\subset\supseteq\in\notin\ni\ \cap\cup\wedge\vee\pm\mp\times\div\cdot\circ\bullet\star\dagger\infty\partial\nabla\forall\exists\neg\emptyset\aleph\hbar\ell\wp\Re\Im$

$$\left[\begin{matrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ a_{m1} & \cdots & a_{mn}\end{matrix}\right] \left(\begin{array}{c|c}1 & 2\\ \hline 3 & 4\end{array}\right)$$

$$x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)=\frac{\partial L}{\partial q}$$

See (**??**).