

Lecture 09 - Hypothesis Testing 1

Sim, Min Kyu, Ph.D., mksim@seoultech.ac.kr



서울과학기술대학교 IT정책전문대학원

1 I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정

2 II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정

3 III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정

4 IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정

유의수준 (α , significance level)

- 귀무가설과 대립가설이 [$H_0 : \mu = 30$ vs $H_A : \mu \neq 30$]와 같은 가설검정을 생각해보자.
- 실제로 $\mu = 30$ 이 진실인데 $\mu \neq 30$ 로 결론내리기도 하고, $\mu \neq 30$ 이 진실인데 $\mu = 30$ 로 결론내리기도 한다. 이를 각각 1종오류와 2종오류라고 한다.

1종 오류

- H_0 가 참인데 H_0 를 기각하는 오류
- H_0 가 참인데도 불구하고, 우연히 H_0 를 지지하지 않는 실험결과가 나와서 H_0 를 기각하는 오류
- $\mu = 30$ 인데, $\mu \neq 30$ 이라고 결론내리는 오류
- 무죄인데도 우연히 일어난 정황 증거들의 결합으로 인해 유죄를 선고받는 오류

2종 오류

- H_0 가 거짓인데 H_0 를 채택하는 오류
- H_0 가 거짓인데도 불구하고, H_0 를 기각할 수 있는 증거가 부족하여 H_0 를 채택하는 오류
- $\mu \neq 30$ 인데, $\mu = 30$ 이라고 결론 내리는 오류
- 유죄인데도 증거가 부족해서 무죄를 선고받는 오류

● 유의수준의 의미

- 유의수준 α 는 1종 오류를 일으킬 확률을 α 이하로 제한함을 의미한다.
- 유의수준 $\alpha = 0.05$ 이면, 가설검정에서 귀무가설을 잘못 기각할 가능성이 5% 임을 인정하는 것이다.
- 유의수준 $\alpha = 0.05$ 라면 신뢰수준 95%에 대응된다.
- 가설검정에 있어서, 귀무가설이 옳을 확률(이를 **유의확률**이라고 한다)이 α 보다 클 경우에는 H_0 를 채택하고 α 보다 작을 경우에는 H_0 를 기각하고 H_A 를 채택한다.

	H_0 is True	H_0 is False
Accept H_0	Correct Decision	Type II Error
Reject H_0	Type I Error	Correct Decision

● 1종 오류의 확률(α)와 2종 오류의 확률(β)은 역의 관계에 있다.

- 1종 오류를 범할 확률이 낮게 설정하면, 2종 오류를 범할 확률이 높아진다.
- 1종 오류를 범할 확률을 높게 설정하면, 2종 오류를 범할 확률이 낮아진다.
- α 와 β 는 역의 관계에 있지만, 그렇다고 $\alpha + \beta = 1$ 인 것은 아니다.

유의수준 설정의 예시 - 암진단

상황

- 암의 진단에 있어서도 1종오류(정상인데 암으로 판단)과 2종오류(암인데 정상으로 판단) 두 가지의 오류가능성이 있다.
 - 1종오류는 불필요한 수술을 하게되는 불편을 야기한다.
 - 2종오류는 치료기회를 놓쳐서 환자의 생명을 위협할 수 있다.
- 진단을 해야하는 의사는 어느 수준의 α 를 설정해야 할 것인가?

접근

- 만약에 1종오류로 인한 환자의 피해를 x , 2종오류로 인한 환자의 피해를 y 라는 수치로 측정할 수 있다면...
- 진단을 하는 의사는 $\alpha x + \beta y$ 를 최소화하는 수준에서 α 를 설정해야 할 것이다.
- 이 상황에서는 2종오류의 피해수치가 매우크기 때문에 β 를 낮추어야 하고, α 가 높은것이 자연스럽다.
- (환자의 생명을 다루는 의사라면 최악의 상황을 항상 생각해야 한다.)

유의수준 설정의 예시 - 형사판결

상황

- 형사판결에서도 1종오류(무죄를 유죄로 판단)과 2종오류(유죄를 무죄로 판단) 두 가지의 오류가능성이 있다.
 - 1종오류는 억울한 사람이 옥에 갇히게 된다.
 - 2종오류는 범죄자를 처벌하지 못하게 된다.
- 판결을 내리는 판사는 어느 수준의 α 를 설정해야 할 것인가?

접근

- 일반적으로 “무죄추정의 원칙”은 α 의 수치를 매우 낮게 하는 것을 목표로 하는 형법의 원칙이다.
- 1종오류로 인한 억울한 수감자의 피해를 x , 2종오류로 인한 사회적 피해를 y 라고 한다면 오류로 인한 피해의 확률가중 합은 $\alpha x + \beta y$ 이다.
- x 가 y 에 비해서 매우 크므로 α 를 낮게 설정한다.

양측검정과 단측검정 (Side of tails)

1. 양측검정

- Two-sided test, both-sided test
- Ex) $H_0 : \mu = 30$ vs $H_A : \mu \neq 30$. μ 가 30과 같을 확률이 α 보다 작다면 H_0 를 기각하고, 그렇지 않다면 H_0 를 채택한다. 가설검정에서는 “30과 다르다는 충분한 통계적 근거가 있는지 여부”에 대해서 다룬다.

2. 단측검정

- One-sided test
- Ex) $H_0 : \mu \geq 30$ vs $H_A : \mu < 30$. μ 가 30보다 크거나 같을 확률이 α 보다 작다면 H_0 를 기각하고, 그렇지 않다면 H_0 를 채택한다. 가설검정에서는 “30보다 작다는 충분한 통계적 근거가 있는지 여부”에 대해서 다룬다.
- Ex) $H_0 : \mu \leq 30$ vs $H_A : \mu > 30$. μ 가 30보다 작거나 같을 확률이 α 보다 작다면 H_0 를 기각하고, 그렇지 않다면 H_0 를 채택한다. “30보다 크다는 충분한 통계적 근거가 있는지 여부”에 대해서 다룬다.

가설검정의 분류 - 가설검정의 목적과 가정에 따라서 분류할 수 있다.

1. 모집단의 수

- 단일 모집단
- 2개의 모집단
- 3개의 모집단 - ANOVA
- ...

2. 모수의 종류

- 모평균 (μ)
- 모비율 (p)
- 모분산 (σ)
- 모상관계수 (ρ)
- ...

3. Sideness

- 양측검증
- 단측검증

4. 다른 조건

- Ex) 모평균에 대한 검증인데 모분산(σ)가 알려져 있는지 여부
- Ex) 두 개의 모집단이 서로 독립이거나 서로 대응이거나 한 관계
- Ex) 샘플의 갯수가 충분한지에 따라 사용하는 분포가 다름
- ...

단일모집단 두개의 모집단

모평균에 대한 검정
모비율에 대한 검정
모상관계수에 대한 검정
모분산에 대한 검정

두개의 모집단에 대한 비교

- 많은 경우에 실험은 실험군과 대조군을 나누어 수행한다. 두 집단의 모수를 통계적으로 비교하여 실험군에 가해진 행위의 유의성을 입증한다.
- 예시
 - 혈압약 A를 복용한 후에 혈압이 개선되는가?
 - 왼손과 오른손의 악력에 차이가 있는가?
 - 공법 A와 B는 불량률이 서로 다른가?
 - 공법 A는 공법 B에 비해서 불량률이 낮은가?
 - Bulls' one shot을 넣기 전후로 연비가 좋아지는가?
 - Federer가 Clay 구장과 Grass 구장에서 serve ace의 비율이 같은가?

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정
○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정
●○○○○○

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정
○○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정

단일모집단의 모평균에 대한 검정 - σ known

- CLT에 기반함 (표본평균이 정규분포에 수렴)
- 분포

$$\frac{\mu - \bar{X}}{\sigma/\sqrt{n}} \sim Z, \text{ or, } \mu \sim N(\bar{X}, \sigma^2/n)$$

- 검정 통계량

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

- $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\mu \in [\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}]$$

- Case 1. 양측검정

- 가설: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_A : \mu \neq \mu_0$
- 기각역: $|Z| \geq z_{\alpha/2}$

- Case 2. 단측검정

- 가설: $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs $H_A : \mu > \mu_0$
- 기각역: $Z \geq z_{\alpha}$

- Case 3. 단측 검정

- 가설: $H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs $H_A : \mu < \mu_0$
- 기각역: $Z \leq -z_{\alpha}$

단일모집단의 모평균에 대한 검정 - σ unknown

- CLT(표본평균이 정규분포에 수렴)에 기반하며 σ 를 s 로 대체하기에 t 분포를 사용
- 분포

$$\frac{\mu - \bar{X}}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

- 검정 통계량

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\mu \in [\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot s/\sqrt{n}]$$

● Case 1. 양측검정

- 가설: $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_A : \mu \neq \mu_0$
- 기각역: $|T| \geq t_{\alpha/2, n-1}$

● Case 2. 단측검정

- 가설: $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs $H_A : \mu > \mu_0$
- 기각역: $T \geq t_{\alpha, n-1}$

● Case 3. 단측검정

- 가설: $H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs $H_A : \mu < \mu_0$
- 기각역: $T \leq -t_{\alpha, n-1}$

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정
○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○●

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정
○○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○○○○○

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정
○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정
●○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○○○○○

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정

- 이항분포의 정규분포 근사 성질을 이용
- 분포

$$p \sim N(\hat{p}, \frac{\hat{p}\hat{q}}{n})$$

- 검정 통계량

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$$

- $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$p \in [\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}]$$

- Case 1. 양측검정

- 가설: $H_0 : p = p_0$ vs $H_A : p \neq p_0$
- 기각역: $|Z| \geq z_{\alpha/2}$

- Case 2. 단측검정

- 가설: $H_0 : p \leq p_0$ vs $H_A : p > p_0$
- 기각역: $Z \geq z_{\alpha}$

- Case 3. 단측검정

- 가설: $H_0 : p \geq p_0$ vs $H_A : p < p_0$
- 기각역: $Z \leq -z_{\alpha}$

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정
○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정
○○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정
●○○○○○○○○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정

독립표본 - Setting

- X_1 와 X_2 는 독립된 두 집단에서 각각 얻어진 확률 변수이다.
- Ex) 국산차 100대의 연비와 수입차 50대의 연비를 비교하는 실험
- X_1 과 X_2 의 모평균의 차이를 조사하기 위해 $X_1 - X_2$ 의 분포를 만들고 이 수치를 0과 같은 상수와 비교한다.
- $X_1 \sim \text{some_dist}(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2 \sim \text{some_dist}(\mu_2, \sigma_2^2)$ 이며, 이를 이용해 $\overline{X_1} - \overline{X_2}$ 의 분포를 먼저 도출한다.

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정
○○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○○

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정
○○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정
○○●○○○○○○○

$\overline{X}_1 - \overline{X}_2$ 의 분포 도출

두개의 모집단의 모평균에 대한 검정 - 독립표본 (σ_1, σ_2 unknown)

- CLT(표본평균이 정규분포에 수렴), 두 독립 정규분포의 차이, σ 를 s 로 대체하기에 t 분포로 사용
- 분포

$$\frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}} \sim t_{df}$$

- 검정 통계량

$$T = \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$$

- $100(1 - \alpha)\%$ 신뢰구간

$$\mu_1 - \mu_2 \in [(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) \pm t_{\alpha/2} \cdot \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}]$$

● Case 1. 양측검정

- 가설: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs $H_A : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$
- 기각역: $|T| \geq t_{\alpha/2, df}$

● Case 2. 단측검정

- 가설: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$ vs $H_A : \mu_1 - \mu_2 > 0$
- 기각역: $T \geq t_{\alpha, df}$

● Case 3. 단측검정

- 가설: $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0$ vs $H_A : \mu_1 - \mu_2 < 0$
- 기각역: $T \leq -t_{\alpha, df}$

- 위의 자유도(df)는 $n - 1$ 을 대체할 수 있는 $n_1 - 1$ 과 $n_2 - 1$ 을 결합한 수치:

$$df = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정
○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정
○○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○●○○○○

쌍대표본 - Setting

쌍대표본(paired samples)

- 쌍대표본(paired samples)이란 두 개의 모집단이 서로 대응되는 상황을 의미한다.
- 두 모집단에 대한 확률 변수가 X_1 과 X_2 라고 한다면, 우리의 관심은 개별 확률 변수가 아니라 두 모집단의 차이가 된다.
- 예시
 - 한 사람의 왼손과 오른손의 악력의 차이가 있는가?
 - 첨가제를 넣기 전과 후에 자동차의 연비에 차이가 있는가?
 - 특정질환의 수치를 낮춘다고 주장하는 신약의 효과를 확인하기 위해 복용하게 하였다. 복용전과 후에 수치의 차이가 있는가?
- X_1 에 대한 관측치의 갯수 n_1 과 X_2 에 대한 관측치의 갯수 n_2 는 일반적으로 같다. (같지 않다면 어떻게 쌍(pair)을 이루어 조사하겠는가?)

가설 검정

- $X_1 - X_2$ 에 대한 관측치를 이용한다.
- 즉, 단일 표본의 문제로 변환하여 가설검정을 진행한다.

예 제

- 특정 질환의 수치를 낮추는 신약의 효과를 알아보기 위해 9명의 환자를 대상으로 복용전과 후의 수치를 비교하였다. 실험 전을 A그룹으로, 실험 후를 B그룹으로 할때에 아래의 수치를 얻었다.
- 99%의 신뢰수준에서 신약이 수치를 낮추어주는지 검정하라.

```
A <- c(250, 220, 204, 222, 206,
       259, 204, 205, 198)
```

```
B <- c(242, 217, 200, 211, 189,
       240, 199, 200, 195)
```

```
X <- A-B
```

```
mean(X) # sample mean ( $\bar{X}$ )
```

```
## [1] 8.333333
```

```
sd(X) # sample standard deviation (s)
```

```
## [1] 6.062178
```

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정
○○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○○

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정
○○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○○○○●○

I. 유의수준, 1종/2종 오류, 양측/단측 검정
○○○○○○○○

II. 단일모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○

III. 단일모집단의 모비율에 대한 검정
○○○

IV. 두개의 모집단의 모평균에 대한 검정
○○○○○○○○○●

"This note is made with Rmarkdown"

[1] "This note is made with Rmarkdown"