
PARASITISME

Exploitation du vivant par le vivant

PARASITES

Animaux ou fongiques, qui pendant une partie ou la totalité de leur existence, vivent aux dépens d'autres êtres appelés hôtes

Sauf les virus et bactéries



Commensaux

Parasites vivants au contact de l'Hôte sans provoquer chez celui-ci ni effet nuisible ni utile (se nourrit de matières organiques produites par l'Hôte).

Pathogènes

Parasites vivants au contact de l'Hôte provoquants chez celui ci des effets nuisibles ou maladies.

DIFFÉRENTS TYPES DE PARASITES

Ectoparasite

le parasite est présent à l'extérieur de son hôte (la peau ou cavité buccale ou branchiale).

Mésoparasite

le parasite est localisé dans une cavité de l'hôte communiquant avec l'extérieur (Tube digestif)

Endoparasite

le parasite est présent dans les tissus, le système sanguin ou à l'intérieur d'une cellule

HÔTE

l'hôte paraténique est un HI, qui peut ou pas faire partie du cycle, ça dépend de la stratégie du parasite qui décide d'allonger ou de raccourcir son cycle en fonction des conditions du milieu extérieur.

Espèce hébergeant le parasite

Définitif HD

Héberge la forme sexuée ou la forme adulte du parasite.

Intermédiaire HI

Héberge la forme asexuée ou larvaire du parasite.

- Actif : Transporte et inocule la forme infestante du parasite (exemple: l'Anophèle pour le Plasmodium)
- Passif : Abrite la forme infestante (le bœuf pour les Tænias)

Paraténique HP


Hôte facultatif dans lequel le parasite ne subit aucune transformation mais qui favorise la dispersion et permet l'accumulation du parasite.


Parasite
Association hétérospécifique
Hôte
Tire profit, se nourrit, s'abrite ou se reproduit

DIFFÉRENTS TYPES DE PARASITISMES

Parasitisme obligatoire

Vit au dépens d'autrui



Parasitisme facultatif

Vit dans la nature et devient parasite quand les conditions sont défavorables (Acanthamoeba)

Parasitisme accidentel

Animaux libres avalés fortuitement et qui s'élimineront d'eux-mêmes (infusoires et myiases)

Parasitisme opportuniste

Un organisme commensal, mais peut devenir parasite et pathogène si les défenses immunitaires de l'hôte sont diminuées voire absentes (Isosporaa hominis).

Parasitisme obligatoire

le parasite ne peut vivre qu'aux dépens d'autrui

Le parasitisme temporaire : Le parasite quitte l'hôte quand ses besoins nutritifs sont satisfaits (Anophèle ; vecteur du Paludisme)

Le parasitisme périodique : Le parasite ne vit sur l'hôte qu'une partie de son existence, il n'est parasite qu'à l'état larvaire ou qu'à l'état adulte (Ankylostomes)

Le parasitisme permanent : Le parasite vit chez l'hôte pendant tout son existence (Taenia)

PRINCIPALES PARASITOSES HUMAINES

Parasitose = maladie due à des parasites

PLATHELMINTHES : ce sont les vers plats

NEMATHELMINTHES : ce sont les vers ronds (oxyures, ascaris, etc.)


Les ARTHROPODES servent souvent de vecteur (V) assurant le transport du parasite

MALADIES DUES A DES PROTOZOAIRES

Maladies	Genres de parasites	Mode de transmission
Amibiase Leishmaniose Paludisme (malaria)	***Entamoeba*** ***Leishmania*** ***Plasmodium***	Ingestion de kystes, Vecteur (phlébotome) Vecteur (Anophèle)

Amibiase (Entamoeba) :

Troubles intestinaux ou hépatiques





Entamoeba

Leishmanioses (Leishmania) : Ulcérations cutanées, muqueuses ou viscérales graves



Phlébotome

Piqûre

Promastigote

Peau (Homme)

Cellule du système phagocytaire mononucléé

Amastigote

Piqûre


intestin

Trompe









Cycle de développement de Plasmodium falciparum




Anophèle (moustique)


MALADIES DUES A DES PLATHELMINTHES


Maladies	Genres de parasites	Mode de transmission
Distomatoses hépatique	**Douve** ***Fasciola hepatica***	Ingestion de métacercaires à travers les végétaux
Bilharzioses - Intestinale - Hépatique - Rectale - Urinaire	**Schistosomes** ***Schistosoma mansoni*** ***S. japonicum*** ***S. intercalatum*** ***S. Haematobium***	Pénétration trans-cutanée de furcocercaire
Téniasis	Adultes ***Tœnia saginata,*** ***T. solium***	Viande de bœuf, porc
Hydatidose	Larves ***Echinococcus***	Ingestion d'œufs

Distomatoses (Douves) : Ingestion de métacercaire

Fasciola hepatica : atteinte hépatique








Fasciola hepatica


Bilharzioses (Schistosomes) : Pénétration trans-cutanée de furcocercaire











Œuf dans une cellule hépatique


Schistosoma mansoni

Schistosoma mansoni : Atteinte intestinale

Schistosoma japonicum : Atteinte hépatique

Schistosoma intercalatum : Atteinte réctale

Schistosoma haematobium: Atteinte urinaire



Ténias (*Tænia saginata, T. solium*) :

Asténie, douleurs abdominales, diarrhée



oncosphères

Herbes contaminés

Cysticerque dans le tissu musculaire

Viande mal cuite

selles → Bœuf ou porc → Homme

HI

HD

Cucurbitain

★


Cysticercose (*T.solium*) :




Les œufs de *T. solium* ingérés se transforment en larves (cysticerques) dans différents organes du corps humain. Lorsque celles-ci pénètrent le système nerveux central, elles peuvent provoquer des symptômes neurologiques (neurocysticercose), et notamment des crises d'épilepsie.


Hydatidose (*Echinococcus*)

Graves atteintes hépatiques ou pulmonaires nécessitant une intervention chirurgicale





Kystes hydatiques



Echinococcus granulosus





Echinococcus

MALADIES DUES A DES NEMATODES

Maladies	Genres de parasites	Mode de transmission
Oxyurose	***Enterobius***	Ingestion d'œufs
Ascaridiose	***Ascaris***	

Oxyurose (Enterobius) : Parasitose intestinale


Ingestion d'œufs embryonnés

selles → Mains salles / Aliment souillé → Homme (Tube digestif)

Œufs embryonnés



Enterobius



Un œuf de l'Enterobius




Enterobius dans un cæcum de l'Homme

Ascaridiose (Ascaris)

Troubles intestinaux



œufs de l'Ascaris







Ascaris

PROPHYLAXIE

Ensemble des mesures médicales ou hygiéniques destinées à prévenir l'apparition d'une maladie.

- L'assainissement de l'eau de boisson et l'eau de baignade
- Hygiène alimentaire
- L'hygiène corporelle
- Se protéger au moment du contact sexuel
- Se protéger des piqûres des moustiques et des mouches
- Ne pas marcher pieds nus en terrain boueux
- Cuisson suffisante de la viande et des poissons
- Congélation à -30°C des viandes et des poissons
- Destruction des viscère des moutons morts par Hydatidose
- Lutte contre le péril fécal
- Surveillance vétérinaire





