Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des sciences
Département de biologie
Laboratoire de biochimie
Pr. Khalid Tawfiki Hajji

Nom : ……..
Prénom : …….
Code ; …….
Amphi : ……...
N° d'examen : ……

Epreuve des Glucides & Lipides, (M15)
SVI-S3, Durée : 45minutes
(Janvier 2019-2020)

I) Soient les glucides suivants :
L'α-D-glucofuranose, le β-D-glucopyranose, le D-glucose, le β-L-glucopyranose et l'α-D-glucopyranose. Quelle est la forme la plus abondante du glucose naturel en solution ? Pourquoi ? Donner ca formule selon la représentation de HAWORTH. A partir de ce dernier combien de stéréoisomères peut-on obtenir**. (2 pts)**

……
……
……
……
……
……
……

II) Quel type de liaison intervient dans la formation des disaccharides?
Les disaccharides les plus abondants et naturels sont : le saccharose et le lactose**.**
Quelles osidases spécifiques permettent leur hydrolyse ?
Quelle est la composition en hexoses de ces diholosides ? (donner juste les noms) **(2,5 pts)**

……
……
……
……
……
…….
…….
……
……
……...
.....
.....

III) Le glucose, le galactose, le talose et le gulose sont des aldohexoses. L'osazone du D-galactose est la même que celle du D-talose. Le D-galactose diffère du D-glucose par la configuration du carbone 4. L'oxydation nitrique du L-gulose et du D-glucose aboutit au même acide dicarboxylique. Déduire de ces données les formules linéaires du D-galactose, du D-talose et du D-gulose**. (2,5 pts)**

……....

……

……

……

……


……

…….....

……

……

IV) Le noyau stérol (figure ci dessous) et un précurseur de plusieurs stéroïdes. Les quels ? Et qu'il est leurs rôles ? **(3 pts)**



……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……