

# 디자인등록증

CERTIFICATE OF DESIGN REGISTRATION

등록

Registration Number

제 30-1249417 호

출원번호

Application Number

제 30-2023-0043704 호

출원일

Filing Date

2023년 11월 07일

등록일

Registration Date

2024년 02월 05일

등록의 구분

Type of Registration

일부심사등록

(PARTIALLY EXAMINED REGISTRATION)

물품류 Class

제19류

디자인의 대상이 되는 물품 Product

포장용 라벨

디자인권자 Owner

주식회사 와이엠케이(131111-\*\*\*\*\*)

경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14, 비동 1309호 (상대원동)

창작자 Creator

조인학(890404-\*\*\*\*\*)

경기도 성남시 분당구 내정로129번길 33, 201호 (정자동)

위의 디자인은 「디자인보호법」에 따라 디자인등록원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Design Protection Act, the design has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual  
Property Office

2024년 02월 05일

특허청장

COMMISSIONER,

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



QR코드로 현재기준  
등록사항을 확인하세요



이 디자인권은 「디자인보호법」 제33조(신규성 등), 제46조(선출원) 등의 등록요건에 대한 심사를 하지 아니한 디자인일부심사등록권리입니다.



# Amino Gold 아미노 골드

## 아미노 골드는?

전연성분의 아미노산 47% / 수용성유황 / 휴믹산 / 감태산과 각종 18종 이상의 각종 미네랄을 주성분을 혼합하여 제조생산한 농작물 성장에 최상의 영향을 주는 종합 영양제다.


## 아미노 골드의 효과

1. 과수류 및 과채류 : 수확량 증대, 당도 증가, 식감증대, 보관성 연장  
생장, 생육촉진, 외아발의 촉진, 개화전과 촉진, 과실비대 촉진, 착색촉진  
낙과 방지, 각종 해충 방지, 병충해 방지로 인한 상품성을 높여주는 역할을 함
2. 채소류 : 성장촉진으로 인한 수확시기를 앞당길 수 있다.  
수확량 증대, 식감증대, 보관성 연장, 각종 해충 (특히진딧물) 방지 및 병충해  
방지와과로 인하여 채소의 성장에 많은 도움을 준다.
3. 모든 농작물의 내병성, 내충성, 면역력 강화 / 저항력생성, 강화  
세포 활력 증진 / 병에 대한 / 뿌리 인산염수 증가 / 불응성 양분 기용과  
양분으로 치환하는 효과(킬레이트 작용)

## 주의사항

- 작물의 생육 상태 및 토양에 따라 사용량은 달라 질 수 있습니다.
- 기금적 석회 유황합제 및 기계유제와는 혼용하지 마십시오.
- 시비는 기금적 양분을 피하여 신선한 시간에 시비 하십시오.
- 직사광선을 피하여 건, 병양소에 보관 하여 주십시오.

# Amino Gold 아미노 골드



YMK Co., Ltd.  
**(주)와이엠케이**

경기도 성남시 중원구 사기막길로 45번길 14-B-1309호 | Tel. 010-3813-0491

## 대조구 (실험결과)

배추싹발 : 생체중 86% 증가 (경기도 파주)



토마토싹발 : 당도 2brix 증가, 생육촉진효과 (충남 부여)



수박싹발 : 당도 4brix 증가, 생육촉진효과 (충남 부여)



포도싹발 : 당도 3brix 증가, 착색촉진효과 (충남 천안)



## 적용작물 및 사용방법

| 적용작물 | 희석비율                             | 살포 면적      | 사용 주기                                                          |
|------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 과수류  | 합면 1배<br>1,000배                  |            | 생육초기부터 전생육기간<br>5~10회 간격                                       |
| 과채류  | 간터 1배 /<br>물 50원 ~ 75원           | 300평       | *작물의 생육 상태<br>제때 토양에 따라<br>사용량을 가감하여<br>사용하십시오.                |
| 양채류  | 토양/관주 4배<br>1,000배               | (1ha에)     |                                                                |
| 외채류  | 간터 1배 /<br>물 25원 ~ 50원           |            |                                                                |
| 근채류  | 1,000배<br>간터 1배 /<br>물 25원 ~ 50원 | 300평<br>기준 | 생육초기부터 전생육기간<br>수도적 : 아사전 3~5회<br>양파싹발 또는<br>물고에 물고으며<br>같이 사용 |
| 수도작  |                                  |            |                                                                |