




























Variable	Sample size	Prevalence	pct	Frequency
Fatigue or malaise	903		44.7%	404 / 903
Muscle pain or aching	900		36.4%	328 / 900
Headache	888		33.3%	296 / 888
Rectal pain	783		15.6%	122 / 783
Painful swallow	801		13.4%	107 / 801
Joint pain or aching	860		11.5%	99 / 860
Pain with urination	791		12.3%	97 / 791
Fever	100		85.0%	85 / 100
Pain in mouth	859		9.4%	81 / 859
Pruritis/itching	100		69.0%	69 / 100
Swallowing problem	866		6.9%	60 / 866
Nausea	866		6.5%	56 / 866
Chest pain	864		6.4%	55 / 864
Proctitis	576		8.5%	49 / 576
Vomiting	869		5.2%	45 / 869
Urinary symptoms	576		7.3%	42 / 576
Sore throat	101		40.6%	41 / 101
Ocular symptoms (pain, redness, visual loss)	865		2.9%	25 / 865
Psychologic disturbance	859		2.7%	23 / 859
Diarrhoea	872		2.5%	22 / 872
Dizziness	864		2.5%	22 / 864
Urethral discharge	317		4.7%	15 / 317
Rectal discharge	294		5.1%	15 / 294
Rectal urgency/tenesmus	297		3.7%	11 / 297
Decrease urine output	781		1.0%	8 / 781
Difficult swallow	28		28.6%	8 / 28
Red eye(s)	5		100.0%	5 / 5

Source: WHO

Variable	Sample size	Prevalence	pct	Frequency
Eye pain	5		60.0%	3 / 5
Any rectal symptom	101		2.0%	2 / 101
Other	5		20.0%	1 / 5
Visual disturbance	5		0.0%	0 / 5
...with blood	4		0.0%	0 / 4
Source: WHO				