




















Variable	Sample size	Prevalence	pct	Frequency
Fever	35		91.4%	32 / 35
Pruritis/itching	35		62.9%	22 / 35
Headache	35		42.9%	15 / 35
Fatigue or malaise	35		40.0%	14 / 35
Muscle pain or aching	35		31.4%	11 / 35
Sore throat	35		28.6%	10 / 35
Pain in mouth	35		17.1%	6 / 35
Swallowing problem	35		17.1%	6 / 35
Joint pain or aching	35		17.1%	6 / 35
Painful swallow	6		100.0%	6 / 6
Ocular symptoms (pain, redness, visual loss)	35		11.4%	4 / 35
Red eye(s)	4		100.0%	4 / 4
Vomiting	35		8.6%	3 / 35
Difficult swallow	6		50.0%	3 / 6
Eye pain	4		75.0%	3 / 4
Diarrhoea	35		5.7%	2 / 35
Nausea	35		2.9%	1 / 35
Urinary symptoms	35		2.9%	1 / 35
Pain with urination	1		100.0%	1 / 1
Any rectal symptom	35		0.0%	0 / 35
Chest pain	35		0.0%	0 / 35
Proctitis	35		0.0%	0 / 35
Dizziness	35		0.0%	0 / 35
Psychologic disturbance	35		0.0%	0 / 35
Source: WHO				

Variable	Sample size	Prevalence	pct	Frequency
Visual disturbance	4		0.0%	0 / 4
Other	4		0.0%	0 / 4
...with blood	3		0.0%	0 / 3
Decrease urine output	1		0.0%	0 / 1
Urethral discharge	1		0.0%	0 / 1
Source: <i>WHO</i>				