






















Variable	Sample size	Prevalence	pct	Frequency
Fatigue or malaise	437		6.2%	27 / 437
Proctitis	438		3.2%	14 / 438
Rectal pain	338		3.6%	12 / 338
Muscle pain or aching	437		2.1%	9 / 437
Pain with urination	341		2.6%	9 / 341
Headache	437		1.4%	6 / 437
Diarrhoea	438		1.4%	6 / 438
Urinary symptoms	436		1.1%	5 / 436
Pain in mouth	435		0.9%	4 / 435
Joint pain or aching	434		0.9%	4 / 434
Painful swallow	340		1.2%	4 / 340
Pruritis/itching	96		3.1%	3 / 96
Sore throat	440		0.7%	3 / 440
Nausea	436		0.7%	3 / 436
Vomiting	437		0.7%	3 / 437
Psychologic disturbance	432		0.7%	3 / 432
Difficult swallow	341		0.9%	3 / 341
Ocular symptoms (pain, redness, visual loss)	436		0.5%	2 / 436
Chest pain	438		0.2%	1 / 438
Dizziness	438		0.2%	1 / 438
Decrease urine output	339		0.3%	1 / 339
Fever	97		0.0%	0 / 97
Any rectal symptom	97		0.0%	0 / 97
Swallowing problem	97		0.0%	0 / 97
Source: WHO				