

ХАРЬКОВСКІЯ ГУБЕРНСКАЯ ВѢДОМОСТЬ. ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

№ 40.

ОКТЯБРЯ 8

1855.

Содеряніе: Краткій медицинскій отчетъ о дѣйствіи Временного Военнаго Отдѣленія.—Замѣтки о содержаніи скота зимою.—Частныя объявленія.—О прѣѣхавш. и выїхавш.—

Краткій медицинскій отчетъ о дѣйствіи Временного Военнаго Отдѣленія при Харьковской Губернской Болницѣ, завѣдывавшаго этимъ Отдѣленіемъ, Акушера Харьковской Врачебной Управы, Надворного Советника В. Франковскаго.

(Окончаніе.)

Angine—Erysipelas.

Angina faucium рѣдко составляла самостоятельную болѣзнь, чаще же была припажомъ гриппаго пораженія дыхательныхъ органовъ и кишечнаго канала. Лучшимъ мѣстнымъ средствомъ для уничтоженія ея было прижиганіе крѣпкимъ растворомъ лаписа, 10 гранъ на унцъ воды.

Parotitis. Не рѣдко было ея появление въ позднѣйшемъ періодѣ тифа, и едва наблюдалось нѣсколько случаевъ, где она составляла болѣзнь самостоятельную. Обвладываніе ватою съ камфорою опухшихъ мѣстъ и, при усиленномъ горячечномъ состояніи, внутрь рвотный камень доставляли всегда вѣрное и скорое пособіе.

Erysipelatis faciei et capillitii, въ соединеніи съ гриппымъ пораженіемъ дыхательныхъ органовъ, наблюдались три случая. Внутрь рвотный камень, наружу вата были достаточными пособіями для излеченія ея. Чаще рожа встрѣчалась въ позднемъ періодѣ тифа; въ этихъ случаяхъ она обыкновенно начиналась съ верхушки носа, быстро распространялась синевою по лицу и была обыкновенно предзнаменованіемъ смертельнаго исхода этой болѣзни.

Поносы.

Поносы, обыкновенно составляя припадокъ другихъ болѣзней, были по преимуществу гриппаго свойства, и чаще встречались съ половины Февраля. Если сопровождающее ихъ лихорадочное состояніе не было сильно развито и мѣстное пораженіе кишекъ не доходило до степени явнаго и болѣе глубокаго воспаленія, то повторенное приставливаніе горчичниковъ къ животу, сухихъ банокъ къ спинному хребту, и внутрь отъ двухъ до четырехъ въ день полныхъ столовыхъ ложекъ магнезіи, размѣшанной съ водою, были обыкновенно достаточны для излеченія поноса.

Даваемая такимъ образомъ магнезія равно помогала какъ при жидкихъ и обильныхъ кишечныхъ отදеніяхъ, такъ и при малоколичественныхъ, уподобляющихся дисентеріи. При болѣе развитомъ воспаленіи въ кишкахъ ставились на животъ кровососныя банки и внутрь прописывался каломель, въ рѣдкихъ, но большихъ пріемахъ—отъ 4 до 6 гранъ въ одинъ разъ. Послѣ же уменьшенія воспаленія назначалась магнезія, дѣйствующая, по моему мнѣнію, всегда благотворно въ поножахъ, зависящихъ въ особенности отъ раздраженія слизистой перепонки кишечкъ.

Cistitis.

Рядовой Василій Шандриковъ, 35 лѣтъ, крѣпкаго тѣлосложенія, поступилъ 23 Декабря, съ задержаніемъ, почти въ теченіе сутокъ, мочи, вздутымъ чувствительнымъ внизу животомъ, лихорадочнымъ состояніемъ, тошнотою и затвердѣніемъ желудка. Поставленный катетеръ вызвалъ сначала значительное количество гноя изъ нарыва, образовавшагося въ шейкѣ пузыря, а потомъ мочу. Кровяные на низѣ живота банки, внутрь каломель и послѣ магнезія быстро улучшили состояніе больнаго. 10 Января излеченный выписанъ изъ больницы.

Ревматизмъ.

Рѣдко наблюдался какъ болѣзнь самостоятельная, чаше же составляла сопряженіе съ другими болѣзнями и лечился обыкновенно прикладываніемъ ваты съ камфорою къ страждущимъ мѣстамъ, при внутренномъ употребленіи рвотнаго камня въ чистыхъ пріемахъ.

Одинъ случай ревматического воспаленія testiculorum у рекрута Лаврентія Назаренко, (поступив. 30 Декабря, выписан. 15 Января), весьма успешно былъ уничтоженъ подобнымъ лечениемъ.

Перемежающаяся лихорадка.

Въ Декабрѣ и Январѣ мѣсяцахъ чаше составляла начало другихъ болѣзней, или сопутствовала имъ, или съдовала послѣ нихъ. Съ конца Февраля и далѣе наблюдалась какъ болѣзнь самостоятельная и обыкновенно съ завалами брюшныхъ органовъ и хоть легкимъ гриппнымъ пораженіемъ дыхательныхъ органовъ или поносомъ. Сначала emeticum, а потомъ отъ 8 до 10 гранъ хинина, передъ пароксизмомъ, обыкновенно прекращали лихорадку.

Если лихорадочные пароксизмы не были правильно развиты, не имѣли опредѣленныхъ періодовъ и вмѣсто явныхъ перемежекъ замѣчалось только значительное послабленіе (temissio) припадковъ, то вмѣсто хинины ставились повторительно сухія банки къ спинному хребту, которая, по моему наблюденію, въ чистой и явной перемежающейся лихорадкѣ, оказывались бесполезными.

Выздоравливающимъ послѣ лихорадокъ давалось въ малыхъ пріемахъ Tinct. nucis vomic.

Рекрутъ Онуфрій Реуцкій, съ завалами брюшныхъ внутренностей и хроническимъ катаромъ легкихъ, 8 Апрѣля переведенъ въ Губернскую Больницу; остальные 22 выпущены здоровыми.

Хронические болѣзни.

Водянка. (Hydrops.)

Три случая излеченія водянки, развившейся у больныхъ, поступившихъ въ госпиталь первоначально съ острыми болѣзнями, по способу новому, едва ли вѣмъ либо изъ врачей до сихъ поръ предложеному, сообщаю здѣсь подробно.

1) Рядовой Харьковскаго Гарнизоннаго Батальона, Альбинъ Малашинскій, слабаго тѣ-

зосложенія, съ желтымъ худощавымъ лицемъ, будучи одержимъ катаральнымъ поносомъ и трехдневною перемежающеюся лихорадкою, безъ ощущительныхъ заваловъ брюшныхъ внутренности, поступилъ въ больницу 4 Февраля. Бользнь эта прекратилась въ теченіе 5 дней, вслѣдствіе употребленія горчичниковъ, ежедневно прикладываемыхъ къ животу и спинному хребту, 12 гранъ сѣрнокислого хинина, данного за 2 часа до пароксизма, и приема углекислой магнезіи, по четыре столовыя ложки въ день.

10 числа того же мѣсяца вновь появились лихорадочные припадки съ упадкомъ силъ, и въ послѣдствіи развился тифъ, окончившійся благополучно около 25 Февраля съ появлениемъ необильной испарины, нѣсколько разъ возобновлявшейся. Леченіе тифа состояло въ назначеніи больному около 2 фунтовъ молока изъ конопляннаго сѣмени, и въ приставливаніи, по временамъ, сухихъ банокъ къ позвоночнику и животу. Съ 1 по 8 Марта силы больного постепенно укреплялись при ежедневномъ приемѣ внутрь одного фунта отвара изъ унца Исландскаго мха, съ прибавленіемъ Tinct. nucis vomic. по 3 капли въ день. 8 Марта появился отекъ ногъ, быстро увеличившійся, и 19 Марта не только на нижнихъ конечностяхъ была значительная водянная опухоль, но и обнаружилось скопленіе воды въ животѣ, съ замѣтнымъ прибавленіемъ объема его. Моча при этомъ малоколичественная, мутная, красноватая; кожа сухая, языкъ влажный; явился частый и сухой кашель съ легкимъ къ вечеру лихорадочнымъ состояніемъ. При тщательномъ осмотрѣ больнаго, кроме катарального воспаленія вѣтвей дыхательного горла, другихъ ощущительныхъ мѣстныхъ пораженій не оказалось.

20 Марта отваръ Исландскаго мха оставленъ, и назначенъ рвотный камень (6 гранъ на 6 унцовъ воды) для приема сначала двухъ ложекъ въ одинъ разъ, и послѣ чрезъ 2 часа

по столовой ложкѣ. Въ этотъ день больного рвало съ примѣсью желчи шесть разъ и слабило пятнадцать водянистыми, болѣе или менѣе, обильными испражненіями. Къ вечеру больной имѣлъ покойный сонъ, общую веобильную испарину и вовсе не имѣлъ лихорадочнаго состоянія.

21 Марта отекъ нижнихъ конечностей и объемъ живота весьма замѣтно уменьшился; въ продолженіе трехъ слѣдующихъ дней больной оставался безъ лекарства, чувствовалъ себя удовлетворительно, имѣлъ аппетитъ, покойный сонъ, во время втораго возобновлялась общая, хотя необильная испарина; отдѣленіе мочи нѣсколько окраинной, но болѣе светлой, увеличилось до 5 фунт. въ сутки. 24 Марта возобновленъ приемъ рвотнаго камня въ прежнемъ количествѣ и въ такомъ же приемѣ; больнаго рвало три раза, слабило десять водянистыми испражненіями. Вечеромъ и ночью того же дня появилась обильное прежніе испарина, и на слѣдующій день, 25 Марта, не осталось ни какихъ следовъ ни отека нижнихъ конечностей, ни скопленія воды въ животѣ; отдѣленіе совершенно нормальной мочи достаточное, кожа мягкая, пульсъ покойный, кашель прекратился. 28 больному, для укрепления силъ, опять назначенъ отваръ Исландскаго мха съ Tinct. nucis vomicae и, въ настоящее время, совершенно излеченный отъ водянки, больной остается еще въ больнице по причинѣ появившагося въ правомъ колѣнѣ ревматизма.

2) Рекрутъ проходящей чрезъ Харьковъ партии, Мартынъ Бондарчукъ, 26 лѣтъ, лимфатического тѣлосложенія, поступилъ въ госпиталь 25 Декабря съ катаральнымъ воспаленіемъ кишечка. Кровяные банки на животѣ, каломель и послѣ углекислая магнезія въ теченіе шести дней уничтожили болѣзнь совершенно. 8 дня послѣ вступленія въ больницу открылось гемороидальное теченіе изъ прямой кишки, крови отошло около фунта, что

повторялось и на другой день. Такое геморроидальное течениe, продолжавшееся два дня съ потерю крови около двухъ фунтовъ, не произвело по видимому особенного разстройства, кромъ нѣкоторой слабости силъ. Въ продолжение слѣдующей недѣли больной оставался при употреблении Tinct. nucis vomicae по три капли въ день. Здоровье его, по видимому,-было совершенно восстановлено, но 6 Января появились отекъ ногъ, быстро распространяющійся въ верхъ, водяная опухоль въ лицѣ въ 15 числа обнаружилось весьма ясное скопленіе воды въ животѣ. При этомъ отдѣленіе мочи малокачественное, кожа сухая, языкъ влажный, по вечерамъ легкія лихорадочные движения. 18 Января назначенъ приемъ рвотнаго (камня въ количествѣ шести гран. на шесть унціовъ воды) сначала по двѣ столовыя ложки въ одинъ разъ, а послѣ чрезъ два часа по ложкѣ. Больного рвало, съ примѣсью желчи, четырераза и слабило въ теченіе сутокъ 16 разъ; къ вечеру сонъ покойный, кожа влажная, лихорадочнаго состоянія не было. 19-го видимое уменьшеніе отека ногъ и объема живота; отдѣленіе мочи, еще нѣсколько окрашенной, увеличилось. Три слѣдующіе дня больной оставленъ безъ лекарства, при общемъ довольно удовлетворительномъ состояніи здоровья; отдѣленіе мочи достаточное, но дальнѣйшаго явнаго уменьшенія объема ногъ и живота не замѣчалось. 23 Января возобновленъ приемъ рвотнаго камня въ томъ же количествѣ, почти съ тѣми же послѣдствіями; появленіе испаринъ обильнѣе прежняго возобновлялось неоднократно въ теченіе слѣдующихъ дней; отдѣленіе совершенно нормальной мочи увеличилось, и 27 Января не было ни какихъ слѣдовъ водянки. Большой, совершенно излеченный, оставленъ при одномъ только употреблении прежнихъ приемовъ Tinct. nucis vomicae, и 5 Февраля выписанъ изъ больницы.

3) Рядовой Харьковскаго Гарнизоннаго Батальона Николай Жулявскій, 36 лѣтъ, посред-

ственного тѣлосложенія, съ кахетическимъ обликомъ, поступилъ въ госпиталь 25 Января съ воспаленіемъ подреберной плевы и лѣваго легкаго. Отъ приставливанія кровососныхъ банокъ на лѣвый бокъ, употребленія внутрь Natri nitr. въ послѣдствіи времени, повторительныхъ мушекъ на лѣвый бокъ, болѣзнь по видимому совершенно разрѣшилась, и кромѣ небольшаго кашля съ отдѣленіемъ малаго количества доброкачественной мокроты, легкаго лихорадочнаго по вечерамъ состоянія, другихъ болѣзненныхъ припадковъ не замѣчалось.

4 Февраля появился отекъ ногъ съ пропухлостью лица, кашель и лихорадочное состояніе увеличились. Въ теченіе четырехъ слѣдующихъ дней отекъ нижнихъ конечностей быстро прибавлялся, появилось накопление воды въ животѣ; отдѣленіе красноватой мочи малокачественное, кожа сухая; недостатокъ аппетита, усиленная жажда, пульсъ ускоренный, къ вечеру злѣтній жаръ. 8 Февраля назначенъ рвотный камень, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ для подобнаго же употребления. Рвало большого 6 разъ, слабило 13 водянистыми болѣе или менѣе обильными испражненіями. Два слѣдующіе дня больной оставался безъ лекарства. Отекъ ногъ и объемъ живота замѣтно уменьшились, количество окрашенной мочи нѣсколько прибавилось, испаринъ не было, вечерній жаръ меньше. 12-го повторенъ приемъ рвотнаго камня такимъ же образомъ и большого рвало 4 раза, слабило 12. Въ продолженіе двухъ слѣдующихъ дней, въ которые не давалось лекарства, отекъ ногъ почти исчезъ, количество не столь красной мочи болѣе значительно, кашель и вечерній жаръ меньше. 15-го въ третій разъ назначенъ приемъ рвотнаго камня: рвало большого съ примѣсью желчи два раза, слабило десять. Два слѣдующіе дня жара почти не было, пульсъ мягкий, менѣе склонный, кожа влажная, отдѣленіе почти нормальной мочи достаточно, воды въ животѣ остаетъ.

ся весьма не много, отекъ лица совершенно проходитъ, кашель небольшой. 18-го четвертый и послѣдній пріемъ рвотнаго камня: рвало больнаго желчью два раза, слабило девять. Вечеромъ и ночью жара совершенно не было, испарина обильная, отдѣленіе совершенно нормальной мочи достаточное; на другой день не осталось ни какихъ признаковъ водянки. Легкій кашель, поддерживаемый хроническимъ раздраженіемъ вѣтвей дыхательнаго горла, прекратился вслѣдствіе пріема порошковъ: Rp.— Sulphur. aurat. antimon. Pulv. fol. Digital. purg. rec. parat. aa gr. и num, Sacchari albi gr. decem m. f. pulv. d. t. d. № 18 S., —три раза въ день по порошку. 20 Марта больной выпущенъ изъ больницы совершенно здоровымъ.

Описанные здѣсь случаи явно доказываютъ быстрое и полезное дѣйствіе рвотнаго камня въ леченіи водянокъ. Къ употребленію его для этой цѣли побудило меня испытанное мною нѣсколько разъ съ большою пользою въ леченіи водянки, происшедшій отъ заваловъ брюшныхъ внутренностей, вслѣдствіе лихорадокъ, дѣйствіе съѣже выжатаго сока изъ корки корня бузины (*sambucus nigra*). Дѣйствіе это, по моему мнѣнію, исключительно основывается на рвотно-слабительномъ его свойствѣ, такъ какъ означенный сокъ, даваемый больнымъ въ меньшихъ пріемахъ, не производящихъ рвоты и поноса, не возбуждаютъ, какъ я убѣдился, ни испарину, ни усиленного отдѣленія мочи, и въ такихъ пріемахъ оказывается совершенно безполезнымъ въ леченіи водянокъ.

Едвали нужно здѣсь говорить о преимуществахъ рвотнаго камня, какъ средства болѣе извѣстнаго, которое можетъ быть употребляемо во всякое время года, предъ союмъ корки корня бузины, легко подвергающимся порчу, и употребленіе котораго ограничивается короткимъ срокомъ въ году.

Разсматривая тщательно дѣйствіе рвотнаго камня въ большихъ пріемахъ на человѣческій организмъ, и взвѣшивая указанія, достигаемыя нами въ леченіи водянокъ, съ уверенностью заключить можно, что средство это, предпочтительнѣе предъ всѣми другими, можетъ оказывать величайшую услугу въ леченіи многообразныхъ видовъ этой болѣзни.

Водянка въ сопряженіи съ Брайтовой болѣзни, какъ доказали наблюденія Доктора Legroux (*Union mѣdicale*), по крайней мѣрѣ въ начальныхъ ея періодахъ, будетъ тоже указаниемъ для назначенія рвотнаго камня.

И такъ, при отсутствіи явныхъ общезвѣстныхъ противопоказаній, въ числѣ коихъ преимущественно должны быть поименованы весьма значительная слабость силъ въ позднемъ періодѣ болѣзни, явные органическія болѣзни сердца и большихъ сосудовъ, явные признаки воспаленія желудка и кишокъ, при сухомъ красномъ языкѣ, —рвотный камень можетъ быть назначаемъ съ пользою въ разныхъ видахъ водянки. Для этого нахожу положительно необходимымъ: 1) прописывать рвотный камень въ полныхъ пріемахъ, производящихъ сильное рвотно-слабительное дѣйствіе; 2) давать не больше, какъ въ теченіе одного дня и послѣ прекращать пріемъ въ продолженіе двухъ, трехъ или четырехъ дней, соображаясь съ силами больнаго и болѣе или менѣе рѣзкимъ дѣйствиемъ самого средства.

Искренно желаю, чтобы другіе врачи, повторивши эти опыты, утвердили своими вѣрными наблюденіями пользу рвотнаго камня въ разнообразныхъ видахъ водянки, и доставили облегченіе страждущему человѣчеству улучшеніемъ леченія столь частаго и опаснаго недуга.

Прочія хронические болѣзни.

Кромѣ чахотки легкихъ, о которой вкратцѣ

сказано выше, не лишнимъ здѣсь будетъ вспомнить иѣсколько случаевъ леченія хронической головной боли съ глухотою ревматическо-золотушного свойства.

Болѣзнь эта у всѣхъ безъ исключенія успѣшно лечилась внутреннимъ употребленіемъ Kali hydrojodici, фонтанелями за ушами, и да-валяемъ по временамъ слабительнымъ (r-*lalac laxantes viennenses*).

Десять случаевъ хронического страданія надкостной пlevы голени, золотушно-вещерического свойства, причинявшаго мучительные ночные боли,ользованы тоже успѣшно внутреннимъ употребленіемъ Kali hydrojodici.

Этимъ же средствомъ излечено ревматическое страданіе надкостной пlevы челюстей съ шатаніемъ зубовъ у рядового Александра Конѣйкина, принятаго въ больницу 23 Декабря, выписаннаго 5 Января.

Хроническія язвы голени у плѣознаго больнаго (Николая Зарембы, поступившаго 5 Февраля, выписаннаго 15) и лишайныя язвы голени съ страданіемъ надкостной перепонки (рекрута Николая Чемура, поступившаго 21 Декабря, выписаннаго 30 Января) тоже были излечены внутреннимъ употребленіемъ Kali hydrojodici и бинтованіемъ больныхъ членовъ. Больные слабогрудые, которымъ назначалось употребление Kali hydrojodici, привимали его совмѣстно съ тресковымъ жиромъ, усугублявшимъ полезное дѣйствіе іода.

Расширеніемъ сердца, съ утолщеніемъ его стѣнокъ, былъ одержимъ унтеръ-офицеръ Дмитрій Вохинъ, которому тоже съ иѣкотрымъ успѣхомъ давалось Kali hydrojodici съ рыбьимъ жиромъ. Съ закрытиемъ Временнаго Отдѣленія онъ переведенъ въ Губернскую Больницу.

Къ хроническимъ болѣзнямъ слѣдуетъ причислить четыре случая чесотки (Jcabies) и одинъ—паршой на головѣ (Tinea capititis) у больныхъ, поступившихъ съ острыми болѣзнями.

Чесотка лечилась сѣрною мазью Гельмериха и банею. Парши же на головѣ успѣшно уничтожены у рядового Франциска Панчука (принятаго 30 Декабря, выписаннаго 20 Января) Unguento antipsorico Werlhofii.

Въ числѣ иѣсколькихъ случаевъ наружныхъ болѣзней (caries digitorum pedis), вслѣдствіе отмороженія—furuncul, ушибовъ наружныхъ покрововъ головы и лица, съ изліяніемъ крови,—можно упомянуть о скиррозномъ затвердѣніи (у рядового Николая Семенюка, поступивш. 13 Февр., выписан. 13 Марта), величиною почти съ голубиное яйцо, образовавшееся въ кожѣ, покрывающей лѣвый високъ, надъ самымъ основаніемъ ушной раковины, которое вырѣзано, и рана заживала черезъ нагноеніе при повторяемыхъ по временамъ прижиганіяхъ лаписомъ.

Къ средствамъ, въ особенности часто употребляемымъ во Временномъ Военномъ Отдѣленіи, принадлежали: tartarus emeticus, calomel, magnesia carbonica, emulsio cannabis, decoct. lichenis Islandici, tinct. nucis vomicæ, sulfas chinini, natrum nitricum, pilulae laxative viennenses Dispens. Nelub. Kali hydrojodicum, oleum jecoris aselli, горчицы, кровяные и сухія банки.

Медикаменты, не входящіе въ составъ, положенный каталогомъ для гарнизонной команды, давались больнымъ на мой счетъ.

Замѣтки о содержаніи скота зимою.

Межу животными, которыхъ, такъ сказать, прикованы къ нашимъ жизненнымъ потребностямъ, одни истощаютъ свои силы въ тяжкихъ трудахъ при обработкѣ и удобреніи земли; другія таскаютъ тяжести и переносятъ человѣка въ разныя страны земного шара, куда его влечетъ или слава, или промыселъ, или поправленіе здоровья; тѣ снабжаютъ насы своею шерстью для предохраненія отъ супостей холода; иные доставляютъ въ изобилии сало и жиръ, употребляемые для разныхъ потребностей, а наконецъ, почти всѣ поступаютъ къ столу того человѣка, для выгода и счастья котораго они трудились при одолжительное время. Въ награду всего этого человѣкъ содержитъ ихъ худе, отягощаетъ чрезмѣрными трудами и запираетъ въ хлѣвы, наполненные испорченнымъ и заразительнымъ воздухомъ; отсюда происходятъ болѣзни, истребляющія скотъ и зараза ежегодно у насъ появляющаяся, не столько отъ корма, сколько отъ нечистаго воздуха. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли допустить, чтобы существа эти, встопченныя тяжкими трудами въ лѣтнее время, были поставлены, при наступленіи зимы, въ тѣсные и плотно замкнутые хлѣва, откуда едва ихъ выгоняютъ только на водопой, гдѣ испарина отъ значительного числа скота и навозъ, приходящій въ броженіе вмѣстѣ съ растеніями, брошенными на подстилку, портятъ воздухъ и дѣлаютъ его недостаточнымъ для подкѣплѣнія силъ; можно ли, повторяемъ, допустить, чтобы эти несчастныя существа могли удержаться при такихъ условіяхъ въ полной силѣ и совершилъ здоровыи? Прибавимъ къ этому безпрестанное измѣненіе корма, а чаше недостатокъ его, при совершенномъ почти бездѣствии скотины, впродолженіе 5 или 6 мѣсяцевъ, легко понять можно, отчего происходятъ эти болѣзни и такая значительная смертность поль конецъ каждой зимы и вначалѣ весны. Чѣмъ менѣе скотъ имѣеть движенія, тѣмъ менѣе обнаруживается въ немъ испарицы, особенно

зимою; а отъ недостаточнаго испаренія происходитъ затвердѣнія въ брюшныхъ органахъ, препятствующія свободному ихъ дѣйствію. Иногда внезапный переходъ скота изъ тѣсныхъ, наполненныхъ животною теплотою хлѣвовъ, на открытый воздухъ повергаетъ скотину въ такія болѣзни, отъ которыхъ, втече-ніе двухъ, трехъ дней она погибаетъ. Тѣже, который могли перенести столь вредное вліяніе, бываютъ искудалыя, едва передвигающія ноги, и если выздоравливаютъ, то единственно потому, что имъ данъ былъ лучшій кормъ, доставлено регулярное движеніе и онъ воспользовались чистымъ сѣйкомъ воздухомъ.

Если же мы заглянемъ въ овчарни, то найдемъ, что тамъ еще хуже. Тамъ, кромѣ вышеописанныхъ вредныхъ вліяній, большое постоянное испареніе пота,—которому подвержены овцы, увеличенное теплотою и недостаткомъ воздуха, который не можетъ очистить атмосферы и вбираться въ навозъ, выбрасываемый овцами безпрестанно,—остается на шерсти, образуетъ на кожѣ оболочку, которой острый и щекій жиръ раздражаетъ кожу, возбуждаетъ щекотаніе и производитъ болѣзнь невыносимаго зуда или паршней, заразительную для цѣлаго стада, равно воспаленіе печени и другія болѣзни, поражающія одну десятую часть овецъ всего стада.

Нельзя еще не упомянуть и о другихъ причинахъ скотскихъ болѣзней. Многіе хозяева, за недостаткомъ корма, принуждены выгонять скотъ въ поле тотчасъ послѣ стаянія снѣга. Въ это время скотина кормится травою про никнутою снѣгомъ и несогрѣтою ещесолицемъ. Сокъ этихъ вновь являющихся травъ бываетъ болѣе бесполезнымъ, неудобоваримъ, нежели питательнымъ кормомъ и тѣмъ болѣе вреднымъ, что выгнанный послѣ скучнаго зимняго содержанія скотъ, имѣть ослабленныя силы и завалы внутренностей. Такой кормъ производить только колики, раздутіе брюха, лимфатическая засоренія, гнилья и смертельный горячки, которые появляются или тотчасъ, или послѣ, сообразно внезапнымъ перемѣнамъ сырости,

холода или тепла. Наконецъ и самые утренние небольшие морозы, во время ранней весны, часто содержать въ себѣ вредную остроту, заражающую только что появляющіяся растенія, и у скотины, питающейся ими, легко можетъ произойти опасное воспаленіе легкихъ.

Для отвращенія всего вышеописанного опытные сельскіе хозяева и знающіе ветеринарные врачи советуютъ соблюдать слѣдующія правила:

- 1) Не держать скотъ во время зимы въ местахъ тѣсныхъ и недоступныхъ воздуху.
- 2) Провѣтривать по несколько разъ въ день хлѣвы, где скотъ зимуетъ, и освѣжать въ нихъ воздухъ.
- 3) Гонять скотъ два раза въ день утромъ и вечеромъ на водопой, а въ хорошую погоду выгонять и для прогулки.

4) Чистить скотъ скребницею и щетками по крайней мѣрѣ одинъ разъ въ день.

5) Кормить его здоровымъ кормомъ, вакъ-то: сѣномъ, соломою, картофелемъ, морковью, свеклою, отрубями, овсомъ, ячменемъ, но всегда въ достаточномъ количествѣ, и постоянно, время отъ времени, давать скоту порцію соли.

6) Вычищать часто конюшни и хлѣвы, наблюдая, чтобы въ нихъ не накаплялось навоза въ большомъ количествѣ.

7) Наконецъ, не выгонять скотъ въ поле тотчасъ послѣ стаянія снѣга, а подождать, пока трава нѣсколько подростетъ и солнце разсѣть туманы и осушить росу, которая въ самомъ началѣ весны бываетъ весьма вредною для здоровья скотины.

Э. З.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ.

1) По самой умѣренной цѣнѣ въ саду Харьковскаго 2-й гильдіи купца Рыжова, находящемся при его литьевомъ заволѣ, въ 1-й части, въ Вознесенскомъ приходѣ, можно получать отъ находящагося тамъ садовника пріцепки и колировки лучшихъ сортовъ яблонь и грушъ въ весьма значительномъ числѣ.—3.

ВѢДОМОСТЬ
о пріїхавшихъ и выїхавшихъ.

Отъ 1 по 8 Октября прибыли:

Изъ д. Панасовки, полк. Мечниковъ; г. Полтавы, маіоры: Денисьевъ и Вицинскій, вдѣйств. стат. сов. Франзоли; г. Переокопа, стат. сов. Деларю; г. Житоміра, полк. Арендаренко; г.

Черногова, полк. Тимоховичъ; г. Симферополь, кол. ас. Есауловъ и полк. Ковалевскій; с. Липецъ, полк. Карпенко; г. Ахтырки, ген.-маіоръ Проскуряковъ; г. Изюма, кол. ас. Юрковъ; г. Кременчуга, полк. Гнѣздовскій.

Выѣхали:

Въ г. Полтаву, подполк. графъ Строгановъ, кол. сов. Эзерскій и маіоръ Денисьевъ; г. Богодуховъ, надв. сов. Демьяновъ и ген.-маіоръ Симборскій; г. Ставрополь, маіоръ Жуковскій; г. Константиноградъ, полк. Филиповъ; г. Зміевъ, надв. сов. Новохацкій; г. Курскъ, надв. сов. Кевскій.