XAPLKOBCKIA

TYPEPHCKIN BELOMOCTH



25

CJEEOTA,

Иони 25 лия,

1349 ГОДА.

часть неоффицальная.

очдълч вчочой.

I. HBBBCTIA.

Куреніе табаку

въ больэнетворномъ отношении.

(Статья Ара Грума, составленная изъ наблюденія англійскаго ерача Laycock.)

Многіє врачи наблюдали дъйствія куренія табаку на различныя части тъла, и описали опыл; по распространившееся чрезмърно въ нычъшнее время куреніе, особенно сигаръ, обратило видмане англійскаго врача Лайкокка на этотъ важный гигіеническій предметъ. Наъ его наблюленія очевидно, что табачный дымъ дъйствуетъ, не смотря ни на какую привычку къ его употребленно, не только на колость рта, аъва, дыхательнаго горла, на миогочисленнъй-

шія воздухопроводныя трубочки легкихъ, по п на желудокъ, сердце, мозгъ и даже на вею нервиую систему. Послъдствія куренія табаку весьма различны у людей: они то болье, то менъе явственны, а иногда совсъмъ незамътны; разности сти зависять отъ многихъ условій, и со стороны человъка, употребляющаго оное. Накоторые люди всю жизнь могуть, повидимому, безвредно, очень много курить кранкій табакъ и въ видъ сигаръ. Они чувствуютъ при этомъ даже наслаждение, которое, однакожъ, можетъ повлечь за собою важные припадки, при чрезмърномъ и долговременномъ куреній и при содъйствій къ тому обстоятельствъ. По изкоторые люди, кръпкаго, повидимому, слежения, тотчасъ начинаютъ испытывать непріятисе ощущене, и потомъ подвергаются изкоторымъ припадкамъ, какъ-только покурять забаку. Вообще, привычвые къ куренью табаку мюди могуть, безъ явственныхъ вредныхъ для здоровья последствій, выкуривать табыку въ неделю отъ полуунца до двад-

нати увисва: а въ однит разъ могутъ выкуривать воебще оть 2 до 3 унцевъ. Разумвется, что, въ отношения къ дъйствио табаку, больніая разница находится между куреніемъ ситаръ и трубки, а равно, между тъмъ или другимъ сортомъ табаку. Можно впрочемъ, допустить, что только неумъренное и постоянное пурение у привычныхъ къ нему людей производить действіе на части тела, подлежащия вліянію табачнаго дыма; это дъйствіе можно назвать уже бользветворнымъ (патогеническимъ). Лайковкъ замечалъ у страстныхъ курптелей обыкновенное, простое патологическое явление отъ дъйствія табаку, а именно: воспалительное состояніе сливистой перепонки губъ и языка, который иногла даже обнажается отъ своей по верхности кожицы. Потомъ начинають страдать миндалевидныя жельзы мягкаго неба и зъвъ, на которыхъ также слизиетая перепонка еохнеть отъ непрерывнаго раздражения, и неръдко представляетъ воспалительную красноту. При ближайшемъ разсматривания глотки, можно видъть, какъ поверхность ел, пъсколько опухшая, пспещрена наливнимися кровно жил ками, и какъ она, тамъ и сямъ, покрыта полосками вязкой слизи. Воспалительное состояніе распространяется вверху на заднія посовыя отвератія, и потому, курплышикъ чувствуеть отъ времени до времени отделение въ оныхъ слизистой мокроты и накопление ся въ верхнихъ частяхъ глотки. Таковое избыточное отделене мокроть происходить и вь полостяхь носе; поэтому страдають иногла и передтя отверзтія поса; въ этомъ случав газдражение обидруживается не столько обиль нымь отделениемы мокроты, сколько зудомы п покалываніемъ въ поздряхъ. Раздраженіе мо жеть перейти даже на соединительную плеву глазь, отв чего, у пъкоторыхъ курильшиковъ, итлаются въ глазахъ жаръ, легкое покрасиътые, слезотечение, и особеннаго рода судорожпое движене мышит, сжимающихъ вкки; протв-того, показываются передъ глазани искры упроме, при пробуждени от спа. Лобныя назухи также бывають поражены, отчего про-

и-ходигь во лбу тупая, гнетущая боль. При чревубрномы курены, самое важное обстоятельство заключается въ томъ, что въ раздичной степени страдають пищеварительные органы; это обозначается уменьшениемъ или потерею аппетита, даже позывомъ на рвоту и рвотою. При этомъ состояніи, подложечная сторона наприжена, чувствительна и даже весьма болить оть давления; это показываеть непрерывное раздражение желудка, переходящее пногла въ воспаление онаго. Курение имъетъ самое важное влияние на дыхательные органы, а посему на лействіе легкихъ в сердца, слъдовательно на кровь, а чрезъ нее и на всю нервиую систему. Огъ непосредственнаго вліянія табачнаго дыма на гортань и дыхательное гормо происходитът осиплость, подврание въ горяв, короткій, часто возобновляющійся кашель, перхота, тменно оттого, что, по наблюденіямь Лайкокка, делаются, въ сихъ случаяхъ, послъ воспаленія, язвинки внутри гортани. У иткоторыхт людей, особенно молодыхъ, расположенныхъ къ грудныйъ страданіямъ, бывчетъ, единственно отъ куренія табаку, кровохарканіе. Обыкновенно, послъ легкаго шекатанья глубоко въ горит, показывается съ кашленъ вревь темнал, пънистая, которая изъ какихъ частей происходитъ, неизвъстно. Отъ поражения легкихъ и изменения находянихся въ ших влагь зависить большею частно испріятный запахъ, бывающій при дыхании у табакокурителей. Дъйстые табачнаго дыма на сердце можно считать угистающимъ жланеничто его дъягельность. Тъ изъ табакокурителей, которые расположены къ страдаинять сердия, питють въ дъвой верхней части труди противу сердна пепріятное, томительное чувство. Выслушивание сердца показываетт, что оно быется слабо и инсколько неправильно. Пепріятное чувство неръдко постоянно гивадится въ грудныхъ мынцахъ, чаще съ правой, чтыв съ лъвой стороны.

Табачный дымы дыйствуеть на мозгы угнетаю. щимы образмы. Вседоназываеть, что оты табаку уменьщается быстрота мозговой диятельности, ж ослабляетсям дивтенность уметвенных опособ ностей: Однакожър табакът нез наводитъ такого рода снаг накъ оши и бълена, по еще поддерживаеть бажиет а если погружаеть въ конъ, то она обезновойвается страшимии сповиденілицу счтоль ръзкими, какъ-будтобы все соверя палось паяву последчего наступаетъ шавемо женіе и чрезмарная воспрівмчивость ко впечатлънгямы. Явлентя, вызывающия болгазиенное соотовніє всей первной системы, млогоразличны и обнаруживаются особеннымъ состоящемъ духа, несвол ствениымъ нормальному состолино человъва. Частныя последствия несыврениаго табалокуренія суть: завалы брюшныхъ внутренаостей, вслъдстве непрерывнаго раздражения и ослабления оныхъ; геморондальные припадки, пензотжные при такомъ состо янія брюнівых внутренностей; есобенный часто темный, кахетическій цкать лица и сынь на немъ, почернъніе аубовъ п десемъ; ссобенное исхудание лица, подобное тому, кагъ бываетъ у людей, истощенныхъ изнурительною бользнію; особенное слабоснійе и зависящая отъ того наклонность къ вялости и педсятель ности, принадки, схожіе съ явленіями лег-чной чахотки мужское безсиле (impotent. viril)

По произведеннымъ опытамъ падъ живетными съ водявою настойкою табаку и съ пригоръ лымъ его масломъ, можно вывести то общее заключеніе, что табакъ дъйствуетъ угнетаюінпить образомъ на первную систему, а вторично на кровообращение. Малые присмы табаку, отъ двухъ до ияти грановъ, постоянно даваемые собакамъ отъ двухъ до четырехъ разъ въ день, ослабляли ліервную силу до такой степени, что животныя доходили до совернонисто истошенія (marasmus). У нихъ дійстые сердца перемежалось, расширялись зрачки. Дъдлось сильное слезотечение; потомы отделя; набылазы глазы мокротангнойная, псукровичная; изконецъ, происходила совершенияя слънота; десна распукали и истощали кровь, выпадали яубы, воспалялась слезистая перепонка рта; животное чуть-чуть ходило, какъ-бы разбивое на влана поги, не имбло деакого побуж

денія къ соітия повидимому, у него была соглавершенно ослаблена силя ноловыхъ органова; даже выпадала шерсть, и собава казалась какът бы полумертвою. Посль смерти, находили у такихъ собавъ вревь весьма жидкою, лишению воловнистаго начала и шариковъ; сердце бладное, мягкое, малее; гнилость мастукала очень скоро.

И пекть суля по наблюденіямъ, досель сдве напнымь надъпродолжительных, медленымъ, постененнымъ дъйствісмъ дабачнаго дыма да, человь ческие организмы, можно почитать табакы, сильнымь, тобользиеннымь п (патогеническимь). д'ятелемъ, кеторый, повидимому, вовсе несро-, дейь съ человическою патурою. Хотя дынствіе табаку на раз проыхъ лодой, его употребляю. нихъ въ видь куренія, весьма многоразлично въ боядзиетворномъ отношения однакожъ, накакъ нельзя допустить, итобы онъ не имълъ, макіла пли меньшаго предоположном или отвинало на здоровье у встат людей, даже страстнолюбящихъ табакъ п, повидимому, ни мало не терпящихъ отъ него, а напродивътого, нахот дящихъ въ немъ наслаждение в необходимость, врі братенныя долговременного привычного къ нему, и усвоенныя себъ даже организмомъ. Эта пстина весьма важна во вранебной практикъ въ томъ отношении, что надлежить обращать особенное випмание на состояще здоровья. у такихъ людей, подвергающихся споротенцымъ бол (знямь, или имъющихъ хроническій недугъ, и поступающахъ въ пользоваще врача. При особенномъ, можно сказать, специфическомъ состояния организма у курильниковъ, различные органы и системы находятся у нихъ также совсьмъ не въ техъ жизневиыхъ условіяхъ, въ которыхъ опи бывають у людей, не курящихъ табакъ, и подвертинися одной и той же съ шими болгвии. Следовательно, на больныхъ курпльищковъ будуть действовать один и тв же лекарства различнымъ образомъ, а падобно приспособлять способы дечения не только встить инт вообще, по и къ каждому такому больному человьку отдельно. Вообще замичено, что у такихъ людей хровическое педуги весь-

ма упорны и тружно-лочимы, поточу-что эти больные продолжають курпть и въ продолженіе своихъ страданій. Только въ воспалительныхъ и горячныхъ бользияхъ природа перемъняетъ привычку, и отнимаетъ всю охоту курить, которая, однако, возвращается при выэдоровлении. Въ-особенности курене вредно для людей, пользующихся оть грудныхъ бользней и инпохондрическихъ страданій, сопряженных съ газстройствомъ пищеваренія и бо лъзнями печени. Многіе изъ такихъ людей не могутъ принимать лекарства, даже самыя обыкновенныя, именно потому, что слегка воспаленная слизистая оболочка желудка не можетъ выносить сихъ лекарствъ, которыя услубляють ея бользнение состояне. Между тымъ противувоспалительный способъ леченія никакъ затсь неумъстенъ, потому-что и раздражение и воспаление у курильщиковъ имьють характеръ специфический, и поддерживаются раз стройствомъ системы нервной и кровоносной. Противугастрическій способъ леченія или только временно и слабо помогаеть, или вовсе нелействителенъ: часто самыя сильныя слабительныя бездъйственны. Противунервный споании, визведоронопри атыб втэжом вінэчэг, вобо съ величайшимъ трудомъ, и дъйствительние пречихъ. Укръпляющія средства безполезны; только возбуждающія весьма благопріятны для курили щиковъ.

(Ap. 3dp.)

и. частныя извъщения.

Конкурспое Управленіе, учрежденное въ г. Харьковъ по дъламъ несостоятельнаго должника умершаго Харьковскаго кунца Прокофія Искры, находившееся въ 3-й части г. Харькова, въ домъ Коллежской Ассесории Головко вой, объявляеть, что, по распоряженію Харьковскаго Городовато Магистрата, оно перемъщено въ домъ Титулярнаго Совътныка Ивана Пащенка, состоящій въ той же части, подъ № 25% мъ.—1.

1848 года, въ ионт, уполномечная я довъренностию, засвидътельствованною въ Харьковской Палатъ Гражданскаго Суда, на ходатайство по дъламъ, заведеннымъ мною по Харьковской и Курской губерміямъ, дворянина Игнатія Дементьева сына Ганепровскаго; теперь довъренность эту я уничтожно.—2.

Помьщица Александра Гарина.

Данную мною въ 1847 году г. Титулярному Сочътнику Ивану Аоанасьеву Корнальеву довъревность ходатайствовать по мончъ дъламъ, утвержденную въ Харьковскомъ Городовомъ Магистратъ, нынъ я упичтожаю.—3.

Екатеринославскій купець Яковь Глухось.

Съ 19 го по 23-е поня прибыли въ городъ:

Изъ г. Чугуева, Генералъ-Маіоръ Кагадъевъ; С.-Петербурга, Генералъ-Маіоръ Левишнъ; г. Богодухова, Коллежскій Ассесоръ Демьиновъ; г. Волчанска, Генераль-Маіоръ Ланге и Коллежскій Ассесоръ Лихолетовъ; г. Славянска, Поднолковинкъ Пешкъ; с. Пяколаевки, Статскій Совътникъ Варонъ-Розенъ; с. Печенъгъ, Маіоръ Арцышевскій; г. Бирючи, Маіоръ Поперовскій; г. Чугуева, Генераль Маіоръ Черемисиновъ; С.-Петербурга, Коллежскій Совътникъ Зосимской.

B 51 B X A A H:

Въ г. Полтаву, Черпиговскій, Полтавскій и Харьковскій Генераль-Губернаторъ Кокошкинь; г. Екатеривославъ, Статскій Созвтивкъ Головкова; с. Ивколаевку, Статскій Совътникъ Варонъ Розенъ; с. Салтовъ, Коллежскій Совътникъ Алфераки; г. Чугуевь, Полковникъ Старовь; г. Кобеляки, Коллежскій Совътникъ Нанковскій; г. Полтаву, Генераль-Мајоръ Кагаджевъ; с. Латнюю, Статек и Совътникъ Шредерь; г. Богодуховъ, Коллежскій Ассесоръ Демьяновъ; г. Волчанскъ, Генераль-Мајоръ Ланге; г. Екатеринославъ, Статекій Совътникъ Павловскій; с. Лебединь, Маюдъ Щербаковъ; г. Тагапрогъ, Полковникъ Караяни и Подполковникъ Кирьяковъ; г. Курскъ, Коллежскій Ассесоръ Шеравцовъ; с. Лебикье, Коллеженій Ассесорь Винда; г. Волчанскъ, Статскій Совътникъ Масвекій; г. Курскъ, Аваствительный Статскій Совътникъ Баронъ Posent. ACH_

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ,

делаемыя при Харьковскомъ Университета.

Мженцъ и число.	Часы наблюденія.	Высота Барометр при 13¦ R.	Термом. R.	Наимен. суточная температ.	Наибол. суточная те м перат.	состояніе атмосферы.
1849. Іюнь 16.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудии.	590.76. 590,69. 590,56.	17,5 21,5 14,1	11	21,5	Ясно. Около полудня облач- но-ясно.
17.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудни.	590.48. 589,45. 589,22.	20 25,8 18,3	5,7	23,8	Утроиъ безоблачно—ясно.— Съ нолудия облачно—ясно.
18.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудни.	589,85. 590,45. 590.61.	17,8 20 15,2	6,5	20	Облачно-ясно.
19.	9 ч. утра 5 — по по 9 — аудии.	590.39. 519,88. 589,54.	17,9 26,5 20,5	7,6	26,5	Безоблачно—ясно, по-полуд ии облачно—ясно.
20.	9 ч. утра 5 — по по 9 — лудни.	590.08. 589.81. 590,24.	21,2 24,5 17,4	8,7	25,9	Безоблачно—ясно. Съ полуд ил облачно.
21.	9 ч. утра 3 — по по 9 — лудни.	590,14. 590,15. 590,05.	19,4 23 17	8,3	25	Облачно. Вечеронъ дождь громь, молнія; гроза и ночью
22.	9 ч. утра 3 — по по 9 — лудни.	590,21. 589,65. 589,15.	18,5 21,9 17,4	9,7	21,9	Облачно—ясно. Вътеръ очен спльный по-полудни.

Печатано съ дозволенія Исправляющаго должность Харьковскаго Грэжданскаго Губернатора, Дайствительнаго Статскаго Советника Траскина.