

# Universidade do Estado do Rio de Janeiro

## centro

unidade patrono

Nome Sobrenome

Título do trabalho acadêmico

Cidade

#### Nome Sobrenome

#### Título do trabalho acadêmico

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Curso, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Orientador: Cargo Titulação Nome Sobrenome Coorientador: Cargo Titulação Nome Sobrenome

### CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CTC/D

D979	Sobronomo	Nomo
D979	Sobrenome,	nome

Título do trabalho acadêmico / Nome Sobrenome. – Cidade, a<br/>aaa- $32\ {\rm f.}$ 

Orientador: Cargo Titulação Nome Sobrenome Dissertação (Mestrado) — Universidade do Estado do Rio de Janeiro, unidade, Programa de Pós-Graduação em Curso, aaaa.

1. primeira palavra chave.. 2. segunda palavra chave.. 3. terceira palavra chave.. I. Cargo Titulação Nome Sobrenome. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. III. unidade. IV. Título

CDU 02:141:005.7

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e cie	entíficos, a reprodução tota	l ou parcial desta
dissertação, desde que citada a fonte.		
Assinatura		Data

#### Nome Sobrenome

#### Título do trabalho acadêmico

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Curso, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Aprovada em dd de Mês de aaaa. Banca Examinadora: Cargo Titulação Nome Sobrenome (Orientador) Unidade – Instituição Cargo Titulação Nome Sobrenome (Coorientador) Unidade – Instituição primeiro membro titular da banca instituição segundo membro titular da banca instituição terceiro membro titular da banca instituição primeiro membro suplente da banca instituição segundo membro suplente da banca instituição terceiro membro suplente da banca instituição instituição instituição

Cidade

aaaa

# DEDICATÓRIA

### AGRADECIMENTOS

Texto de agradecimento

#### RESUMO

SOBRENOME, Iniciais. Do. Nome. *Título do trabalho acadêmico*. aaaa. 32 f. Dissertação (Mestrado em Curso) – unidade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Cidade, aaaa.

Texto do resumo em português.

Palavras-chave: primeira palavra chave. segunda palavra chave. terceira palavra chave.

#### ABSTRACT

SOBRENOME, Iniciais. Do. Nome. *Title of dissertation*. aaaa. 32 f. Dissertação (Mestrado em Curso) – unidade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Cidade, aaaa.

Abstract in English.

Keywords: first keyword. second keyword. third keyword.

### LIST OF FIGURES

Figure	1 - Título da figura.																22
Figure	2 - Título da figura.																23

### LIST OF TABLES

Table 1 - Título da tabela	22
----------------------------	----

### LISTA DE ALGORITMOS

Algoritmo	1 - T	ítulo do	algoritmo.	•																								$2^{2}$	4
-----------	-------	----------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---

### LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

sigla1	por extenso
sigla2	por extenso
sigla3	por extenso

# LISTA DE SÍMBOLOS

simbolo1	significado e/ou valor
simbolo2	significado e/ou valor
simbolo3	significado e/ou valor

### CONTENTS

	INTRODUÇÃO	14
1	BOLTZMANN MACHINES	15
1.1	Boltzmann Machines	15
2	TÍTULO DO CAPÍTULO 1	21
3	TÍTULO DO CAPÍTULO 2	24
	CONCLUSÃO	26
	BIBLIOGRAPHY	27
	GLOSSÁRIO	28
	APPENDIX A – Primeiro apêndice	29
	APPENDIX B – Segundo apêndice	30
	ANNEX A – Primeiro anexo	31
	ANNEX B – Segundo anexo	32

# INTRODUÇÃO

Texto da introdução. Texto, texto texto (AMADO, 1969), texto Amado (1969). Texto Andrade em 1997, texto ANDRADE, texto.

#### 1 BOLTZMANN MACHINES

Here we begin by explaining the theory behind Boltzmann Machines

EXPLICAR OS ELEMENTOS DE PROBABILIDADE COM OS QUAIS ESTAMOS LIDANDO: QUEM SÃO AS VARIÁVEIS ALEATÓRIAS E COMO VAMOS DOMINÁ-LAS NO TEXTO, COMENTAR QUE ESTAMOS TRATANDO COM VARIÁVEIS DISCRETAS, COMO VAMOS IDENTIFICAR AS PROBABILIDADES....

EXPLICAR O QUE OS ÍNDICES REPResentam, e as variáveis.

EXPLICAR OS TERMOS  $\omega$  e  $\phi$ .  $\omega$  É para os pesos, e  $\phi$  para o bias de cada unidade.

EXPLICAR MINHA NOTAÇÃO sobre o sobre-escrito entre parênteses!!!

#### 1.1 Boltzmann Machines

Boltzmann Machines (BM) are a type of stochastic neural networks (SNN) where the connections between units, which are described by  $\omega$ , are symmetrical, i.e.,  $\omega_{ij} = \omega_{ji}$  [HERTZ]. This kind of stochastic neural networks are capable of learning internal representation and to model an input distribution. Boltzmann Machines were named after the Boltzmann distribution. Due to its stochastics behaviour, the probability of the state of the system to be found in a certain configuration is given by previous mentioned distribution [HERTZ]. According to [MONTUFAR, 2018], BM can be seen as an extension of Hopfield networks to include hidden units.

Boltzamann Machines have visible and hidden units. The visible units are linked to the external world and they correspond to the components of an observation. On the other hand, the hidden units do not have any connection outside of the network and model the dependencies between the components of the observations [FISCHER, 2012]. In BM, there is no connection restriction, this means that every unit, visible or hidden, can be connected to every other unit as in a complete graph, this pattern is not mandatory as some of the connections may not exists depending on the network layout.

Training Boltzmann Machines means finding the right connection between the units.

Boltzmann Machines (BM) are stochastics neural networks with symmetric connections, i.e.,  $\omega_{ij} = \omega_{ji}$ . Boltzmann Machines use the Boltzmann distribution to determine the probability of the state of the system of the network. BM ressambles the Hopfield networks with the inclusion of hidden units. Finding the right connections between the hidden units without knowing it from the training patterns what the hidden units represent is part of the solving the Boltzmann Machine problem.

Units  $x_i$  in BM are split into two kinds: visible and hidden units. The visible units have connection to the outside world and are the units that receive the data input. On the other hand, the hidden units do not have any connection to the outside of the network and they are resposible to find the data relation from the input. In a BM, the connections between units can be complete or not. Regardless of how the connections are, every connection in a BM is symmetric.

BM are made of stochastics units  $x_i$  which each of them can assume a binary value with a certain probabily as follows:

$$x_i = \begin{cases} 1 \text{ with probability } g(h_i) \\ 0 \text{ with probability } 1 - g(h_i) \end{cases} , \tag{1}$$

where

$$h_i = \sum_j \omega_{ij} x_j, \tag{2}$$

and

$$g(h_i) = \frac{1}{1 + e^{-2\beta h_i}}. (3)$$

Due to the symmetrical connections, there is an energy function give by

$$H(\mathbf{x}) = -\sum_{i} \sum_{j} \omega_{ij} x_i x_j - \sum_{i} \phi_i x_i, \tag{4}$$

where  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , and n is equal to the number of units in the network, and the above energy function has minimum when there is a stable state characterised by

$$x_i = sgn(h_i). (5)$$

The probability P of finding the system in a given state  $\mathbf{x}$  after the equilibrium is reached can be computed as follows:

$$P(\mathbf{x}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(\mathbf{x})},\tag{6}$$

where

$$Z = \sum_{\mathbf{x}'} e^{-\beta H(\mathbf{x}')} \tag{7}$$

is the partition function.

The learning process of a Boltzmann Machine consists in ajusting the connections

 $\omega_{ij}$  in such a way that the state of the visible units have a particular desired probability distribution.

Let us identify the state of the visible units by an index v and the state of the hidden units by an index h. Considering a system which has N visible units and K hidden units, the whole system have  $2^{N+K}$  possibilities of states in which it can be found.

The joint probability  $P_{vh}$  is the probability of finding the visible and hidden units in the states v and h, respectively. This probability measurement is given by the Boltzmann distribution:

$$P_{vh} = \frac{e^{-\beta H_{vh}}}{Z},\tag{8}$$

where

$$Z = \sum_{u} \sum_{k} e^{-\beta H_{uk}},\tag{9}$$

and

$$H_{vh} = -\sum_{i} \sum_{j} \omega_{ij} x_i^{(vh)} x_j^{(vh)} - \sum_{i} \phi_i x_i^{(vh)}.$$
(10)

As metioned above, the problem a Boltzmann Machine is trying to solve is determining the connections  $\omega_{ij}$  between units such that the visible units have a certain probability distribution. In order to do that, we need to find the marginal probability of the state v in which the visible units are found regardless of the state h of the hidden units. The marginal probability  $P_v$  is given by

$$P_v = \sum_h P_{vh} = \sum_h \frac{e^{-\beta H_{vh}}}{Z}.$$
(11)

Although we know that  $P_v$  is a function of the connections  $\omega_{ij}$ , and that this is the probability of finding the visible units in the state v. We want the states to have a certain probability  $Q_v$ , i.e., a desired probability. This means that ideally we would like to match the empirical distribution of the data, even though we do not have access to the correct distribution, only to what the observed data has given us as an input to training the model.

One way to evaluate the difference between two probability distribution, for example,  $P_v$  and  $Q_v$ , is using the Kullback-Leibler divergence, which can also be referred to relative entropy, E, which will be our cost function. (EXPLICAR FUNÇÃO DE CUSTO

e  $D_{KL}!!!$ ).

$$E = \sum_{v} Q_v \ln\left(\frac{Q_v}{P_v}\right). \tag{12}$$

The relative entropy E has the property of always being equal or greater than zero. It reaches zero only if  $P_v = Q_v$ , which means that we are able to retrieve the exactly probability distribution of the input data at the visible units.

$$E = \sum_{v} Q_v \ln \left(\frac{Q_v}{P_v}\right)$$

$$\geq \sum_{v} Q_v \left(1 - \frac{P_v}{Q_v}\right)$$

$$= \sum_{v} (Q_v - P_v)$$

$$= \sum_{v} Q_v - \sum_{v} P_v = 1 - 1$$

$$\Rightarrow E \geq 0.$$
(13)

From the gradient descent equation

$$\Delta\omega_{ij} = -\eta \frac{\partial E}{\partial\omega_{ij}},\tag{14}$$

where

$$E = \sum_{v} Q_v \ln \left( \frac{Q_v}{P_v} \right)$$

$$= \sum_{v} \left[ \ln \left( Q_v \right) - \ln \left( P_v \right) \right]. \tag{15}$$

In the following steps, we present the gradient descent derivation

$$\Delta\omega_{ij} = -\eta \frac{\partial E}{\partial \omega_{ij}}$$

$$= -\eta \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ \sum_{v} Q_v \left( \ln \left( Q_v \right) - \ln \left( P_v \right) \right) \right]$$

$$= \eta \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ \sum_{v} Q_v \ln \left( P_v \right) \right]$$

$$= \eta \sum_{v} Q_v \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ \ln \left( P_v \right) \right]$$

$$\Rightarrow \Delta\omega_{ij} = \eta \sum_{v} \frac{Q_v}{P_v} \frac{\partial P_v}{\partial \omega_{ij}}.$$
(16)

To continue with the computation of  $\Delta\omega_{ij}$ , we have to find the derivative of  $\partial P_v/\partial\omega_{ij}$ , from the marginal probability, equation 11,

$$P_v = \frac{\sum_h e^{-\beta H_{vh}}}{\sum_u \sum_k e^{-\beta H_{uk}}},\tag{17}$$

thus the derivative of  $P_v$  follows

$$\frac{\partial P_{v}}{\partial \omega_{ij}} = \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ \frac{\sum_{h} e^{-\beta H_{vh}}}{\sum_{u} \sum_{k} e^{-\beta H_{uk}}} \right] 
= \frac{1}{\sum_{u} \sum_{k} e^{-\beta H_{uk}}} \sum_{h} (-\beta) e^{-\beta H_{vh}} \frac{\partial H_{vh}}{\partial \omega_{ij}} 
- \sum_{h} e^{-\beta H_{vh}} \frac{1}{\left(\sum_{u} \sum_{k} e^{-\beta H_{uk}}\right)^{2}} \sum_{u} \sum_{k} e^{-\beta H_{uk}} (-\beta) \frac{\partial H_{uk}}{\partial \omega_{ij}}.$$
(18)

Following the equation 18, we need to compute the term  $\partial H_{vh}/\partial \omega_{ij}$ ,

$$\frac{\partial H_{vh}}{\partial \omega_{ij}} = \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ -\frac{1}{2} \sum_{m} \sum_{n} \omega_{mn} x_m^{(vh)} x_n^{(vh)} - \sum_{m} \phi_{mm} x_m^{(vh)} \right]$$

$$= \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ -\frac{1}{2} \sum_{m \neq i,j} \sum_{n \neq i,j} \omega_{mn} x_m^{(vh)} x_n^{(vh)} - \frac{1}{2} \omega_{ij} x_i^{(vh)} x_j^{(vh)} - \frac{1}{2} \omega_{ji} x_j^{(vh)} x_i^{(vh)} - \sum_{m} \phi_m x_m^{(vh)} \right],$$
(19)

as the connections between units are symmetric, i.e.,  $\omega_{ij} = \omega_{ji}$ , then we can simplify equation 19,

$$\frac{\partial H_{vh}}{\partial \omega_{ij}} = \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ -\frac{1}{2} \sum_{m \neq i,j} \sum_{n \neq i,j} \omega_{mn} x_m^{(vh)} x_n^{(vh)} - \omega_{ij} x_i^{(vh)} x_j^{(vh)} - \sum_m \phi_m x_m^{(vh)} \right] 
= \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ -\frac{1}{2} \sum_{m \neq i,j} \sum_{n \neq i,j} \omega_{mn} x_m^{(vh)} x_n^{(vh)} \right] + \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ -\omega_{ij} x_i^{(vh)} x_j^{(vh)} \right] + \frac{\partial}{\partial \omega_{ij}} \left[ -\sum_m \phi_m x_m^{(vh)} \right] 
\Rightarrow \frac{\partial H_{vh}}{\partial \omega_{ij}} = -x_i^{(vh)} x_j^{(vh)}.$$
(20)

Analogous to  $\partial H_{vh}/\partial \omega_{ij}$ , we have  $H_{uk}$  derivative, which is

$$\frac{\partial H_{uk}}{\partial \omega_{ij}} = -x_i^{(uk)} x_j^{(uk)}. \tag{21}$$

Going back to equation 18, we can replace the derivatives of H, and solve the

derivative of the marginal probability  $P_v$ ,

$$\frac{\partial P_{v}}{\partial \omega_{ij}} = \frac{1}{Z} \sum_{h} e^{-\beta H_{vh}} (-\beta) (-x_{i}^{(vh)} x_{j}^{(vh)}) - \frac{1}{Z^{2}} \sum_{h} e^{-\beta H_{vh}} \sum_{u} \sum_{k} e^{-\beta H_{uk}} (-\beta) (-x_{i}^{(uk)} x_{j}^{(uk)})$$

$$= \beta \left[ \sum_{h} \frac{e^{-\beta H_{vh}}}{Z} x_{i}^{(vh)} x_{j}^{(vh)} - \sum_{h} \frac{e^{-\beta H_{vh}}}{Z} \sum_{u} \sum_{k} \frac{e^{-\beta H_{uk}}}{Z} x_{i}^{(uk)} x_{j}^{(uk)} \right]$$

$$= \beta \left[ \sum_{h} P_{vh} x_{i}^{(vh)} x_{j}^{(vh)} - P_{v} \sum_{u} \sum_{k} P_{uk} x_{i}^{(uk)} x_{j}^{(uk)} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\partial P_{v}}{\partial \omega_{ij}} = \beta \left[ \sum_{h} P_{vh} x_{i}^{(vh)} x_{j}^{(vh)} - P_{v} \langle x_{i} x_{j} \rangle \right].$$
(22)

Given the derivative of  $P_v$  in relation to  $\omega_{ij}$ , we can compute the learning term  $\Delta\omega_{ij}$ , from equation 16,

$$\Delta\omega_{ij} = \eta \sum_{v} \frac{Q_{v}}{P_{v}} \beta \left[ \sum_{h} P_{vh} x_{i}^{(vh)} x_{j}^{(vh)} - P_{v} \langle x_{i} x_{j} \rangle \right]$$

$$= \eta \beta \left[ \sum_{v} \sum_{h} \frac{Q_{v}}{P_{v}} P_{vh} x_{i}^{(vh)} x_{j}^{(vh)} - \sum_{v} \frac{Q_{v}}{P_{v}} P_{v} \langle x_{i} x_{j} \rangle \right]$$

$$= \eta \beta \left[ \sum_{v} \sum_{h} Q_{v} \frac{P_{vh}}{P_{v}} x_{i}^{(vh)} x_{j}^{(vh)} - \sum_{v} Q_{v} \langle x_{i} x_{j} \rangle \right]$$

$$= \eta \beta \left[ \sum_{v} \sum_{h} Q_{v} P_{h|v} x_{i}^{(vh)} x_{j}^{(vh)} - \langle x_{i} x_{j} \rangle \right].$$

$$(23)$$

In the above derivation, we have used the following relations,

$$P_{h|v} = \frac{P_{vh}}{P_v},\tag{24}$$

which is the conditional probability equation. In our scenario this equation means that the probability distribution of the hidden units in state h given the state v of the visible units is the joint probability distribution of both states, v and h, divided by the marginal probability distribution of the visible units in state v.

The second term in equation 23, is the average of units i and j over all combinations of states v and h of the system. In other words, we would have to compute all possible combination of states of visible and hidden units, v and h, and then average over the specific units i and j.

iThe first term can be simplified

## 2 TÍTULO DO CAPÍTULO 1

Texto do capítulo. Texto, texto, Figura 1. Texto Figura 2(a).

Figure 1 - Título da figura.



Legend: Texto da legenda. Source: Citação da fonte ou 'O

autor.'.

Table 1 - Título da tabela.

X	Y
1,20	15,7
1,23	15,6
1,19	15,3
1,26	15,1
1,22	15,5
1,16	15,3
1,37	15,7

Legend: Texto da

legenda.

Source: Citação da

fonte ou 'O

autor.'.

Figure 2 - Título da figura.



Legend: Texto da legenda. (a) Texto da imagem. (b) Texto da imagem.

Source: Citação da fonte ou 'O autor'.

#### 3 TÍTULO DO CAPÍTULO 2

Texto do capítulo. Texto, texto Algoritmo 1. Texto.

Algoritmo 1 - Título do algoritmo.

### DOCUMENTAÇÃO

Título

#### Nome do algoritmo

#### Propósito

Propósito do algoritmo.

#### Ме́торо

Método utilizado no algoritmo.

#### Entradas

a, m: multiplicador e módulo

n0: semente

i: contador auxiliar

#### Saídas

n: número aleatório

### Observações, Restrições, Requisitos

Observações, restrições e requisitos.

#### ALGORITMO IDENTIFICAÇÃO

— continua —

```
declarar a, m, i numéricos declarar n0, n numéricos
```

```
m \leftarrow 13
1.
    n0 \leftarrow 1
2.
    para a de 2 até m-1, fazer
                                          {para cada possível valor de 'a'}
3.
        escrever "a = ", a, ": n = {"}
4.
                     {reinicia a geração com a semente n0}
5.
        para i de 0 até m-1, fazer
6.
            n \leftarrow resto(a * n, m)
                                      {gerador de números aleatórios}
7.
            se (n == n0), então
                                       {se fim da sequencia...}
8.
                escrever n, "}"
9.
                parar
10.
11.
            senão
                escrever n
12.
            fim se
13.
        fim para
14.
   fim para
15.
```

### Algoritmo 1 - Título do algoritmo. (continuação)

```
— continuação —
       a \leftarrow 1
       enquanto (a < 10), fazer \{coment\'{a}rio\}
       escrever a
        a \leftarrow a + 1
       fim enquanto
       a \leftarrow 1
                  \{coment\'{a}rio\}
       repetir
        escrever a
           a \leftarrow a + 1
       até que (a \ge 10)
       a \leftarrow 1
                 {comentário}
       fazer
        escrever a
        a \leftarrow a + 1
       enquanto (a < 10)
   FIM ALGORITMO
Fim documentação
```

## CONCLUSÃO

Texto da conclusão.

### **BIBLIOGRAPHY**

AMADO, J.  $Dona\ Flor\ e\ seus\ dois\ maridos$ : historia moral e de amor. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 1969. 535 p.

ANDRADE, M. M. d. Introdução à metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1997. 151 p.

## GLOSSÁRIO

termo significado termo significado termo significado

### **APPENDIX** A – Primeiro apêndice

### A.1 Primeira seção

Texto da primeira seção.

### A.1.1 Primeira subseção

Texto da primeira subseção.

## A.1.1.1 Primeira subsubseção

### APPENDIX B – Segundo apêndice

### B.1 Primeira seção

Texto da primeira seção.

### B.1.1 Primeira subseção

Texto da primeira subseção.

## B.1.1.1 Primeira subsubseção

### ANNEX A – Primeiro anexo

### A.1 Primeira seção

Texto da primeira seção.

### A.1.1 Primeira subseção

Texto da primeira subseção.

## A.1.1.1 Primeira subsubseção

### ANNEX B – Segundo anexo

### B.1 Primeira seção

Texto da primeira seção.

### B.1.1 Primeira subseção

Texto da primeira subseção.

## B.1.1.1 Primeira subsubseção