Mesurer la TA d'un enfant et l'interpréter en fonction des courbes de référence.		
Réaliser l'examen des urines par des bandelettes.		
Reconnaître une convulsion du nourrisson.		
Reconnaître la lésion élémentaire d'une éruption de l'enfant.		
Interpréter un ECBU chez l'enfant suspect d'infection urinaire.		
Reconnaître une raideur méningée chez un enfant fébrile.		
Réaliser une ponction lombaire chez un enfant.		
Interpréter les résultats du LCR d'un enfant.		
Reconnaitre une crise d'asthme chez un enfant.		
Évaluer la gravité d'une crise d'asthme chez un enfant.		
Évaluer la gravité d'une déshydratation aiguë.		
Reconnaître les signes évocateurs d'une cardiopathie congénitale.		
Évaluer la gravité d'une acidocétose diabétique chez un enfant.		
Interpréter un hémogramme chez l'enfant.		
Reconnaître une paralysie flasque aigue devant une impotence fonctionnelle.		
SÉANCES D'ARC : Établir une démarche diagnostique devant ○ une diarrhée chronique. ○ une fièvre, ○ une dyspnée. ○ des vomissements chroniques. ○ des douleurs abdominales. ○ une hématurie / protéinurie ○ une fièvre prolongée. ○ un syndrome œdémateux. ○ une anémie / Pâleur.		
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE		
Examiner l'abdomen douloureux d'un enfant.		
Examiner l'appareil uro-génital de l'enfant.		
Examiner l'appareil locomoteur d'un enfant.		
Examiner un rachis douloureux ou déformé chez l'enfant.		
Rechercher les complications vasculo-nerveuses lors d'une fracture chez l'enfant.		
Savoir dépister en période néonatale une atrésie de l'œsophage.		

Savoir dépister en période néonatale une malformation ano-rectale.		
Savoir dépister en période néonatale une luxation congénitale de hanche.		
Savoir dépister en période néonatale une Paralysie obstétricale du plexus brachial.		
Savoir dépister en période néonatale les autres anomalies orthopédiques et viscérales apparentes.		
Reconnaître les attitudes vicieuses articulaires.		
Reconnaître un flessum extra-articulaire.		
Reconnaître une scoliose structurale, une raideur rachidienne.		
Reconnaître un syndrome de loges chez un enfant traumatisé.		
Reconnaître les anomalies du canal péritonéo-vaginal.		
Reconnaître une ectopie testiculaire.		
Inciser un abcès des parties molles chez l'enfant.		
Réaliser des sutures cutanées chez l'enfant.		
Réaliser un sondage vésical chez l'enfant.		
Réaliser un cathétérisme œsophagien chez un nouveau-né.		
Réaliser un lavement évacuateur chez l'enfant.		
Réaliser une ponction et/ou un drainage pleural chez l'enfant.		
Participer à une consultation de chirurgie pédiatrique.		
Accueillir les parents d'un malade.		
Participer à une intervention chirurgicale chez l'enfant.		
Surveiller un enfant opéré.		
Éduquer un enfant admis pour maladie hydatique.		
SÉANCES D'ARC : Mener une démarche diagnostique devant : **a.** Une boiterie de l'enfant **b.** Un enfant traumatisé **c.** Une masse abdomino-pelvienne de l'enfant **d.** Une douleur abdominale aigue de l'enfant **e.** Une choléstase néonatale **f.** Une occlusion néonatale		