

17 - 04- Glycopeptides - Pr TASSI

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé Glycopeptides, c'est une famille d'antibiotiques qui contient deux molécules, la vancomycine et la tecoplanine, qui agissent par inhibition de la synthèse du peptide ou des cannes, comme les bêtalactamines. Ce sont des antibiotiques bactéricides, lents, temps dépendants et n'ont pas d'absorption au ras, ce qui fait qu'ils sont administrés par voie injectable. C'est une famille qui constitue un traitement de référence des infections graves à Staphylococcus résistant à la myticilline.

Donc, on a un cas de Staphylococcus résistant à la myticilline qui ne peut pas être traité par les bêtalactamines, vu qu'il est résistant à toute la famille des bêtalactamines, le glycopeptide reste un choix thérapeutique. Leur spectre d'action est constitué par des germes graves positifs dans le streptocoque pneumocoque, le Staphylococque sensible à la myticilline et le Staphylococque résistant à la myticilline. Il faut savoir que le Staphylococque sensible à la myticilline est moins sensible au glycopeptide que le Staphylococque résistant à la myticilline.

L'estéria aussi est sensible au glycopeptide de même que l'oestradium difficile. Pour les bactéries résistants, on a les bacilles graves négatives et les germes intracellulaires. Bien sûr, on comprend pourquoi les germes intracellulaires parce qu'ils n'ont pas le peptide glycate qui constitue leur paroi bactérienne.

Ils ont une diffusion bonne dans les serreuses, modeste dans l'os et le poumon, mauvaise dans le liquide céphalo-rachidien, sauf si on a une inflammation pour l'avant-comicine. C'est-à-dire que l'avant-comicine, on peut l'utiliser en cas de méningite et ce sont des antibiotiques à élimination rénale. Ils sont indiqués dans les infections sévères à germes sensibles comme les bactéries myles, les endocardites, les péritonites, les mydiastinites, les infections osseo-articulaires et les infections sur matériel ainsi que les méningites.

Pour l'avant-comicine, il a quand même une forme orale mais qui n'est pas absorbée oralement. Il va traiter localement la colite pseudomembranose qui est due à l'oestradium difficile et on a la forme intraveineuse soit en administration continue ou discontinue, donc continue par la seringue autoposseuse, discontinue par des perfusions espacées dans la journée. La posologie, il va de 30 à 60 mg par kg par jour.

La demi-vie, il est lent, ce qui fait qu'on peut administrer l'avant-comicine deux fois par jour, donc à raison de 5 à 11 heures pour la demi-vie. La toxicité, il est essentiellement rénal. Ils peuvent donner des allergies aussi d'hyper-éosinophilie, de thrombopénie, de l'ocopénie et d'autotoxicité et une complication qui s'appelle le Redman syndrome.

C'est une complication qui apparaît quelques minutes après la perfusion, essentiellement après une perfusion rapide et se fait par une éruption de la face, du cou, des parties supérieures du thorax avec prurée et douleur musculaire du cou et du dos. Ces diapositives, on voit la

complication qui s'appelle le Redman syndrome. La deuxième molécule, c'est l'athécoplané qui existe seulement sous forme injectable, donc il peut être administré par voie intraveineuse, intramusculaire et socutanée.

Donc la posologie, il est de 12 mg par kg, deux fois par jour pendant les premières 48 heures, puis on l'administre une seule fois par jour et pour l'enfant c'est 10 mg par kg. La demi-vie, il est très longue, il atteint 155 heures jusqu'à 168 heures, ce qui permet de l'administrer au-delà de 48 heures une seule fois par jour. Pour la toxicité, on a l'allergie, le périossinophilie et l'élévation des transaminases.

C'est une molécule qui reste beaucoup plus coûteuse que la voncomycine. Alors pour les associations, les glycopeptides sont utilisés seuls ou associés aux autres comme les aminosides, la rifampicine, l'imipenem, la phosphomycine et l'acide fucidique.